

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres


En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com










• 



To .







# CATALOGUE SYSTÉMATIQUE

DU

CABINET
D'ORNITHOLOGÍE

ET DE LA

COLLECTION

DE

QUADRUMANES

DΕ

CRD. J. TEMMINCK.

AVEC UNE COURTE DESCRIPTION

# DES OISEAUX NON DÉCRITS

SUIVI:

D'UNE NÔTE D'OISEAUX DOUBLES ET DE QUELQUES AUTRES OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE OFFERTS EN ÉCHANGE.



AMSTERDAM, Chez C. SEPP JANSZ, MDCCCVII. BIOLOGY LIBR.

QL 677 TH Biology Library

# PREFACE

Le but principal que je me suis proposé en faisant imprimer le Catalogue Systématique de mon Cabinet d'Ornithologie, et de ma collection de Quadrumanes, est de faire connoître aux Amateurs et Possesseurs de collections d'Histoire Naturelle et aux Directeurs des divers Muséum qui se trouvent repandus en Europe.

1en: Le nombre des individus dressés, qui font exposés dans mon Cabinet.

Je tache de satisfaire par-là aux sollicitations reitérées qui m'ont été faites pour m'engager à publier la Nôte des Oiseaux déposés dans cette collection. Jy soucris avec d'autans plus de Zéle, espérant être assez heureux de pouvoir contribuer en quelque sorte à l'avancement d'une branche de l'Histoire Naturelle à la quelle je me suis particulièrement voué, en offrant aux Auteurs qui s'occupent à publier l'Histoire des Oiseaux, les renseignemens qu'ils pouroient desirer, par rapport aux espèces non décrites que cette collection renserme, je les invite d'en faire usage, en les persuadant du Zêle que je mettrai à leur rendre service.

Je fais connoitre 2<sup>nt</sup> les Oiseaux et autres objets dressés, ou rembourés que je possède en doubles.

Mon dessein étant de destiner les doubles à l'échange contre d'autres objets d'Ornithologie que je ne possède pas dans mon Cabinet, et qui ne sont pas portés sur le Catalogue; je les offre aux Possesseurs de Cabinets, et aux Directeurs de Muséum, qui seroient dans le même cas, les invitant à entrer en correspondance sur les échanges. Par-la je me propose le double avantage, celui d'être utile, et celui d'augmenter considé-

rablement ma Collection. Je préviens cependant les Amateurs, que les Oiseaux ou Singes qu'ils proposent en troc, doivent être purs, et intacts, garantissants de mon côté la bonne conservation des objets que je leur offre.

Les Marchands d'Histoire Naturelle repandus dans les pays étrangers, peuvent aussi, parlà se mettre au fait des Oiseaux que j'ai, et juger de ceux d'ont l'acquisition me seroit agréable.

J'ai principalement suivi pour la classification de ce Catalogue le Système de LATHAM, etant le moins désectueux de tous les compilateurs, et j'ai cité la 13<sup>me</sup> Edition de LINNE lorsqu'elle s'accordoit avec le système de l'Auteur Anglois.

· Voici les Auteurs d'ont j'ai fait usage pour la Synonimie.

LATHAM Index Ornithologicus. — LINNE Edition de Gmelin. — AUDEBERT
Histoire Naturelle des Singes et Makis. —
LATHAM General Synopsis of birds, and

Supplement. — Sonnini Edition de Buffon. - Buffon Oiseaux Edition in Folio. - LE VAILLANT Histoire Naturelle des Oiseaux d'Afrique — des Perroquets — Oiseaux de Paradis etc. in Folio. — EDWARDS Edition in Quarto. — AUDEBERT Oiseaux dorés in Folio. — VIEILLOT Oiseaux Chanteurs. — FRISCH Vögel Deutschlands. Jai cité ausse l'article des Gallinacés mon ouvrage d'ont presque tous les dessins sont achevés, et qui va paroitre incessemment, par cahiers de six planches avec leur description, il aura pour titre Histoire générale et complette des Gallinacés. — Ouvrage in folio en deux volumes orné de plus de deux cent planches, ou les Amateurs trouverent representés environ quatre-vingt individus nouveaux, de la plus-part desquels aucun Auteur n'a fait mention; les Oiseaux de moyenne taille sont figurés de grandeur naturelle.

Cette euvrage fournira une monographie complette de tous les Oiseau qui ont rapport à la famille des Gallinacés; je n'ai épargné depuis plus plus de trois ans, ni travail, ni moyens pour compléter ce genre, en visitant les principeaux Cabinets, et en rassemblant dans ma Collection plusieurs espèces primitives, qui rependront de nouvelles lumières sur ce Genre intéressant. — Les Cabinets qui se trouvent à Londres, ceux de Paris, d'Amsterdam etc. m'ont fourni une abondante recolte, d'objets rares et non décrits.

Afin de faciliter aux curieux l'inspection de mon Cabinet. Je préviens, que les Numeros placés sur le Catalogue, à côté de chaque individu, ont rapport au même Numero, que porte l'Oiseau déposé dans le Cabinet; le Male et la Femelle de chaque espèce sont placés sous le même Numero.

Les marques (\*) derrière les Numeros des Diseaux, qui n'ont point été décrits jusqu'à ces jours, servent de renvoy au même Numero, porté sur les Nôtes Explicatives des Caractères Physiques què j'ai cru devoir ajouter à ce Catalogue. — La collection renserme plusieurs espèces de Perroquets et Cacatoes, qui n'ont pas

### PREFACE

été décrites, il m'a cependant semblé inutile d'en donner ici la déscription, ces Oiseaux allant paroitre bientôt dans le supplement par le quel l'Estimable Auteur qui à décrit ce Genre se propose de compléter son interessante monographie, il en est de même des Promerops et des Guèpiers, dont Mr. LE VAILLANT donnera l'Histoire à la suite des Oiseaux de Paradis, Toucans et Barbus; les Calaos nouveaux et non décrits, paroitront aussi dans peu, par les soins du même Auteur.

Amsterdam,

VIII

1807.

Ć. J. TEMMINCE.

# FAUTES ESSENTIELLES'

### à CORRIGER AVANT LA LECTURE.

					foucris, lifez fouscris.
					Oiseau., lisez Oiseaux.
Catalog u	e p.	2.	1.	16.	PRAEMINANT, lifez Proé- MINANT.
dito	p.	II.			Tout l'article du Falco Cyaneus doit être ajou- té à celui du Falco Pygargus page 13, le premier étant le Male et le fecond la Femelle Sou- BUSE.
dito	p.	12.	1.	24.	Gmel. Syst. 1. p. 245, lisez p. 254.
dito	p.	16.	7.	5•	Gonolek, lifez Gonelek.
dito	p.	16.	l.	8.	Goffroy, lifez Geoffroy.
dito	p.	19.	I.	6.	OHWL, lifez OWL.
dito	p.	26.	I.	3.	Gellow, lifez Jellowl.
dito	<b>p</b> .	30.	l.	28.	SCORLET, lifez SCARLET.
dito	p.	31.	1.	25.	TAVONA, lifez TAVOUA.
dito	p	45•	1.	16.	Vaill. roll. pl. 35., lisez pl. 56.
dito	<b>p</b> . (	62.	l.	21.	L'EPECHE, lisez L'EPEICHE.
dito	p.	67.	<i>l</i> .	17.	CAPENCIS, lifez CAPENSIS.
dito	p.	69.	1.	2.	FÉCHEUR, lifez PÉCHEUR.
. dito	p.	73•	l.	28.	· · ·
dito	p.	77•			Se trouve à trois reprises CAYANEA, lisez CYANEA. Ca-

Cotalogue	e p.	90.	l.	23.	Cayaneus, lifez Cyaneus.
dito	p.	93•	1.	6.	Cayanurus, lisez Cyanurus.
dito	p.	94•	1.	II.	Ampelus, lisez Ampelis.
dito	p.	99•	1.	24.	Coccothraustus, lisez Coccothraustes.
dito	p.	103,	I.	6.	CAYANEA, lifez CYANEA.
dito	p.	105.	I.	4.	Fouonde, lifez Fou ou de.
dito	p.	112.			Fringilla Montium Gmel., lifez Fringilla Minuta Mihi.
dito	p.	120.			ALAUDA NEMOROSA Gmel. lisez ALAUDA CRISTA- TELLA Lath. Ind. v. 2. p. 499.
dito	p.	128.	I.	11.	PETIT VERD, lifez PIPIT VERD.
dito	p.	133.	1.	6.	CAYANEUS, lifez CYANEUS.
dito	p.	141.	l.	14.	Cayanocephala, lifez Cyanocephala.
dito	p.	165.	I.	6.	CARONCULATA, lifez CA- RUNCULATA.
dito	p.	165.	I.	17.	CIONIA, lifez CICONIA.
. dito	p.	166.	I.	11.	GRAZETTA, lisez GARZETTA.
dito	p.	168.	1.	4.	BULARAGAN, lifez Bu- LARAGNAN.
dito	p.	189.			Tout l'article du Mer- gus Minutus, doit être raijé, cet Oiseau étant une Jeune Femelle, du Mer- gus Albellus.
diso	p.	192.	I.	7•	GLARICULATA, lifez GA-

Partout ou il y a decrit, lisez décrit.

LERICULATA.

# SIMIA.

# SINGE.

- Simia Moloch. Audebert Le Moloch Audebert famille ire Section 2de pl. 2. Schreber Säugthiere Supplement pl. 3. B. des Moluques.
- SIMIA SILENUS. (Femina) Gmelin Sijst. 1. pag.
  31. Species 10.—L'OUANDEROU (Femelle)

  Buffon Hist. Nat. Tab. 14. Audebert
  fam. 2. Sect. 1re pl. 3. Schreber pl. 11.

   LION-TAILED APE Pennant Quad.
   de Ceylan.
  - SIMIA PATAS. Mihi LE PATAS A
    QUEUE COURTE Buffon Suppl. Audebert fam. 2<sup>de</sup> Sect. 1<sup>re</sup> pl. 4. des Indes
    Orientales.
  - SIMIA MAIMON. (Mas) Gmelin pag. 29. Sp. 7.

     LE MANDRILL (Male) Buff. Tab. 16

    17. Aud. fam. 2de Sect. 2de pl. 1. —
    RIBBED-NOSE AFE Penn. pag. 103. pl.
    69. Schreber pl. 7. de la Côte
    de Guiné.

Δ

- SIMIA SPHINX. (Mas) Gmelin pag. 29. Sp. 6. —

  LE PAPION (Male) Buffon Tab. 13 et 14.

  —— Aud. fam. 3. Sect. 1. pl. 1. —

  Schreb. pl. 6. —— d'Afrique.
- SIMIA SPHINX. (varietas) LE PAPION VA-RIETÉ C. d'Afrique.
- SIMIA HAMADRYAS. (Mas) Gmelin pag. 30. Sp.

  8. L'HAMADRYAS (Male) LE
  BABOUIN A MUSEAU DE CHIEN, ET
  LE SINGE DE MOCO Buff. Supp. —
  DOG-FACED APE Penn. Tab. 14. fig. 1.
   Schreb. pl. 10. d'Afrique.
- SIMIA NICTITANS. (Femina) Gmelin pag.

  33. Sp. 23. LE HOCHBUR Aud. fam.

  4. Sect. 1<sup>ra</sup> pl. 2. LA GUENON &

  NEZ BLANC PRAEMINANT Buff. Suppl.

   De la Côte de Guiné.
- SIMIA SABRA. (Mas) Gmel. pag. 32. Sp. 18.

  LE CALLITRICHE Buff. Tab. 37.

  Aud. fam. 4. Sect. 2de pl. 4.

  GREEN APE Penn. Tab. 76. Schreb.
  pl. 18. Du Sénégal.
- SIMIA SABRA. (var. Mas) LE CALLITRICHE varieté (Male) Aud. pl. 5. Du Sénégal
- SIMIA DIANA. (Mas) Gmel. pag. 32. Sp. 17. LA
  DIANE (Male) Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 6.

  —— SPOTED APE Penn. pag. 112. N°. 75.

  —— Schreb. pl. 14. De la Côte de Guiné.
- SIMIA MONA. (Mas) Gmel. pag. 34. Sp. 41. —

  LA MONE (Male) Buff. Tab. 36. Aud.

  fam.

- fam. 4. Soct. 2. pl. 7. VARIED APE Penn. p. 118. N°. 84. — Schreb. Tab. 15. — de l'Asie.
- SIMIA ATYS. (Mas) Aud. L'ATYS (Male) Aud. fam. 4. Sest. 2. pl. 8. GRAND SINGE BLANC A. Seba Thes. Des Indes Orientales.
- SIMIA SINICA. (Mas) Gmelin pag. 34. Sp. 39.

  LE BONNET CHINOIS (Male) Buff. Tab.

  30. Aud. fam. 4. Sect. 2. pl. 11.

  CHINESE APE Peim. 117. No. 83.

  Schreb. Tab. 23. Du Bengale.
- SIMIA PETAURISTA. (Mas) Gmel. pag. 35. Sp. 44.

  LB BLANC-NEZ (Male) Buff. Tob. 39.

  Aud. fam. 4. Secs. 2. pl. 14. Schreb.

  Tab. 19. B. De la Côte de Guiné.
- SIMIA AUDEBERTA. (Femina) Mihi L'AUDEBERT (Femelle) fam. 4. Sect 2<sup>de</sup>. Des Isles de l'Ocean Indien.
- SIMIA LATIBARBA. (Mas) Mihi LE BAR-BIQUE (Male) fam. 4. Sect. 2de LA GUENON à FACE POURPRE Euff. Suppl. De Ceylan.
- SIMIA RUBRA. (Mas) Gmel. pag. 34. Sp. 42. —
  LE PATAS (Male) fam. 4. Sect. 2. LE
  PATAS & BANDEAU NOIR Ruff. Tab. 25.
   RED AFE Penn. pag. 116. N°. 8. —
  Schreb. pl. 16. Du Sénégal.

- Femelle) Buff. Suppl. Schreb. pl. 25. De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA SENICULUS. (Pullus) L'ALOUATE dans son jeune age (Male)
- SIMIA APELLA. (Mas) Gmel. pag. 37. Sp. 29. —

  LE SAJOU (Male) Buff. Tab. 4. Aud.

  fam. 5. Sect. 2. pl. 2. Schreb. Tab. 28.

   De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA FATUELLUS. Gmel. pag. 37. Sp. 28. —

  LE SAJOU CORNU Buff. Supp. Aud.

  fam. 5. Sect. 2. fig. 1. De l'Amerique

  Meridionale.
- SIMIA CAPUCINA. (Mas) Gmel. pag. 37. Sp. 30. LE SAI (Male) Buff. Tab. 8. Aud. fam. 5. Sect. 2. pl. 4. WEEPER
  APE Penn. pag. 127. No. 94. Schreb. Tab. 29. De l'Amerique Meridionale.
- Simia Capucina. (var. Mas) Le sai varieté B. Aud. pl. 6. De l'Amerique Merid.
- SIMIA SCIUREA. (Mas) Gmel. pag. 38. Sp. 31. —

  LE SAÏMIRI (Male) Buff. Tab. 51. —

  Aud. fam. 5. Sect. 2. pl. 7. ORANGE

  APE Penn. pag. 128. No. 95. Schreb.

  Tab. 30. De la Guyane.
- SIMIN PITHECIA. (Mas) Gmel. pag. 39. Sp. 22.

  LE SAKI (Male) Buff. Tab. 12. Aud.
  fam. 6. Sect. 1re. pl. 1. FOX TAILED

  APE Penn. pag. 130. N°. 98. Schreb.
  pl. 32. De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA LEUCOCEPHALA. Aud. LE SAKI

- YARQUE Aud. fam. 6. Sect. 1. pl. 2. ——
  De Surinam.
- SIMIA ROSALIA. Gmel. p. 40. Sp. 26. LE

  MARÏKINA Buff. Tab. 16. Aud. fam.
  6. Sect. 2. pl. 3. SILKY MONKEY

  Penn. Tab. 15. Schreb. Tab. 35. —

  de l'Amerique Meridionale.
- SIMIA JACCHUS. Gmel. pag. 39. Sp. 24.

  L'OUISTITI Buff. Tab. 14. Aud.
  fam. 6. Sect. 2. pl. 4. STRIATED

  APE Penn. pag. 132. No. 100. Schreb.
  pl. 33. De l'Amerique Meridionale.
- SIMIA MIDAS. Gmel. p. 41. Sp. 27. LE
  TAMARIN Buff. Tab. 13. Aud. fam.
  6. Sect. 2. pl. 5. Schreb. pl. 37. —
  De la Guijane.
- SIMIA PANISCUS. Gmel. p. 36. Sp. 14.

  LE COAÏTA Buff. Tab. 15. Aud. fam. 5. Sect. 1. pl. 2. Schreb. pl. 26. De la Guijane.

### LEMUR.

MAKL

- LEMUR MONGOZ. Gmelin Syst. 1. pag. No. 2.

  LE MONGOUS Buff. Suppl. —

  Audebert Hist. Nat. de Makis pl. 1. —

  WOOLY MAUCAUCO Pennant De Madagascar.
- LEMUR RUFUS. Audebert LE MAKI ROUX

  Audeb. pl. 2. De Madagascar.
- LEMUR CATTA. Gmelin pag. 43. No 4. LE
  A 3

MOCOCO Buffon Suppl. — Audeb. pl. 4.
— RING-TAILED MAUCAUCO Penn.
Schreber pl. 39. B. — De Madagascar.

- LORIS GRACILIS. Geoffroif LE LORIS GRÊLE Buff. Audeb. pl. 2. TAIL-LESS MAUCAUCO Penn. — Schreb. pl. 37. — De Ceylan.
- TARSIUS DAUBENTONII. Goffroij LE
  TARSIER Buff. Audeb. pl. 1. —

  De Macasfar.
- TARSIUS PUSILLUS. Mihi. LE TARSIER NAIN. Des Iles de l'Ocean Indien.
- LEMUR VOLANS. Gmelin pag. 44. N°. 5. —

  FELIS VOLANS TERNATANA Seba —

  GALEOPITHECUS RUFUS Audebert —

  LE GALEOPI THE QUE ROUX Audebert

  Hist. Nat. des Sing. et Mak. pl. 1. —

  FLYING MAUCAUCO Penn. Schreber pl. 43. De Ternate.

## AVES.

### OISEAUX.

GENUS VULTUR.

GENRE VAUTOUR.

VULTUR LEUCOCEPHALUS. Lath. Ind. v. 14

p. 2. — LE VAUTOUR BLANC, OU

(2) VAUTOUR OURIGOURAP d'Afrique Vaillant Oiseaux d'Afrique vol. 1. pl. 14. —

VAUTOUR DE NORVEGE Buff. pl. enluminée 449.

Vultur Percnopterus. Lath. Ind. v. 1.p. (943) 2. — LE VAUTOUR PERCNOPTERE d'Eu-

d'Europe Buff. pl. 426. — ALPINE VULTUR Lath. Syn. v. 1. p. 12.

- VULTUR FULVUS. Lath. Ind. v. 1. p. 6. ——
  Gmel. 249. —— LE VAUTOUR FAUVE,
- (944) OU LE GRIFFON d'Europe Buff. de Sonnini v. 2. p. 102. — FULVOUS VUL-TURE Lath. Syn. v. 1. p. 17.
- Vultur Papa. (Femina) Lath. Ind. v. 1. p. 4. Gmel. p. 246. —— LE ROI DES VAU-
- (441) TOURS d'Amerique Buff, pl. 428. ——

  Vaill. Qif. d'ef. v. 1. pl. 13. —— THE

  KING OF THE VULTURES Lath. fyn. v.

  1. p. 7.
- VULTUR PAPA. (Junior avis) LE ROI DES (1034) VAUTOURS Jeun age d'Amerique.
- (818\*) à CALESON BLANC d'Amerique Espèce non decrite.

# GENUS GYPAËTOS. GENRE GYPAËTE.

- GYPAËTOS ALPINUS. Daudin Ornith. v. 2. p. 25.

   VULTUR BARBATUS Lath. Ind. p. 3.

   FALCO BARBATUS Gmel. p. 252. LE
- (976) GYPAËTE BARBU des Alpes Sonnini v. 2. p. 214. pl. 12. f. 2. — VULTURINE EAGLE Alb. v. 11. pl. 3.

#### GENUS FALCO.

#### GENRE FAUCON.

- FALCO OSSIFRAGUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 255. LE GRAND AIGLE
- (678) DE MER, OU L'ORFRAIE (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 415 et 112.

  SEA EAGLE Lath. Syn. v. p. 30.
- FALCO ALBESCENS. (Femina) Lath. Ind. Orn.

  Supp. v. 2. p. IV. L'AIGLE BLAN-
- (1) CHARD d'Afrique (Femelle) Vaill. Oif. d'Af.
  v. 1. pl. 3. Noisy eagle Lath.
  Supp. to Syn. v. 2. p. 21. No. 10.
- FALCO ECAUDATUS. Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2.
  p. IV. L'AIGLE BATELEUR d'Afri-
- (3) que Vaill. Oif. & Af. v. I. pl. 7. ——
  SHORT-TAILED EAGLE Lath. Supp. to
  Syn. v. 2. p. 21.
- FALCO PONDICERIANUS. Gmel. Syst. 1. p. 265.

  L'Aigle Brun de pondicheri
- (12) Buff. pl. 416. PONDICHARY EA-GLE Lath. Syn. v. 1. p. 41.
- FALCO HALIÆTOS. Gmel. Syst. 1. p. 263. ——
  LE PETIT AIGLE DE MER, OU LE
- (579) BALBUSARD d'Europe Buff. pl. 414. —
  OSPREY EAGLE Lath. Syn. v. I. p. 45.
- FALCO LEUCOGASTER. Gmel. Syst. 1. p. 257. —
  L'AIGLE VENTRE BLANC & AILES
- (569) GRISES des iles de la mer pacifique Sonnini Edit. de Buff. v. 2. p. 87. WHITE-BELLIED EAGLE Lath. Syn. v. 1. p. 33.

- FALCO APIVORUS. Gmel. Syst. 1. p. 267.

  LA BONDRÉE Male d'Europe Buff. pl.
- (685) 420. HONEY BUZZARD Lath. Syn. v. 1. p. 52.
- FALCO FURCATUS. Gmel. Syst. 1. p. 262. ——
  LE MILAN & QUEUE FOURCHUE de la
- (507) Caroline Buff. p. 158. v. 1. Edit. folio SWALLOW-TAILED FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 60.
- FALCO PARASITICUS. (Mas et Femina) Lath. Ind.
  Orn. Supp. v. 2. p. 5. LE MILAN
- (581) PARASITE d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 22. — PARASITE FALCON Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 30.
- FALCO PALUMBARIUS. (Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 269. L'AUTOUR d'Europe (Femel-
- (644) le) Buff. pl. 418. Goshawk Lath. Syn. v. 1. p. 58. No. 39.
- FALCO MELANOPTERUS. Lath. Ind. Orn. Sup. v. 2. p. VI. No. 16. — LE BLAC d'Afri-
- (583) que Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 36.

  BLACK-WINGED FALCON Lath. Syn.
  Supp. v. 2. p. 28. No. 23.
- FALCO MAGNIROSTRIS. Gmel. Syst. 1. p. 282.

  L'EPERVIER & GROSBEC de Caij.
- (584) enne Buff. pl. 464. GREAT-BIL-LED FALCON Lath. Syn. v. I. p. 103.
- FALCO NISUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 280. L'EPERVIER (Male et Femelle)
- (686) d'Europe Buff. pl. 412. SPARROW A 5

- HAWR Lath. Syn. v. 1. p. 99. No. 85. —— Frisch T. 90.
- FALCO ÆRUGINOSUS. Gmel. Syst. 1. p. 267.

  LE BUSARD DE MARAIS d'Europe Buff.
- (585) pl. 424. MOOR-BUZZARD Lath. Syn. v. 1. p. 53. Frisch T. 77.
- FALCO AURANTIUS. Gmel. Syst. 1. p. 283. —— LE HOBREAU NOIR à COU ROUX de
- (617) Caijenne ORANGE BREASTED HO-BY Lath. Syn. v. 1. p. 105.
- FALCO NŒVIUS, Gmel. Syst. 1. p. 258, N°. 49.

  LE PETIT AIGLE (Femelle) d'Eu-
- (774) rope Buff. pag. 72. Edit. folio. Roug-FOOTED EAGLE Lath. Syn. v. 1. p. 37. No. 14. — Frisch T. 71.
- FALCO TINNUNCULUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst, 1. p. 278. LA CRESSERELLE
- (664) (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 401. et 471. KESTRIL FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 94. Frisch T. 84 et 85.
- FALCO Æ SALON. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 284. No. 118. L'ESMERILLON
- (817) (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 468. —
  FALCONERS-MERLIN Lath. Syn. v. 1.
  p. 109. Frisch T. 89.
- FALCO LITHOFALCO. Gmel. Syst. 1. p. 278. LE ROCHIER (Male) d'Europe Buff. pl.
- (741) 447. STONE FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 93. Frisch T. 86.
- FALCO ALBICILLA. Gmel. Syst. 1. p. 253.

- Le grand pygargue ou l'aigle à QUEUE BLANCHE d'Europe Buff. v. I. p. 78. — CINEROUS EAGLE Lash.
- (5)Syn. v. 1. p. 33.
- FALCO RUFUS. Gmel. Syst. 1. p. 266. LE BUSARD HARPAYE d'Europe Buff. pl.
- (582)460. — HARPY FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 51. - Frisch T. 78.
- FALCO LANARIUS. Gmel. Syst. 1. p. 276. ---LE LANIER d'Europe Buff. v. I. p.
- 192. Edit. folio THE LANNER Lath. (883) Syn. v. 1. p. 86.
- FALCO CAYANEUS. Gmel. Syst. 1.p. 276. (Mas et Femina) --- L'OISEAU ST. MARTIN
- (\$82) d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 459. (le Male) — HEN HARRIER Lath. Syn. v. 1. p. 88. - Frisch T. 79 es 80.
- FALCO BUTEO. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 265. No. 15. — LABUSE d'Europe (Male) Buff.
- pl. 419. COMMON BUZZARD Lath. (851) Svn. v. 1. p. 48.
- FALCO COMMUNIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 270. - LE FAUCON (Male) d'Europe - Buff.
- Oif. v. 1. pl. 421. YEARLING FALCON (885)Lath. Syn. v. 1. p. 65. - Frisch T. 74.
- FALCO VARIEGATUS. Gmel. Syst. 1. p. 267. No. 78.7 LA FALCO ALBIDUS. Gmel. Syst. 1. p. 267. No. 79.5
- **(850)** BUSE TACHETÉE OU LE BUSARDET d'Europe --- SPECKLED BUZZARD Lath. Syn. v. 1. p. 57. - Buzzardet Arct.

- Arct. Zool. v. 2. No. 109. Borkhause Deutsche Ornith. pl. enl.
- FALCO SUBBUTEO. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 283. — LE HOBEREAU d'Europe
- (886) (Male et Femelle) Buff. pl. 431 et 432. HOBBY Lath. Syn. v. 1. p. 103. —— Frisch T. 87.
- FALCO PLUMIPES. Daudin Orn. v. 2. p. 163. LA
  FALCO LAGOPUS. Gmel. Syst. 1. p. 260.

  BUSE GANTÉE d'Europe et d'Afrique
- (687) Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 18. Borkhause Deutsche Ornith. — Rough-legged falcon Lath. Syn. v. 1. p. 75.
- FALCO CHICQUERA. Lath. Sup. Ind. Orn. v. 2. p. V. — LE CHICQUERA de Ben-
- (887) gale Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 20. ——
  Sonnini v. 3. p. 157. —— CHICQUERA
  FALCON Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 27.
- FALCO CHRYSAËTOS. (Mas) Gmel. Syst. p. 256.— LE GRAND AIGLE, OU L'AIGLE ROY-
- (970) AL Buff. pl. 410. GOLDEN EAGLE

  Lath. Syn. v. 1. p. 31.
- FALCO MELANÆTUS. (Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 245. L'AIGLE NOIR d'Europe Buff.
  - (971) v. 1. p. 69. Edit. folio Frisch T. 69. BLACK EAGLE Lath. Syn. v. 1. p. 28.
  - FALCO MILVUS. Gmel. Syst. 1. p. 261. LE
  - (972) MILAN ROYAL d'Europe Buff. pl. 422. KITE FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 61.
  - FALCO ALBUS. White's fournal LE FAU-

- CON BLANC de la nouvelle galle meridionale - WHITE HAWK White's fournal p. (958)250. avec pl.
- FALCO PYGARGUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 277. - LA SOUBUSE d'Europe
- (Male et Femelle) Buff. pl. 443. RING-TAIL FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 89.
- FALCO COMMUNIS. Hornotinus. Gmel. Syst. 1: p. 270. — LE FAUCON SORS d'Europe
- (1016) Buff. pl. 470. YEARLING FALCON Lath. Syn. v. 1. p. 65. A.
- FALCO FULVUS. Gmel. Syst. 1. p. 256. L'AIGLE COMMUN Buff. pl. 409. ---
- (1015) C'est le jeun age du grand Aigle, ou Aigle toyal. - RING-TAIL EAGLE Lath. Syn. v. I. p. 32.
- FALCO BUTEO. Albus (Femina) LA BUSE (946)BLANCHATRE d'Europe (Femelle) Varieté très rare.
- LE FAUCON GRIS RAYÉ de (8\*) la Guijane — non décrit.
- FALCO ATER. (Mas) Lath. Ind. v. 1. p. 21. Gmel. p. 262. - LE MILAN NOIR d'Eu-
- rope (Male) Buff. pl. 472. BLACE (917) KITE Lath. Sym. 9. 1. p. 62.
- FALCO PONDICERIANUS. Hornosinus LE PETIT AFGLE BRUN DE PONDI-

(816) CHERY dans son premier age.

#### GENUS LANIUS.

### GENRE PIE GRIËCHE.

- LANIUS COLLURIO. (Mas et Femina) Gmel. Syst.
  1. p. 300. LA PIE-GRIËCHE ECOR-
  - (888) CHEUR (Male et Femelle) d'Europe Buff.

    pl. 31. f. 1 et 2. RED-BACKED

    SHRIKE Lath. Syn. v. 1. p. 167. N°. 25.
- LANIUS RUTILUS. (Mas) Lath. Ind. Orn.
- LANIUS RUFUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 301. J PIE-GRIËCHE ROUSSE d'Europe (Male)
- (889) Buff. pl. 9. f. 2. WOODCHAT Lath. Syn. v. 1. p. 169. — Frisch T. 61.
- LANIUS CAYANUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 304.

  LA BECARDE, OU PIE GRIËCHE
- (10) GRISE de Caijenne (Male) Buff. pl. 304.—
  CAIJENNE SHRIKE Lath. Syn. v. v. p.
  189.
- LANIUS SENEGALUS. Gmel. Syst. 1. p. 304. LA PIE-GRIËCHE GRISE, OU LE
- (14) TCHAGRA du Sénégal Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 70. — Buff. pl. 479. — SENEGAL SHRIKE Lath. Syn. v. 1. p. 162.
- LANIUS EXCUBITOR. Gmel. Syst. 1. p. 300. LA PIE-GRIËCHE GRISE d'Europe Buff.
- (13) pl. 445. GREAT CINEROUS SHRIKE Lath. Syn. v. 1. p. 160.  $N^{\circ}$ . 4. ——
  Frisch T. 60.
- LANIUS COLLARIS. Gmel. Syst. p. 299.

- LA PIE-GRIËCHE GRISE, OU LE FIS-CAL d'Afrique, Cap de bonne Esperance (9) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 61. — Buff. pl. 477. — COLLARED SHRIKE — Lath. Syn. v. 1. p. 163.
- ve du Cap de B. E. pays Auteniquoi (Ma-(16) le et Femelle) — Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl.
- 75 et 76. LANIUS ITALICUS. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 71.
- LANIUS MINOR. Gmel. Syst. 1. p. 308. ——
  LA PIE-GRIËCHE D'ITALIE Buff. pl.
- (742) 32. f. i. Lesser Grey Shrike Lath. Syn. Supp. 1. p. 54.
- LANIUS BRUBRU. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn.
  Supp. v. 2. p. XX. N. 15. LA PIE-
- (15) ORIËCHE BRUBRU d'Afrique (Male et Femelle) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 71. ——
  CAPE SHRIKE Lath. Supp. Syn. v. 2. p.
  78. N°. 21.
- LANIUS ÆTHIOPICUS. (Mas et Femina.) Mihi
   TURDUS ÆTHIOPICUS Lath. Ind.
  Orn.v. 1. p. 357. LA PIE-GRIËCHE
- (17) BOUBOU d'Afrique, pays des Caffres (Male et Femelle) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 68.

  ETHIOPIAM THRUSH. Lath. Syn. v. 1. p. 78.
- LANIUS ANTIGUANUS. Gmel. Syst. 1. p. 301. —
  A PIE-GRIECHE à DOS ROUX d'Anti(890) gue Sonneras voy. p. 114. pl. 70. —
  Sonn.

Sonn. v. 3. p. 314. — ANTIGUAN SHRI-KE Lath. Syn. v. 1. p. 171.

- LANIUS BARBARUS. Gmel. Syst. 1. p. 304. N. 18.

  LA PIE-GRIECHE ROUGE, OU
  LE GONOLEK du Sénégal Buff. pl. 56.
- (362) Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 69. —
  BARBARY SHRIKE Lath. Syn. v. 1. p.
  173. N. 23.
- (27) GRIËCHE HUPPÉE du Sénégal Vaill.
  Oif. d'Afr. pl. 80.
- LANIUS BICOLOR. Gmel. Syst. 1. p. 305. No. 27. PIE-GRIËCHE BLEUE de Madagascar (Male) Buff. pl. 298. Vaill.
- (521) Oif. d'Af. v. 2. pl. 73. Lath. Syn. v. 1. p. 178. No. 29.
- LANIUS ZEYLONUS. Mihi TURDUS ZEY-LONUS Gmel. Syst. 1. p. 837. — PIE-
- (591) GRIËCHE BACBAKIRI d'Afrique (Male)

  Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 67. Buff. pl.

  272. (Merle) CEYLAN THRUSH

  Lath. Syn. v. 2 p. 62. N°. 72.
- LANIUS DOLIATUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.p. 309. No. 16. LA PIE-GRIËCHE
- (18) RAYÉE de Caijenne (Male et Femelle) Buff.

  pl. 297. —— PIED SHRIKE Lath. Syn.
  v. 1. p. 190.
- LANIUS CUBLA. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn.

  Supp. v. 2: p. XX. No. 16. \_\_\_\_ LA PIE-
- (19) GRIËCHE CUBLA d'Afrique (Male et Fe-

melle) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 72.

HOTTNIQUA SHRIKE Lath. Syn. Supp.
v. 2. p. 79. N. 22.

#### GENUS STRIX.

#### GENRE CHOUETTE.

- STRIX BUBO. (Femina) Gmel. Syst. 1. p. 286. No.
  1. LE GRAND-DUC, OU HIBOU
- (312) d'Europe (Femelle) Buff. pl. 435. GREAT EARED OWL Lath. Syn. v. 1. p. 116. N°. 1. — Frisch. T. 93.
- STRIX OTUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 288. No. 4. LE MOYEN DUC, OU
- STRIX ASIO. Gmel. Syst. 1. p. 289. LE PE-TIT DUC de la Caroline Briss. Orn. v. 1.
- (618) p. 497. RED EARED OWL Lath. Syn. v. 1. p. 123. No 8.
- STRIX GRISEATA. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p. XV. No. 7. LACHOW-
- (316) ETTE à AIGRETTES BLANCHES de la Guiane (Male et Femelle) Vaill. Ois. d'As. v. 1. pl. 43. (le Male) SUPER-CILIOUS OWL Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 63. No. 12. La Femelle n'est pas decrite.
- STRIX NYCTEA. Gmel. Syst. 1. p. 201. No. 6. —

  LE HARFANG des terres Septentrionales Buff.

  B

  pl.

- (314) pl. 458. SNOWY OWL Lath. Syn. v. 1. p. 132. No. 17. Edw. T. 61.
- STRIX NISUELLA. Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2.
  p. XIV. No. 5. LA CHOUETTE
  choucouhou d'Afrique grand namaquois
- (315) Vaill. Oif. & Af. v. 1. pl. 39. VARIEGATED OWL Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 62.
- STRIX ULULA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 294. LA CHOUETTE OU GRANDE
- (689) CHÉVECHÉ (Male et Femelle) d'Europe Buff.

  pl. 438. BROWN OWL Lath. Syn. v.

  1. p. 140. Frisch T. 98.
- STRIX PASSERINA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.
  1. p. 296. LA CHÊVECHÉ, OU
- (690) PETITE CHOUETTE (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 439. LITTLE OWL Lath. Syn. v. 1. p. 150. Frisch T. 100.
- STRIX ALUCO. Gmel. Syst. 1. p. 252. LA HULOTTE d'Europe Buff. pl. 441. —
- (892) BROWN OWL Lath. Syn. v. 1. p. 134.
  No. 20.
- STRIX ALUCO. Junior (Mas) Mihi Strix Stridula Gmel. Syst. 1. p. 294. LA
- (693) HULOTTE JEUNAGE (Male) —— le Chat-Huant Buff. pl. 437. —— TAWNY OWL Lath. Syn. v. 1. p. 139. N°. 27.
- STRIX FLAMMEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 293.

  L'EFFRAIR OU LA FRESAIR d'Eu-

- (694) Fope (Male) Buff. pl. 440. WHITE OWL Lath. Syn. v. I. p. 138. No. 26.
- STRIX BRACHIOTOS. Gmel. Syst. 1. p. 289. LE DUC à COURTE CORNES, OU LE
- (891) BRACHIOTE d'Europe --- SHORT-EARED OHWL Lath. Syn. v. 1. p. 124. Nº. 9.
- STRIX NEBULOSA. Gmel. Syst. 1. p. 291. LA CHOUETTE NEBULEUSE, OU GRAN-
- DE CHOUETTE RAYÉE DE BLANC (775)d'Amerique Sonnini Edit. de Buffon v. 4. p. 202. - BARRED OWL Lath. Syn. v. p. 133.
- STRIX SCOPS. Gmel. Syst. 1. p. 290. LE PETIT DUC, OU LE SCOPS d'Europe
- (743) Buff. pl. 436. SCOPSEARED OWL Lath. Syn. v. 1. p. 129. No. 15.
- STRIX DASYPUS. (Femina) Bechstein Orn. Tasch. v. 1. p. 57. No. 12. — LA CHÊVÉ-
- (893) CHÉ PERLÉE d'Europe (Femelle) ----CHOUETTE PATTUE Meyer Deut. Orn. pl. enlu .
- STRIX Scops. Africanus (Femina) Mihi LE PE-TIT DUC, OU LE SCOPS d'Afrique Cap
- (720) de Bonne Espérance Vaill. Ois. d'Af. v. 1.
- STRIX SCOPS. Americanus (Mas) Mihi -Strix Brasiliana Lath. Ind. v. 1. p. 55.
- (607) - LE PETIT DUC, OU LE SCOPS d'Amerique (Male) —— le Scops roux, ou le Caboure d'Amerique Buff. v. 2. p. 503.

B 2 Edit. Edit. folio — BRASILIAN EARED OWL Lath. Syn. v. 1. p. 125. No. 10.

# GENUS PSITTACUS. GENRE PERROQUET. DIVISION CACATOË.

PSITTACUS ROSACÆUS. Gmel. Syst. 1. p. 331. — LE CACATOË À HUPPE ROU**GE** des Indes Orientales Buff. pl. 498 (550) GREAT RED CRESTED COCKATOO Lath. Syn. v. 1. p. 257. No. 62. -Edw. T. 160. - Vaill. perrog. Supp. v. 3. PSITTACUS SULPHUREUS. Gmel. Syst. 1. p. 330. \_\_\_\_ LE PETIT CACATOË à НИР-PE JAUNE des Moluques (Male) Buff. pl. (464)14. (le Grand) Lath. Syn. v. 1. p. 259. PSITTACUS BANKSII. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 107. No. 76. - LA CACATOE (535) BANKS (Male) de la nouvelle Galle du Sud. BANKIAN COCKATOO Lath. Supp. Syn. v. 1. p. 63. pl. 109. PSITTACUS BANKSII. (Hornotinus) --- LECA-CATOE BANKS DANS SON JEUN AGE (1007) (Femelle) Vail. perroq. Supp. v. 3. PSITTACUS FUNEREUS. Lath Ind. Orn. Supp. v. 2. p. XXII. No. 10. - LE CACATOË à OREILLES JAUNES, OU LE KAR-(542)RAT de la nouvelle Hollande - FUNE-RAL COCKATOO Nat. Misc. pl. 186.

PSITTACUS GALEATUS. (Mas et Femina) Lath.

Supp.

Supp. to Ind. Orn. v. 2, p. XXIII. No. 13.

(543)

LE CACATOË À TETE CRAMOISI

de la nouvelle Hollande (Male et Femelle) —

RED CROWNED PARROT Lath. Supp.

to Syn, v. 2. p. 369. pl. 140. — Grant.

difcy. n. f. w. p. 135. pl. enluminée.

PSITTACUS CRISTATUS. Gmel. Syst. 1. p. 331.

LE CACATOË À HUPPE BLANCHE

(848), des Moluques Buff. pl. 263. — Vaill.

Supp. — GREAT WHITE COCKATOO

Lath. Syn.v. 1. p. 256.

PSITTACUS ACCIPITRINUS. (Mas) Gmel. Syst.

1. p. 345. — LE PORREQUET CACA-

(463) TOË MAILLE de la Guiane (Male) Buff.pl. 526. — Vaill. Supp. perroq, .... Mailled Parrot Lath. Syn. v. 1. p. 267.

PSITTACUS LATHAMI. (Mas) Mihi — PSIT-TACUS BANKSII (Varrictas y) — LE CA-(544) CATOË LATHAM, OU CACATOË NOIR

(544) CATOË LATHAM, OU CACATOË NOIR

a QUEUE CRAMOISI (Male) de la Baije
Botanique — BANKIAN CACKATOO

Phyll. Bot. Bay. T. p. 166. — Lath. var. B.

# DIVISION ARA,

PSITTACUS MACAO. Gmel. Syst. 1, p. 312. No.
1. —— l'Ara rouge Buff. pl. 12.

(548) L'ARA MACAO de la Jamaïque Vaillant
H. N. des perroquets v. 1. pl. 1. — RED
B 3

- AND BLEUE MACKAW Edw. pl. 158.

   Lath. Syn. v. 1. p. 199. No. 1.
- PSITTACUS ARACANGA. Gmel. Syst. 1. p. 315. No. 52. Le petit Ara rouge
- (488) Buff. pl. 641. L'ARA CANGA de la Guiane Vaill. perroq. v. 1. pl. 2. RED AND YELLOW MACKAW Lath. Syn. v. 1. p. 201.
- PSITTACUS ARARAUNA. Gmel. Syst. 1. p. 313. l'Ara bleu Buff. pl. 36. —
- (508) L'ARA RAUNA du Bresil (Male) Vaill. perroq. v. 1. pl. 3. BLEU AN YELLO W
  MACKAW Lath. Syn. v. 1. p. 204. No.
  4. Edw. pl. 159.
- PSITTACUS MILITARIS. Gmel. Syst. 1 p. 313.

  No. 2. L'ARA MILITAIRE du Bre-
- (853) fil Vaill. perroq. v. 1. pl. 4. GREAT GREEN MACKAW Edw. pl. 313. MI-LITARY MACCAW Lath. Syn. v. 1. p. 202.
- PSITTACUS MAKAVOUANNA. Gmel. Syst. 1.
  p. 314. —— Periche Ara Buff. pl. 864.
- (533) L'ARA MACAVOUANNE de la Guiane (Male) Vaill. perroq. v. 1. pl. 7. ——
  PARROT MACCAW Lath. Syn. v. 1. p.
  205. N°. 5.
- PSITTACUS SEVERUS. Gmel. Syst. I. p. 315.

  1'Ara vert Buff. pl. 383. L'ARA

  (534) MARACANA (Male) du Bresil Vaill. perroq.

- v. 1. pl. 8. BRASILIAN GREEN MACKAW Edw. pl. 229. Lath. Syn. v. 1. p. 208.
- PSITTACUS ATERRIMUS. Gmel. Syst. 1. p. 330. Le Kaketoës noir Buff. v. 7.
- (373) p. 79. Edit. folio L'ARA NOIR & TROMPE de Java Vaill. perroq. v. 1. pl. 12. Black Cockatoo Lath. Syn. v. 1. p. 260. No. 66.

### DIVISION PERRUCHE.

- PSITTACUS GUJANENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 324. No. 70. La Perruche pavouane
- (551) Buff. pl. 167. PERRUCHE ARA PA-VOUANE (Male) de la Guiane Vaill. perroq. v. 1. pl. 14. — PAVOUANE PARROT Lath. Syn. p. 232.
- PSITTACUS VERSICOLOR. Gmel. Syst. 1. p. 327.

  No. 78. LA PERRUCHE ARA &
- (177) GORGE VARIÉE de Surinam Vaill. perroq. v. 1. pl. 16. Buff. pl. 144. —
  WAVED-BREASTED PARROT Leth.
  Syn. v. 1. p. 245. No. 44.
- PSITTACUS GUAROUBA. Gmel. Syst. 1. p. 320.

  La Perruche Jaune Buff. pl. 525.
- (512) LA PERRUCHE ARA GUAROUS
  BA de Caijenne (Male) Vaill. perroq. v. 1.
  pl. 18. BRASILIAN YELLOW PARS
  ROT Lath. Syn. v. 1. p. 225. No. 28.
- PSITTACUS TORQUATUS. Gmel. Syst. 1. p. B 4 321.

- 321. LA PERRUCHE à COLLIER
  (399) ROSE (Male) des Indes Buff. pl. 551. —
  Vaill. perr. v. 1. pl. 22. ROSE RINGED PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p.
  235.
- PSITTACUS TORQUATUS. (Pullus) LA PER-RUCHE à COLLIER ROSE JEUN AGE (395) Vaill. perr. v. 1. pl. 23.
- PSITTACUS CAROLINENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 320. pl. 13. LA PERRUCHE à TÊTE
- (477) JAUNE de la Caroline Buff. pl. 499. —

  Vaill. perr. v. I. pl. 33. CAROLINE

  PARROT Lath. Syn. v. I. p. 227.
- PSITTACUS ALEXANDRI. Gmel. Syst. 1. p. 321. —— LA GRANDE PERRUCHE à
- (527) COLLIER des îles Maldives Buff. pl. 642. —
  Vaill. perroq. v. I. pl. 30. ALEXANDRINE PARRAKEET Lath. Syn. v. I. p.
  234.
- PSITTACUS MOLUCCANUS. Gmel. Syst. 1. p. 316. LA PERRUCHE À TÊTE
- (461) BLEUE des Moluques Buff. pl. 743.

  Vaill. perr. v. I. pl. 24. RED BREASTED PARROT Lath. Syn. v. I. p. 212.

  No. 14.

OMNICOLORE des îles de la mer du Sud (330) Vaill. perroq. 7. 1. pl. 28.

PSITTACUS PONDICERIANUS. Gmel. Syst. 1.

P. 325. — LA PERRUCHE à MOUS-

- (404) TACHES Buff. pl. 517. LA PERRUCHE À POITRINE ROSE du Bengale
  Vaill. perroq. v. 1. pl. 31. MUSTACHO
  PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 238.
  N°. 38.
  - PSITTACUS PERTINAX. (Mas) Gmel. Syst. 1. p-322. No. 15. — LA. PERRUCHE à
  - (552) FRONT JAUNE, OU L'APUTE JUBA d'Amérique (Male) Buff. pl. 528. Vaill. perroq. v. 1. pl. 34. ILLINOIS PERROT Lath. Syn. v. 1. p. 228. N°. 30.
  - PSITTACUS NOVAE GUINER. Gmel. Syst.

    1. p. 319. LE LORY NOIR de la
  - (168) nouvelle Guinée Sonnerat Voy. p. 175. Vaill. perroq. v. 1. pl. 49. BLACK LO-RY Lath. Syn. v. 1. p. 221. No. 13.
  - PSITTACUS ORNATUS. Gmel. Syst. 1. p. 324.

    LA PERRUCHE LORI des Indes Buff.
  - (174) pl. 552. Vaill. perroq. v. 1. pl. 52. LORY PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 221. N°. 24.
  - PSITTACUS TABUENSIS. (Mas et Femina) Gmel.

    Syst. 1. p. 317. LA GRANDE PER-
  - (538) RUCHE à COLLIER ET CROUPION BLEUE de Tongataboo (Male et Femelle)

    Vaill. perroq. v. 1. pl. 55 et 56. TABUAN PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 214.

    No. 16, et Supp. to Syn. v. 2. p. 81. No. 2. Phill. voy. p. 253.
  - PSITTACUS VIRESCENS. Gmel. Syst. 1. p. B 5 326. —

(547) VARIÉES de Caijenne Buff. pl. 359. —
Vaill. perroq. v. 1. pl. 57. — GELLOW-WINGED PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 244. No. 43.

CHES SOUCI de Caijenne (Male) Vaill. (532) perrog. v. 1. pl. 58.

PSITTACUS AUSTRALIS. Lath. Ind. Orn. v. 1.
p. 104. No. 66. — LA PERRUCHE à

- (142) BANDEAU ROUGE de la nouvelle Galle du Sud Vaill. perroq. v. 1. pl. 48. CRIM-SON FRONTED PARRAKEET Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 87. N°. 12.
- PSITTACUS TAITIANUS. Gmel. Syst. 1. p. 329.

  LA PERRUCHE ARIMANON de
- (398) l'isle de Taiti Buff. pl. 455. fig. 2. Vaill. perroq. v. 1. pl. 65. OTHAEITAN BLUE PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 255.

WARDS des iles de la mer du Sud Vaill.

(524) perroq. v. 1. pl. 68.

PSITTACUS MELANOPTERUS. Gmel. Syst. 1.
p. 350. — LA PERRUCHE JAVANE

(179) Vaill. perroq. v. 1. pl. 69. — PETITE PERRUCHE de Batavia Buff. pl. 791. fig. 1. — BLACK-WINGED PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 316.

PSITTACUS TABUENSIS (Junior) — LA GRAN-

- (545) CRANDE PERRUCHE à COLLIER ET (545) CROUPION BLEUE de Tongataboo Jeun-age.
- PSITTACUS GUAROUBA. (Varietas) LA

  PERRUCHE ARA GUAROUBA Varieta

  (522) toute verte (Male)
- PSITTACUS MALACCENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 325. GRANDE PERRUCHE à LONG-
- (540) BRINS de Malac Buff. pl. 887. LA
  PERRUCHE à NUQUE ET JOUES
  ROUGES Vaill. perroq. v. 2. pl. 72. —
  MALACCA PARAKEET Lath. Syn. v.
  I. p. 241.
- PSITTACUS BENGALENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 325. —— Petite Perruche couleur de Rose
- (190) à long-brins, ou la Perruche de Mahé Buff.

  pl. 888. LA PERRUCHE FRIDYTUTAH du Bengale Vaill. perroq. v. 2. pl.

  74. ROSE-HEADED RING PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 239. Edw.

  pl. 233.
- PSITTACUS PAPUENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 317.

  LA PERRUCHE LORI PAPOU de la
- (546) terre des Papou Vaill. perroq. v. 2. pl. 77.—

  Sonnerat p. 175. pl. 3.— PAPUAN LORY Lath. Syn. v. 1. p. 215. No. 17.
- PSITTACUS PENNANTII. (Mas) Lath. Ind. Orn.
  v. 1. p. 90. LA PERRUCHE à LARGE
- (498) QUEUE BLEUE de la nouvelle Galle du Sud (Male) Vaill. perr. p. 78. PEN-

NANTIAN PARROT Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 61. — White's Journ. pl.

PSITTACUS PENNANTII. (Pullus) — LA PER-RUCHE & LARGE QUEUE BLEUE de la

(752) nouvelle Galle du Sud Jeun age (Male)

PSITTACUS FORMOSUS. (Mas) Lath. Ind. Orn.
v. 1. p. 103. — LA PERRUCHE INGAM-

- (539) BE, OU LE GOOLING NANG du Cap de Diemen (Male) Vaill. perroq. v. 1. pl. 32.

   BLACK SPOTTED PARRAKET Voy.

  d'Entercastaux atlas pl. 10. GROUND PARROT Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 86.

  No. 10.
- PSITTACUS DISCOLOR. (Femina) Lath. Ind. Orn.
  Supp. v. 2. p. 21. LA PERRUCHE
- (810) LATHAM (Femalle) des iles de l'Ocean Austral Vaill. perroq. v. 1. pl. 62.

  RED SHOULDERED PARRAKEET White's Journ. p. 263. Lath, Syn. Supp. v. 2. p. 90.
- PSITTACUS PUSILLUS. Lath. Ind. Ogn. v. 1. p. 106. LA PERRUCHE à FACE ROU-
- (537) GE des iles de l'Ocean Austral Vaill. perroq. v. 1. pl. 63, —— SMALL PARRAREET Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 88. No.
  13. —— White's Journ. p. 262.
- PSITTAGUS BISETIS. (Mas) Lath. Ind. Orn.

PSITTAÇUS CORNUTUS. Gmel. Syst. 1.p. 327. J

- PERRUCHE à CORNES, OU LE

(180) KERÉ de la nouvelle Caledonie (Male) Vaill.

perroq. Supp. —— HORNED PARROT

Lath. Syn. v. 1. p. 248. pl. 8. —— Cook's

Voy. v. 2. p. 110.

de la nouvelle Caledonie (Male) Vaill. per-

(959) roq. v. 1. pl. 64.

(960)

GILLAIRE d'Othaiti Vaillant pl. 71.

# DIVSION PERROQUET.

- PSITTACUS ERITHACUS. Gmel. Syst. 1. p. 332.

  LE PERROQUET CENDRÉ OU
- (510) JACO de Guiné Buff. pl. 311. Vaill. perroq. v. 2. pl. 99. ASCH-COLOU-RED PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 261. No. 68.
- PSITTACUS AMAZONICUS Lath. Ind. Orn.
  v. 1. p. 120.
- PSITTACUS OOHROCEPHALUS. Gmel. Syst.
- (509) PERROQUET AMAZONE de l'Amerique Meridionale (Male) Vaill. perroq. v. 2. pl. 84. YELLOW HEADED AMAZONS PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 282.
- PSITTACUS AMAZONICUS. (varietas) LE PERROQUET AMAZONE TAPIRÉ DE

JAU-

- (545) JAUNE quaterième variété Vaill. perroq. v. 2. pl. 89.
- PSITTACUS AURORA. Gmel. Syst. 1. p. 342.

  LE PERROQUET AMAZONE JAUNE
- (133) Buff. pl. 13. Vaill. perroq v. 2. pl. 90. — AURORA PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 301. N°. 106.
- PSITTACUS AURORA. Viridis (Mas) LE PERROQUET AMAZONE JAUNE VER- (1056) DATRE (Male) Varieté intermediaire. PSITTACUS PULVERULENTUS. Gmel. Syst. 1.
- p. 341. LE PERROQUET MEUNIER

  (536) de Cajjenne Ruff, pl. 861 Vaill, perroque
- (536) de Caijenne Buff. pl. 861 Vaill. perroq. v. 2. pl. 92. — MEALLY PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 291. N°. 94.

LORI RADHIA des Moluques (Male) Vaill.

(414) perroq. v. 2. pl. 94.

PSITTACUS DOMICELLA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 334. No. 26. — LE PERROQUET LORI

- (518) à COLLIER JAUNE (Male) des Indes Orientales Vaill. perroq. v. 2. pl. 95. —— Buff. pl. 119. —— BLUE-CAPED LORY Lath. Syn. v. 1. p. 271.
- PSITTACUS MOLUCCENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 334.

  LE PERROQUET LORI-NOIRA
- (529) des Moluques Vaill. perroq. v. 2. pl. 96.

   Buff. pl. 216. SCORLET LORY

  Lath. Syn. v. 1. p. 270. N°. 76. B.

Psi T-

- PSITTACUS OCHROPTERUS. Gmel. Syst. 1. p. 341. Le Crik à tète et Gorge jaune
- (553) Buff. v. 7. —— LE PERROQUET à EPAULETTES JAUNES de l'Amerique Meridionale Vaill. perroq. v. 2. pl. 98. bis. —— YELLOW-WINGED PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 289. N°. 93.
- PSITTACUS LEUCOCEPHALUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 338.
- (549) —— l'Amazone à tete blanche Buff.

  pl. 335.

  —— le Perroquet à ventre pourpre Buff.

  pl. 549.

FERROQUET à FACE ROUGE (Male et Femelle) de St. Domingue Vaill. pl. 107 et 108. — WHITE FRONTED PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 279. No. 88.

- PSITTACUS LEUCOCEPHALUS. (Pullus) —

  LE PERROQUET à FACE ROUGE dans
  (751) fon premier etat Vaill. perroq. v. 2. pl. 109.
  PSITTACUS ÆSTIVUS. Gmel. Syst. 1. p. 340. —

  LE PERROQUET AOUROU-COURAOU
- (531) (Male) de la Guiane Buff. pl. 547. Vaill. perroq. v. 2. pl. 110. COMMON AMAZONS PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 284. N°. 91.
- PSITTACUS FESTIVUS. Gmel. Syst. 1. p. 344.

  LE PERROQUET TAVONA de la
  (785) Guiane Buff. pl. 840. Vaill. perroq. v. 2.

(785) Guiane Buff. pl. 840. — Vaill. perroq. v. 2.

pl. 129. — FESTIVE PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 298.

PSITTACUS MELANOCEPHALUS. Gmel. Syst. 1. p. 346. — LE PERROQUET MAÏPOU-

(528) RI de Caijenne Buff. pl. 527. — Vaill.

perroq. v. 2. pl. 119 — WHITE-BREASTED PARROT Lath. Syn. v. 1. p. 305
— Edw. pl. 169.

PSITTACUS MENSTRUSIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 345.  $N^{\circ}$ . 39.

PSITTACUS PURPUREUS. (Femina) Gmel.

- (530) PERROQUET à CAMAIL BLEU (Male et Femelle) de la Guiane Vaill. porroq. v. 2. pl. 114 et 115. Le Perroquet à tete bleue Buff. pl. 384. (Male) le Perroquet varié de Caijenne Buff. pl. 408. (Femelle) BLUE HEADED PARROT Lath. Syn. v. L. p. 301. N°. 107 et 108. Edw. pl. 314 et 315.
- (169) LE PERROQUET LORI À SCAPULAIRE BLEU (Male) des Moluques Vaill.

  perroq. v. 2. pl. 123. FIRST BLACKCAPPED LORY Lath. Syn. v. 1. p. 273.

  Edw. pl. 170.

LORI & FRANCES BLEUES (Male) des

(347) Moluques Vaill. perroq. v. 2. pl. 93.

Psit-

PSITTACUS GRANDIS. Gmel. Syst. 1. p. 335. -LE PERROQUET GRAND LORI des Moluques Buff. pl. 683. - Vaill. perroq. v. 2. pl. 126. — GRAND LORY Lath. Syn. v. 1. p. 275. No. 81. LE PERROQUET GE-OFFROY (Male) des iles de l'Ocean Austral. (196) Vaill. Hist. Nat. des perroq. v. 2. pl. 112. LE PERROQUET GEoffroy à tête brune (le Male) dans (1060) son jeun age - non decrit. LE PERROQUET à RAQUETTES de la nouvelle Caledonie (856) Vaill. perr. Supp.

## DIVISION TUL

- PSITTACUS GALGULUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 349. LE TUI à COURONNE SAPHIR des iles Philippines (Male
  (170) et Femelle) Vaill. perr. Supp. Petite Perruche à tête bleue du Perou Buff. pl. 190.

  F. 2. SAPHIR CROWNED PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 312. Edw.
  t. 293. f. 2.
- PSITTACUS PULLARIS. Gmel. Syst. 1. p. 348.

  LA PERRUCHE À TÊTE ROUGE

  (171) de Guiné Buff. pl. 60. Vaill. perr. Supp.

  RED HEADED GUINEA PARRA-

KEET Lath. Syn. v. 1. p. 309.

C

- PSITTACUS PHILIPPENSIS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 349. LE COULA
  (173) CISSI des Philippines (Male et Femelle)

  Vaill. perroq. Supp. Buff. pl. 520. f.

  1 et 2 PHILIPPINE PARRAKEET

  Lath. Syn. v. 1. p. 311.
- PSITTACUS CAPENSIS. (Mas) Gmel. Syst. I.

  p. 350. PERRUCHE à AILES
  (176) BLEUES d'Afrique Buff. pl. 455. f. I. —

  Vaill. perr. Supp. BLUE WINGED

  PARRAKEET Lath. Syn. v. I. p. 317.
- P\$ITTACUS CANUS. Gmel. Syst. 1. p. 350. —
  LA PERRUCHE TUI À TÊTE GRISE de

  (181) Madagascar Buff. pl. 791. f. 2. Vaill.

  perroq. Supp. GREY-HEADED PAR-
- perroq. Supp. GREY-HEADED PAR-RAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 315. PSITTACUS PURPURATUS. (Mas) Gmel. Syst.
- (340) QUEUE POURPRÉE (Male) de Caijenne Sonnini Edit. de Buff. v. 28. p. 97. Vaill. perroq. Supp. PURPLE TAI-
- LED PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p.
- (849) Brésil (Male) Buff. v. 7. Vaill. perroq.

  Supp. LITLE BLUE AND GREEN
  PARRAKEET Lath. Syn. v. 1. p. 319. —
  Edw. t. 235.

– LE TUI À FACE

ROSE d'Afrique pays des Grands Namaquois (172) Vaill. persoq. Supp.

# GENUS RAMPHASTOS. GENRE TOUCAN.

- RAMPHASTOS Toco. Gmel. Syst. 1. p. 356. -LE TOUCAN TOCO de la Guljane Buff.
- pl. 82. Vaill. Histoire naturelle des (93) toucans pl. 2. - THE TOCO Lath. Syn. v. 1. p. 325. pl. 9.
  - RAMPHASTOS DICOLORUS. Gmel. Syst. 1. p. 356. — TOUCAN à GORGE JAUNE,
  - OU LE PIGNANCOIN de Caijenne Buff. (94) pl. 269. - Vaill. H. N. Toucans pl. 7. YELLOW THROATED TOUCAN Lath. Syn. v. 1. p. 325.
  - RAMPHASTOS ERYTHRORHYNCHOS. Gmel. Syst. 1. p. 355. — TOUCAN à GOR-
  - GE BLANCHE, OU LE TOCAN de l'Ame-(95)rique meridionale Buff. pl. 262. - Vaill. Touc. pl. 3. - RED BEAKED TOUCAN Lath. Syn. v. 1. p. 328.
  - RAMPHASTOS ERYTHRORHYN CHOS. (Varietas) --- TOUCAN à GORGE BLANCHE
- (580) ET COLIER JAUNE (Variété) du Tocan Vaill. H. N. Toucans pl. 4.
- RAMPHASTOS ARACARI. Gmel. Syst. 1. p. 354. - L'ARACARI VERD & CINTU-
- RONROUGE, OU LE GRIGRI du Bresil (520) Vaill. H. N. Touc. pl. 10. - Buff. pl. C 2

166.

- 166. ARACARI TOUCAN Lath. Syn. v. 1. p. 332.  $N^{\circ}$ . 10.
- RAMPHASTOS ARACARI. (Varietas) ARA-CARI VERD à CINTURON ROUGE, OU
- (334) LE GRIGRI dans son extrème Viellesse Vaill. H. N. Touc. pl. 12.
- RAMPHASTOS PIPERIVORUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 353. L'ARACARI
- (96) KOULIK du Bresil (Male et Femelle) Vaill.

  Toucans pl. 15 et 16. Buff. pl. 577 et
  729. PIPERINE TOUCAN Lath.

  Syn. v. 1. p. 334. Edw. pl. 330. (the
  Male)
- RAMPHASTOS VIRIDIS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 353. L'ARACARI VERD
- (87) de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 727
  et 728. Vaill. Touc. pl. 17 et 18. —
  GREEN TOUCAN Lath. Syn. v. 1. p.
  331. Edw. t. 329.

# GENUS MOMOTUS.

GENRE MOMOT.

- Momotus Brasiliensis. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 140. Ramphastos Momota Gmel.
- MOMOT du Bresil Buff. pl. 370. Vaill. Hist. Nat. des Geais et Rolliers pl. 37. BRASILIAN MOT MOT Lath. Syn. v. 1. p. 338. No. 10.

BUCEROS PANAYENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 360. LE CALAO à BEC CIZELÉ de l'Isle Panaye Buff. pl. 780. — Vaillant Hist. (358)Natur. des Calaos pl. 16. - PANAYAN HORNBILL Lath. Syn. v. 1. p. 353.  $N^{\circ}$ . 8. BUCEROS PLICATUS. (Mas) Lath. Ind. v. 1. p. 146. No. 12. - LE GRAND CALAO à (1025) CASQUE FESTONNÉ OU LE CALAO ANNUAIRE de l'Isle de Waigiou (Male). - voy. d'Entercasteaux pl. Atlas. -WHREATED HORNBILL Lash. Supp. to Syn. v. 2. p. 371. BUCEROS PLICATUS. (Junior) (Mas) - LE ..GRAND CALAO à CASQUE FESTONNÉ, (420) OU LE CALAO ANNUAIRE de l'Isle de Waigiou (dans fon Jeun age) — Le Calao Javan Vaill. Hist. des Calco: pl. 22. LE CALAO CASQUE FESTONNÉ à NUQUE ROUSSE des Celêbes (Femelle) Vaill. Hist. Nat. Calaos (475) pl. 21. · GRAND CALAO à CAS-QUE EN CROISSANT des Moluques Vaill. Hist. Nat. des Calaos pl. 13. - Sonnini (457) v. 20. p. 140. --- GRAND CALAO & CAS-QUE CONCAVE des lles de l'Archipel In-C 3 dien

(474) dien Vaill. Calaos pl. 3. — Sonnini v. 20. p. 136.

Buceros Ginginianus. Lath. Ind. Orn. v.
1. p. 146. — LE CALAO à CASQUE

(413) POINTU de Gingi Sonnerat. voy. Ind.

T. 121. — Vaill. Hist. Nat. des Calaos
pl. 15 — GINGI HORNBILL Lath.

Syn. Supp. v. 1. p. 71.

(852) v. 1. p. 141. — LE CALAO BIS-ERGOT, OU LE GOREGAN du Port Jackson Vaill. fuite des Calaos avec pl. Enlu. — NEW-HOLLAND CANNEL-BILL Lath. Supp. Syn. v. 2. p. 96. pl. 124.

Buceros Corniculatus. Mihi — Merops Corniculatus Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 276.

(511) — LE CORBI-CALAO des Îles de l'Océan pacifique Vaill. Hist. Nat. Calaos pl. 24. — Knob fronted Bee-eater Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 151.

GALA de Ceylan (Male) Vaill. Hist. Nat. Calaos. pl. 23.

(98) RONNÉ d'Afrique pays des Caffres (Femelle)

Vaill. Oif. d'Af. pl. Enl.

(523)

(778) GIBANDES d'Afrique Côte d'Augôle Vaill.
Oif. d'Af. pl. Enl.

BUCEROS ABYSSINICUS. Iah. Inl. Ornith v.

1. p. 143. — Gmel. Syst. 1. p. 358.

(1031) LE CALAO D'ABYSSINIE Buff. pl. 779.

— ABBA GUMBA Bruce's Travels v. 5.

p. 169. avec pl. — Abyssinian Hornbill Lath.

#### GENUS CROTOPHAGA.

Syn. v. 1. p. 347.

GENRE ANL

CROTOPHAGA MAJOR. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 336. — L'ANI DES PALETUVIERS (97) (Male) de l'Amerique Meridionale Buff. pl. 102. f. 1. — GREATER ANI Lath. Syn. v. 1. p. 362. N°. 2.

#### GENUS CORVUS.

#### GENRE CORBEAU.

- (619) RAVEN Lath. Syn. v. 1. p. 367. Frisch pl. 63.
- CORVUS CORONE. Gmel. Syst. 1. p. 365. No. 3. LA CORNEILLE d'Europe Buff.
- (697) pl. 483. CARRION CROW Lath; Syn. v. 1. p. 370. No. 3.
- (93) Buff. pl. 76. HOODED CROW Lath.

  Syn. v. 1. p. 374. No. 5. Frischs
  T. 65.
- Corvus Dauricus. Gmel. Syst. 1. p. 367. No.

- 12. LA CORNEILLE à SCAPULAI

  RE BLANC d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. v.

  2. pl. 53. La Cofneille du Senegal

  Buff. pl. 327. WHITE BREASTED

  CROW Lath. Syn. v. 1. p. 376. N°. 6.
- Corvus Graculus. Gmel. Syst. 1. p. 377.  $N^{\circ}$ . 18. LE CRAVE, OU LE CORA-
- (821) CIAS des Alpes Buff. pl. 255. RED LEGGED CROW Lath. Syn. v. 1. p. 401. N°. 39.
- Corvus Albicollis, Lath. Ind. Orn. v. 1. p., 151. No. 3. LE CORBEAU à NU-
- (6) QUE BLANCHE, OU LE CORBIVEAU d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 50. ——
  SOUTH-SEA RAVEN Lath. Syn. Supp. v,
  2. p. 107. N°. 2.
- CORVUS HOTTENTOTTUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 364. No. 1. — LE SIX-CRAINS
- (345) d'Afrique (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 82. Choucas à Moustaches Buff. pl. 226. HOTTENTOT CROW Lath. Syn. v. 1. p. 380.
- Corvus Frugilecus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 366. LE FREUX, OU LA FRAYON-
- (894) NE d'Europe (Male) Buff. pl. 484.

  ROOK Lath. Syn. v. 1. p. 372.

  Frisch T. 64.
- CORVUS PYRRHOCORAX. Lath. Ind. v. 1. p. 165,
   Gmel. Syst. 1. p. 376. LE CHOU-
- (739) CAS DES ALPES, OU LE CHOCARD

  Buji

Buff. pl. 531. — ALPINE CROW Lath. Syn. v. 1. p. 183.

CORVUS MONEDULA. Lath. Ind. v. 1.154. —

Gmel. Syst. 1. p. 367. — LE CHOUCAS

(1035) (Male) d'Europe Buff. pl. 523. — TIB

JACKDAW Lath. Syn. v. 1. p. 378.

#### DIVISION PIE.

- CORVUS PICA. Gmel. Syst. 1. p. 373. LA PIE d'Europe Buff. pl. 488. THE NAG-
- (698) PIE Lath. Syn. v. 1. p. 392. No. 29. —— Frisch T. 58.
- CORVUS MEXICANUS Gmel. Syst. 1. p. 375. N°.
  42. LA GRANDE PIE, OU L'HOCI-
- (397) SANA du Mexique Buff. p. 143. Edition folio. MEXICAN CROW Lath. Syn. v. 1. p. 395. N°. 34.
- Corvus Rufus. Lath Ind. Orn. v. 1, p. 161.

  No. 28. LA PIE ROUSSE du Benga-
- (556) le Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 59. Ru-FOUS CROW Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 112. No. 11.
- CORVUS VARIANS. Lath. Supp. to Ind. Orn. 2.
  2. p. XXVI. LA TEMIA, OU PIE
- (317) VERT CHANGEANT de Ceylan Vaill.

  Oif, d'Af. v. 2. pl. 56. CHANGEABLE CROW Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 119.

  No. 26.
- CORVUS COLLURIO. Daudin. Orn. v. 2. p. 246.
  C 5 \_\_\_\_\_ L2-

- LA PIE-PIEGRIÈCHE de Caijenne Vaill.
- (789) Oif. d'Af. v. 2. p. 60. Magpie Shrike Lath. Syn. v. 1. p. 192.
- Corvus Erythrorhynchos. Gmel. Syst. 1 p. 372. No. 34. Le Geay de la Chine à bec
- (394) rouge Buff. pl. 622. LA PIE BLE W à LONGUE QUEUE de la Chine Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 57. RED BILLED CROW Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 112. N° 12.

TÉE de la nouvelle Hollande (Male) —

(784) Guepier natté Buff. de Sonnini v. 18. p. 292.

#### DIVISION GEAL.

- Corvus Cristatus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 369. LE GEAI BLEU DU CANADA
- (337) (Male) Buff. pl. 529. Vaill. Geais pl. 45. BLUE JAY Lath. Syn. v. 1. p. 386.
  - LIER BLANC, OU GEAI LONGUP des
- (448) Iles de l'Ocean Indien Vaill. H. N. des Geais pl. 42.
- CORVUS CAYANUS. Gmel. Syst. 1. p. 370. —
  LE BLANCHE-COIFFE, OU LE GEAI
- (368) DE CAIJENNE Buff. pl. 373. CAIJENNE JAY Lath. Syn. v. j. p. 388,  $N^{\circ}$ . 22.

- CORVUS LIENTERICUS. Mihi Ampelis Garrulus Gmel. Syst. 1. p. 838. LE
- de Bohême Buff. pl. 261. Le grand Jaseur Vaill. Geais pl. 48. Bohemian Chatrer Lath. Syn. v. 3. p. 91.
- CORVUS CARYOCATACTUS. Gmel. Syst. 1. p. 370. LE CASSE NOIX d'Europe
- (595) (Male) Buff. pl. 50. Vaill. H. N. Geais pl. 55. — THE NUTCRACKER Lath. Syn. v. 1. p. 400. — Frisch T. 56.
- CORVUS GLANDARIUS. Gmel. Syst. 1. p. 368.

  No. 7. LE GEAY d'Europe Buff. pl.
- (699) 481. Vaill. Geais pl. 40. THE JAY Lath. Syn. v. 1. p. 384. Frisch T. 55.
- CORVUS STELLERI. Gmel. Syst. 1. p. 370. ——
  LE GEAI BLEU VERDIN de la Baye de
- (178) Nootka Vaill. H. N. Geais pl. 44. stellers crow Lath. Syn. v. 1. p. 387. No. 21.
- Corvus Aureus. Mihi. Pipra Rupicola Gmel. Syst. p. 998. LE COQ DE RO-
- (33) CHE de la Guyane Buff. pl. 39. Vaille Geais pl. 51. Roch-Manakin Lathe Syn. v. 4. p. 518.

## GENUS CORACIAS.

## GENRE ROLLIER.

- CORACIAS SENEGALENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 379. No. 8. LE ROLLIER à LONG-
- (449) BRINS d'Afrique Vaill. H. N. des Rolliers pl. 25. Le Rollier du Sénégal Buff. pl. 326. SENEGAL ROLLER Lath. Syn. v. 1. p. 408. Edwards t. 327.
- 'Coracias Bengalensis. Gmel. Syst. 1. p. 380. LE ROLLIER VARIÉ, OU
- (341) LE CUIT d'Afrique Vaill. Rolliers pl. 28. —
  Rollier de Mindanao Buff. pl. 285. —
  BENGAL ROLLER Lath. Syn. v. 1. p.
  410. No. 5.
- CORACIAS MADAGASCARIENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 379: No. 9. — LE. GRAND ROL-
- (55) LE VIOLET de Madagascar Vaill. H. N. Rolliers pl. 34. Buff. pl. 501. MADAGAS CAR ROLLER Lath. Syn. v. 1. p. 413. N°. 11.
- CORACIAS ORIENTALIS. Gmel. Syst. 1. p. 379.

  No. 4. LE ROLLE à GORGE BLEU
- (564) des Indes Orientales Vaill. Rolliers pl. 36. —
  Buff. pl. 619. ORIENTAL ROLL
  LER Lath. Syn. v. 1. p. 411. No. 6.
- CORACIAS MELANOPS. Mihi. ROLLIER &

- MASQUE NOIR, OU LE KAIALORA de (49) la nouvelle Hollande Vaill. rolliers pl. 30. —
  BLACK-FACED CROW Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 116. No. 19.
- CORACIAS GARRULA Gmel. Syst. 1. p. 378. —
  LE ROLLIER d'Europe Buff. pl. 486. —
- (854) Vaill. rolliers pl. 32. THE ROLLER Lath. Syn. v. 1. p. 406. Frisch T. 57.

LOTTE AIGUEMARIN d'Otaheite (Male)

(957\*) — non decrit.

CORACIAS VIOLACEA. (Mas et Femina) Mihi.

(718) GORGE BLEUE du Sénégal (Male et Femelle) Vaill. rolliers pl. 35. (la Femelle) pl. 35. (le Male)

#### GENUS ORIOLUS.

### GENRE LORIOT.

- ORIOLUS MELANOCEPHALUS. Gmel. Syst. 1.

  p. 383. \_\_\_\_\_ LE LORIOT à CAMAIL
- (140) NOIR de la Chine (Male) Buff. pl. 79.

  BLACK-HEADED INDIAN ICTERUS

  Edw. t. 77. Lath. Syn. v. 2. p. 451.

  Var. A.
- Oriolus Galbula. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 382. LE LORIOT d'Eu-
- (704) rope (Male et Femelle) Buff. pl. 26. ——
  Frisch T. 31. GOLDEN ORIOLE Lath.
  Syn. v. 2. p. 244.

LE LORIOT GRIVELÉ (475\*) de Java. - non decrit. LE LORIGE BICOLOR, OU LORIOT D'OR du Senegal (Male) ---(569\*) non decrit. - LE LORIOT à MASQUE NOIR d'Afrique (Male et Femelle) - non; (141\*) decrit. GENUS ICTERUS. GENRE TROUPIALE. ICTERUS VULCARIS. Daudin. Orn. v. 2. p. 340. — Oriolus leterus Lath. Ind. v. 1. (154) p. 176. - LE TROUPIALE NOIR ET. JAUNE d'Amerique Buff. pl. 532. ICTERIC ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 424. ICTERUS PERSICUS. Mihi. - Oriolus Persicus Lath. Ind. v. 173. — LE CASSIQUE à (155) POS JAUNE, OU L'YAPOU du Bresil (Male) Buff. pl. 184. - BLACK AND YEL-LOW ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 418. Icterus Hamorrhous (Mas et Femina) Mihi - Oriolus Hæmorrhous Lath. Ind. v. 1. p. 174. — CASSIQUE à DOS ROUGE, (383)OU LE JAPABA du Bresil (Male et Femelle) Buff. pl. 482. - RED RUMPED ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 420. ACTERUS CRISTATUS. (Mas et Femina) Mihi -Oriolus Cristatus Lath. Ind. v. 1. p. 174.-

2.4

GRAND

- (151) GRAND CASSIQUE HUPPÉ Buff. pl. 344. (le Male) GRAND CASSIQUE VERT Buff. pl. 328. (la Femelle) CRESTED ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 421. No. 3. et var. B.
- ICTERUS PHENICEUS. (Mas et Femina) Mihi Oriolus Phœniceus Lath. Ind. v. 1. p. 178. —
- (158) LE TROUPIAL COMMANDEUR de Virginie (Male et Femelle) Buff. pl. 402. (le Male) RED-WINGED ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 428.
- ICTERUS BALTIMORE. Mihi Oriolus Baltimore Lath. Ind. v. 1. p. 180. LE
- (429) BALTIMORE, OU LE TROUPIAL AURÔRE DU CANADA Buff. pl. 506. f. 1.

  BALTIMORE ORIOLE Lath. Syn. v. 2.
  p. 432.
- Icterus Spurius. Mihi Oriolus Spurius Lath;
  Ind. v. 1. p. 180. LE BALTIMORE
- (804) BâTARD du Canada Buff. pl. 506. f.
  2. —— Lath. Syn. v. 2. p. 433.
- ICTERUS XANTHORUS. Mihi. Oriolus Xanthorus Lath. Ind. v. 1. p. 181. LE CAR
- (159) ROUGE, OU PETIT CUL-JAUNE du Mexique (Male) Buff. pl 5. f. 1. LESSER BONANA ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 438.
- 1 CTERUS AMERICANUS. (Mas et Femina) Mihi — Oriokis Americanus Lath. Ind. v.
- (148) 1. p. 178. LE TROUPIALE à POI-

TRINE ROUGE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 236. — RED BREASTED ORIOLE Lath. Syn. v. 1. p. 430.

- ICTERUS ICTEROCEPHALUS. (Mas et Femina) Mihi Oriolus Icterocephalus Lath.
- (149) Ind. v. 1. p. 183. LE CARROUGE A
  COIFFE-JAUNE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 343. (le Male) —
  YELV HEADED STARLING Edw. t.
  3º Lath. Syn. v. 2. p. 441.
- ICTERUS WINOR. (Mas) Mihi Oriolus Minor Lath. Ind. v. 1. p. 185. LE PE-
- (505) TIT TROUPIAL NOIR du Brèfil (Male)

  Buff. pl. 606 f. i. LESSER BLACK

  ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 446.
- ICTERUS OLIVACEUS. Mihi Oriolus Olivaceus Lath. Ind. v. 1. p. 186. LE
- (150) TROUPIAL OLIVE de Caijenne Buff. pl. 606. f. 2 —— CAFJENNE OLIVE ORI-OLE Lath. Syn. v. 2. p. 447.
- ICTERUS NIGER. Mihi Oriolus Niger Lath.

  Ind. v. 1. p. 185. LE TROUPIAL
- (415) NOIR de St. Domingue Buff. pl. 534. —— BLACK ORIOLE Lash. Syn. v. 1. p. 445.
- (613) 182. CARROUGE à CAPE JAUNE de St. Domingue (Male) Buff. pl. 5. f.
  2. (la Femelle) ST. DOMINGO ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 439.

ICTER	RUS MEXICANUS. (Mas et remina) Mini —
• •	Oriolus Mexicanus Lath. Ind. v. 1. p. 179.
(807)	-LE TROUPIAL JAUNE à CALOTTE
(00/)	NOIRE de Caijenne (Male et Femelle) Buff.
į	pl. 533 BLACK CROWNED ORIO-
` _	LE Lath. Syn. v. 2. p. 431.
	LE CASSIQUE CUIVRÉ
	de la Louisiane (Male et Femelle) — non
(423*)	decrit.
ICTER	us Castaneus. Mihi — Oriolus Cas-
	taneus Lath. Ind. v. 1. p. 181 LE
(758)	CARROUGE VARIÉ de Caijenne Buff. pl.
•	607. f. I CHESNUT AND BLACK
	ORIOLE Lath. Syn. v. 2. p. 437.
ICTER	us Textor. (Mas et Femina) Mihi
	Oriolus Textor Lath. Ind. v. 1. p. 180. —
(806)	
(000)	(Male et Femelle) Buff. pl. 375 et 376.
·	
	WEEVER ORIOLE Lath. Syn. v. 1. p. 435.
. ******	LE TROUPIAL à MASQUE-
	NOIR d'Afrique pays des Namaquois (Male
(152*)	et Femelle) — non decrit.
,	LE CARROUGE À GORGE
	ROUSSE de l'Amerique Meridionale (Male)
· (157*)	— non decrit.
	LE CASSIQUE VIOLET à
	, FRAISE de l'Amerique Septentrionale (Male)
(612.)	non decrit.

# GENUS GRACULA. GENRE GRACULE. DIVISION MAINATTE.

#### DIVISION MARTIN.

- GRACULA CARUNCULATA. (Mas) Gmel. Syst.

  1. p. 399. LE PORTE-LAMBEAUX

  1. VACCIONE TOUR LO COSTOR (Male) W. 17. O.C.
- (459) d'Afrique pays des Casses (Male) Vaill. Oif.

  d'Af. v. 2. pl. 93. —— COCKSCOMB STARE Lath. Syn. v. 3. p. 9.
- GRACULA PAGODARUM. (Mas) Mihi Turdus Pagodarum. Gmel. Syst. 1. p. 816. N°.
- (388) 52. LE MARTIN-BRÂME des Indes Orientales (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 95. f. 1. — Pagoda Thrush Lath. Syn. v. 2. p. 30.

- GRACULA TRISTIS Gmel. Syst. 1. p. 401.

  LE MARTIN TRISTE des Philippines Buff.

  (127) pl. 219. PARADISE GRAKLE Lath.

  Syn. v. 2. p. 458.
- ROUGES du Bengale. Espèce nouvelle (588\*) non decrite.
- GRACULA CRISTATELLA. Gmel. Syst. 1. p. 397. LE MARTIN HUPPÉ de la Chi-
- (790) ne Merle Huppe de la Chine Buff. pl. 507. CRESTED GRAKLE Lath. Syn. v. 2. p. 464.
- GRACULA GRISEA. Daudin Ornith. v. 2. p. 286.

  LE MARTIN GRIS-DE-FER d'Afri-
- (610) que (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 95. f. 2. Sonnini. v. 10. p. 343.
- GRACULA LEUCOCEPHALA. (Mas) Mihi ——
  Turdus Leucocephalus Gmel. Syst. 1. p. 829.
- (131) LE MARTIN DOMINIQUAIN de la Chine (Male) Merle Dominiquain.

  Sonnerat voy. Ind. v. 2. p. 191. White headed thrush Lath. Syn. v. 3. p. 59.
- GRACULA CYANOTIS (Mas) Lath. Ind. Orn.

  Supp. v. 2. p. XXIX. LE MARTIN

  (962) OLIVE à JOUES BLEUES (Male) de la

  nouvelle Hollande. BLUE-EARED

  GRAKLE Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 130.

# GENUS PARADISEA. GENRE OISEAU DE PA-RADIS.

- PARADISEA APODA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 399. L'OISEAU DE PARADIS GRAND
- (106) EMERAUDE (Male) Buff. pl. 254.

  Vaillant Oif. paradis pl. 1. Audebert

  Oif. dores pl. 1. GREATER BIRD

  OF PARADISE Lath. Syn. v. 2. p. 471.
- PARADISEA REGIA (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 400. LE MANUCODE, OU

  (107) ROI DES OISEAUX DE PARADIS des iles

  Arou (Male et Femelle) Buff. pl. 496. —

  Vaill. Oif. para. pl. 7. Aud. pl. 5.
  - king of paradise bird Lath. Syn.
    v. 2. p. 475.
- -PARADISEA MAGNIFICA. Gmel. Syst. 1. p. 401.

  LE MANUC ÔDE À BOUQUETS de
- (109) la nouvelle Guiné (Male) Ruff. pl. 631. Vaill. Oif. para. pl. 9. Audeb. pl. 4. MAGNIFICENT PARADISE BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 477.
- PARADISEA ORIOLUS. (Mas) Mihi. Oriolus Aureus Gmel. Syst. 1. p. 483. LE
- (108) PARADIS ORANGE, OU LORIOT DE PARADIS (Male) des grandes Indes ——

  Vaill. Oif. para. pl. 18. Aud. pl. 11. —

  GOLDEN BIRD OF PARADISE Lath.

  Syn. v. 2. p. 483.

PA-

PARADISEA GULARIS. (Mas et Femina) Lath. Ind. v. 1. p. 195.

PARADISEA NIGRA. (Maset Femina) Gmel. Syst. 1. p. 401. No. 5.

(348) L'OISEAU DE, PARADIS L'INCOMPA-RABLE des grandes Indes (Male et Femelle) Vaill. Oif. par. pl. 20 et 21. (le Male) pl. 22. (la Femelle) — Audeb. pl. 14 et 15. (Male) - GORGET BIRD OF PARADI-SE Lath. Syn. v. 2. p. 478.

PARADISEA SEXETACEA. Lath. Ind. v. 1. p. 196.

PARADISEA AUREA. Gmel. Syst. 1. p. 402.  $N^{\circ}$ . 7.

MANUCODE à SIX FILETS de la nou-(438) velle Guiné (Male) Buff. pl. 633. - Vaill. Oif. para. pl. 12 et 13. — Audeb. pl. 6. — GOLD-BREASTED BIRD OF PARADISE Lath. Syn. v. 2. p. 481.

## DIVISION CALYBÉ.

PARADISEA CHALYBEA. Lath. Ind. Ornith. v. 1. p. 197. - Paradisea Viridis Gmel. Syst. 1.

p. 402. — LE CALYBÉ VERD de la nou-(639) velle Guinée Buff. pl. 634. — Vaill. Ois. de para. pl. 23. -- Sonnerat Voy. p. 164. t. 99. - Audeb. pl. 10. - BLUE-GREEN PARADISE BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 482.

PARADISEA TIBICEN. (Mas) Mihi —— Coracias Tibicen Lath. Ind. Orn. Supp. v. 2. p.

D 3 XXVII. (855) XXVII. — LE CALYBÉ TARRAWAR-NANG (Male) de la nouvelle Hollande —— Piping Roller Lath, Syn. Supp. v. 2, p. 122.

### GENUS TROGON. GENRE COUROUCOU.

- TROGON CURUCUI. (Mas et Femina) Gmel. Syst.
  1. p. 405. LE COUROUCOU à VEN-
- (392) TRE ROUGE (Male et Femelle) de Caijenne Buff. pl. 452. RED-BELLIED CU-RUCUI Lath. Syn. v. 2. p. 485.
- TROGON CURUCUI, Junior (Mas) LE COUROUCOU à VENTRE ROUGE Jeun-
- (393) age (Male)
- TROGON VIRIDIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 404.

  LE COUROUCOU à VENTRE JAU-
- (30) NE (Male) de Caijenne Buff. pl. 195. —— YELLOW-BELLIED CURUCUI Lath. Syn. v. 2. p. 488. No. 2.
- TROGON VIOLACEUS. Gmel. Syst. 1. p. 404.

  —— COUROUCOU à VENTRE ELANC
- (31) ET CHAPERON VIOLET de Caijenne Buff.

  pag. 380. v. 6. Edit. falia. VIOLET
  HEADED CURUCUI Lath. Syn. v. 2.
  - GRAND COUROUCOU
- (436\*) à VENTRE BLANC de Suriname (Male) non decrit.
- à VENTRE ROUGE de la Guijane (Male)

  (755\*) non decrit.

RINA, OU COUROUCOU À VENTRE

(29\*) ROSE d'Afrique (Male et Femelle)

non decrit. Espèce nouvelle.

GENUS BUCCO.

GENRE BARBU.

- BUCCO TAMATIA. Gmel. Syst. 1. p. 405.

  LE TAMATIA & GORGE ROUSSE de la
- (803) Guiane Buff. pl. 746. fig. 1. Vaill. H.

  N. des Barbus pl. 41. SPOTTEDBELLIED BARBET Lath. Syn. v. 2. p.
  494.
- Bucco Collaris. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 202. Bucco Capeniis Gmel. Syst. 1. p.
- (381) 406. LE TAMATIA 2 COLLIER NOIR de Cuijenne Buff. pl. 395. Vaill. Barbus pl. 42. COLLARED BARBET Lash. Syn. v. 2. p. 497.
- Bucco Macrorhynchos. Gmel. Syst. 1. p. 406. No. 5. —— LE TAMATIA NOIR
- (541) ET BLANC, OU LE PLASTRON NOIR de Caijenne Buff. pl. 689. Vaill. Barb. pl. 39. GREATER PIED BARBET Lath. Syn. v. 2. p. 498.
- Bucco Melanoleucos. Gmel. Syst. 1. p. 406. Le Barbu à Poitrine noire de
- (761) Caijenne Buff. pl. 688. fig. 2. —— PETIT TAMATIA 2 PLASTRON NOIR Vaill. Barbus pl. 40.

D 4

Buc.

Bucco	Dubius. Gmel. Syst. 1. p. 409.
	LE BARBICAN d'Afrique (Male) Buff. pl.
(92)	602. — Vaill. Barb. pl. 18. — DOUB.T-
•	FULL BARBET Lath. Syn. v. 2. p. 506.
	LE PETIT BARBICAN à
	VENTRE ROSE d'Afrique côte d'Angôle
(721)	Vaill. Barb. pl. A.
	LE PETIT BARBU, OU LE
(89)	
(09)	BARBION d'Afrique pays des Caffres Vaill.
n	Barb. pl. 32.
B U C C O	VIRIDIS. Gmel. Syst. 1. p. 408. — LE
	BARBU VERD, OU BARBU KOTTOREA
(90)	des Indes (Male) Buff. pl. 870. — Vaill.
\$ 0 m	Barb. pl. 38. — GREEN BARBET
	Lath. Syn. v. 2. p. 504. No. 11.
	LE BARBU RÔSE-GORGE
(467)	de Java (Male) Vaill. Barb. pl. 33.
	NIGER. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.
	p. 407. — LE BARBU à GORGE NOI-
(88)	RE du Cap de Bonne Esperance (Male et
(33)	Femelle) Buff. pl. 688. f. 1. — Vaill. Barb.
	pl. 29 et 30.
	•
<del></del>	Cuine (Male et Frank) K. W. D.
	Guiane (Male et Femelle) Vaille, Barb. pl.
(187)	23 et 24.
<del></del>	LE BARBU TACHETÉ Variété
.(σοs) .	(Male) Vaill. pl. 25.
	LE BARBU BARBICHON des
	Indes Orientales (Male) Vaillant Bar-
(590)	bus 11. 56.
· • (I	GE-

	***	CUCÙLUS.
- H T		7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

# GENRE COUCOU.

CUCULUS INDICATOR. Gmel. Syst. 1. p. 418. LE COUCOU INDICATEUR d'A-(91) frique pays Anteniquoi Buff. v. 6. p. 458. Ed. folio. - HONEY CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 533. CUCULUS VETULA. Gmel. Syst. 1 p. 410. No. 4. - LE COUCOU A LONG-BEC, OU, LE TACCO de la Jamaique Buff. pl. 772. — (643)LONG-BILLED RAIN CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 535. --- LE COUCOU GRIS BRON-(781\*) zé d'Afrique côte d'Angôle — Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl. 215. Cuculus Canorus. Gmel. Syst. 1. p. 409. -LE COUCOU d'Europe Buff. pl. 811. --COMMON CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. (24) -509. — Frisch pl. 40 et 41. Cuculus Caijanus Gmel. Syst. 1. p. 417. No. 14. - LE COUCOU ROUX, OU LE (22) PIAYE de Caijenne Buff. pl. 211. CAIJENNE CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 542. Cuculus Naevius. Gmel. Syst. 1. p. 413. -LE COUCOU BRUN VARIÉ DE ROUX de Caijenne Buff. pl. 812. — SPOTTED (343) CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 539. CUCULUS PERSA. Gmel. Syst. 1. p. 419. No. 17.

LE TOURACO de la côte de Guiné

D 5

(Male)

- (32) (Male) Buff. pl. 601. THE TOURAco Edw. T. 7. — Lath. Syn. v. 2. p. 545. N°. 46.
- ROUGE des Indes, Isle de Java non (380\*) décrit.
- Cuculus Ægipticus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p.
  420. No. 43. GRAND COUCOU &
- (409) AILES BRUNES, OU LE HOUHOU des grandes Indes (Male) Buff. pl. 824.

  EGIPTIAN CUCKOW Lath. Syn. v. 2.
  p. 523. No. 164.
- Cuculus Americanus. Gmel. Syst. 1. p. 414. LE COUCOU VIEILLARD à AILES
- (1014) ROUSSES de la Caroline Buff. pl. 816.

  —— CAROLINA CUCKOW Lath. Syn. v.
  2. p. 527.
- Cuculus Maculatus. Gmel. Syst. 1. p. 415. LE COUCOU TACHETÉ de
- (28) la Chine Buff. pl. 764. CHINESE SPOTTED CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 516.
  - VULGAIRE du Cap de Bonne Epérance
- (26) dans le Camdebo Vaill. Oif. d'Af. v. 5. pl. 200.
- CUCULUS CÆRULEUS Gmel. Syst. 1. p. 418. —
  LE COUCOU BLEU, OU LE TAIT-SOU
- (371) de Madagascar Buff. pl. 295. f. 2.

  BLUE CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 531.

Cucu	LUS AURATUS. Gmel. Syst. 1. p. 421
	LE COUCOU VERD DORÉ, OU LE DI-
(425)	
11.07	657. — GILDED CUCCOW Lath. Syn.
	v. 2. p. 527. No. 23. — Vaill. Oif. d'Af.
	v. 5. pl. 210.
	TRES PETIT COUCOU
	DORÉ de Java (Male) — non décris Es-
(480*)	pèce nouvelle.
	- ·
Cucu	LUS CLAMOSUS. Lath. Ind. Orn. Supp. v.
	2. p. XXX. No. 2. — LE COUCOU
(25)	CRIARD du Cap de Bonne Espérance Vaille
	Oif. d'Af. pl. 204. — NOISY CUCKOW
	Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 136.
Cucu	LUS TRANQUILUS. Gmel. Syst. 1. p. 417.
	No. 38. — COUCOU NOIR à BEC
(417)	_
(4-1)	Buff. pl. 512 Vaill. Barbus pl. 44
•	CAIJENNE BLACK CUCKOW Lath. Syn.
	v. 2. p. 543.
Tuen	LUS TENEBROSUS. Gmel. Syst. 1. p. 417.
	- PETIT COUCOU NOIR, OU LE BAR-
<b>/-</b> 0-\	
(782)	
	— Vaill. Barbus pl. 45. — WHITE
	RUMPED BLACK CUCKOW Lath. Syn. v.
	2. p. 544. N°. 43.
	LE COUCAL-GEANT,
	ou coucou rayé de blanc de la nou-
(562*)	velle Zelande (Male) - non decrit.

- LE MALKOHA

(469\*) VERDIN (Male) de Ceylan --- non decrit. - LE PETIT COUCOU à QUEUE FRANGÉ de la nouvelle Hollan-(895\*) de. — Espèce nouvelle non décrite. CUCULUS PYRRHOCEPHALUS. Gmel. Syst. 1. p. 417. - LE COUCOU MALKOHA de (468) Ceylan Sonnini Edit. de Buff. v. 18. p. 87. - RED HEADED CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 544. Cuculus Seniculus. Lath. Ind. Syn. v. 1. p. 219.7 Cuculus Minor. Gmel. Syst. 1. p. 411. (722) COUCOU DES PALETUVIERS, OU LE PETIT VIEILLARD de la Guiane. Buff. pl. 813. - MANGROVE CUCKOW Lath. Syn. v. 2. p. 537. LE PETIT COUCOU ECLA-TANT, OU LE COUCOU DE KLAAS (1050) d'Afrique - Vaill. Oif. d'Af. v. 5. pl. 212. Cuculus Edolio. (Mas et Femina) Mihi - Cuculus Melanoleucos Gmel. Syst. 1. p. 416. — LE COUCOU EDOLIO d'Afrique (Male et Femelle Vaill. Ois. d'Af. v. 5. pl. 207 et 208. (23) — Le Coucou Jacobin Buff. pl. 872. — (la Femelle) — Le Coucou à plaque dentelée aux ailes Sonnini Edit. de Bust. (lemale) - COROMANDEL CRESTED CUC-KOW Lath. v. 2. p. 520.

## GENUS YUNX.

# GENRE TORCOL.

YUNX TORQUILLA. (Mas et Femina) Lath. Ind. v. 1. p. 223. — Gmel. p. 423. — LE (869) TORCOL (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 698. — Frisch T. 38. — WRYNECK Lath. Syn. v. 2. p. 548.

### GENUS SITTA.

### GENRE TORCHEPOT.

SITTA EUROPEA. (Mas et Femina) Lath. Ind. v. 2.

p. — Gmel. p. 440. — LA SITELLE,

(897) OU LE TORCHEPOT d'Europe (Male et
Femelle) Buff. pl. 623. — Frisch T. 39. —

NUTHATCH Lath. Syn. v. 2. p. 648.

### GENUS PICUS.

## GENRE PIC.

Picus Martius. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.

p. 424. — LE GRAND PIC NOIR D'EU
(652) ROPE (Male et Femelle) Buff. pl. 596. —

GREAT BLACK WOODPECKER Lath.

Syn. v. 2. p. 552. — Frisch pl. 34.

Picus Principalis. Gmel. Syst. 1. p. 425. N°.

2. —— Grand Pic Noir Huppé à (587) BEC BLANC de la Caroline Buff. pl. 690.

—— WHITE BILLED-WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 553.

PICUS LINEATUS. Gmel. Syst. 1. p. 425.  $N^{\circ}$ . 4. L'QUANTOU, OU PIC NOIR HUPPÉ de

- (76) Caijenne (Male) Buff. pl. 717. LI-NEATED WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 556. No. 4.
- Picus Rurricollis (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 426. GRAND RE PIC HUF-
- (632) PÉ À TÊTE ET COU ROUGE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 612. RED-NECKED WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 558. N°. 5.
- Picus Hirundinaceus (Mas) Gmel. Syst. 1. p. . 426. No. 5. LE PETIT PIC NOIR
- (74) à VENTRE ROUGE de Caijenne Buff. pl. 694 fig. 2. LESSER ELACK WOOD-PECKER Lath. Syn. v. 2. p. 559. No. 7.
- Picus Erythrocephalus. Gmel. Syst. 1. p. 429. No. 7. Le pic noir à domi.
- (450) NO ROUGE de Virginie Buff. pl. 117. ——
  RED-HEADED WOODPECKER Lath. Syn.
  v. 2. p. 561.
- Picus Major. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 436. LE Pic Varié, ou l'epeche d'Europe
- (629) Buff. pl. 169. Frisch pl. 36. GREATED (SPOTTED WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 564. No. 12.
- Picus Minor. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 437. No. 19. PETIT PIC VARIÉ,
- (760) OU LE PETIT EPEICHE (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 598. Frisch pl. 37. —— LESTER SPOTTED WOOD-PECRER Lath. Syn. v. 2. p. 566.

des iles de l'Ocean Indien — non decrit Espèce (480\*) nouvelle.

GE de Java (Male) — Espèce nouvelle non (481\*) decrite.

Picus Viridis. Gmel. Syst. 1. p. 433. N°. 12.

— LE PIC VERD d'Europe (Male) Buff.

(759) pl. 371. — GREEN WOODPECKER

Lath. Syn. v. 2. p. 577. — Frisch pl. 39.

Picus Bengalensis. (Mas et Femina) Gmel.

Syst. 1. p. 433. No. 13. — Le pic verd

(482) DORÉ (Male et Femelle) du Bengate Buff. pl. 695. — BENGAL WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 580. — Edw. pl. 182.

Picus Senegalensis. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 430. —— LE PETIT PIC VERD RAYÉ

(635) d'Afrique du Sénégal (Male) Buff. pl. 345. fig. 2. — GOLD-BACKED WOODFEC-KER Lath. Syn. v. 2. p. 586. No. 33.

Picus Capensis. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.
p. 430. — Pic Verd à tête Grise

Picus Exalbidus (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 428.

No. 29. —— LE PIC JAUNE HUPPÉ

(519) de Caijenne Buff. pl. 509. — YELLOW WOODPECKER Lath. Syn. v. s. p. 591.

Picus Cinnamomeus. Gmel. Syst. 1. p. 428. No.

- · · · · · 3d. PIC JAUNE TACHETÉ, OU LE (73) MORDORÉ de Caijenne Buff. pl. 524. — FERRUGINOUS WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 592.  $N^{\circ}$ . 42. Picus Rufus. Gmel. Syst. 1. p. 432. No 38. -LE PIC ROUX RAYÉ de Caijenne (Male) (636) Buff. pl. 694. fig. 1. — RUFOUS WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 594. Picus Minutissimus. Gmel. Syst. 1. p. 423. TRES PETIT PIC, OU LE PIC-.(82) MIGNON de Caijenne Buff. pl. 786. fig. 1. MINUTE WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 596. No. 48. PICUS AURATUS. (Femina) Gmel. Syst. 1. p. 430. LE PIC A BAGUETTES D'OR, OU (75) AILES DORÉES de la Louisiane (Femelle) Buff. pl. 693. - GOLD-WINGED WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 507. Picus Cayanensis. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 428. LE PETIT PIC RAYÉ de Caijenne (633) (Male) Buff. pl. 613. — CAYENNE WOOD-PECKER Lath. Syn. v. 2. p. 590. Picus Multicolor. Gmel Syst. 1. p. 429. LE PIC BRUN À CRAVATE NOIRE de Caijenne Buff. pl. 863. — BLACK BREAS-TED WOODPECKER Lath. Syn. v. 2. p. 593. No. 43. Picus Nubicus. Gmel. Syst. 1. p. 439.
  - (80) L'EPEICHE ONDÉE ET TACHETÉE d'Afrique Buff. pl. 667. — NUBIAN WOOD-PECKER Lath. Syn. v. 2. p. 576. PI-

CHLOROCEPHALUS. Gmel. Syst. 1. p.
432. — PIC à GORGE JAUNE, OU LA
TETE D'OR du Brefil. Buff. pl. 784.
YELLOW HEADED WOODPECKER Lath.
Syn. v. 2. p. 595.
LE PIC à VEN-
TRE ENSANGLANTÉ de la Trinité (Male)
- non decrit.
LE PETIT PIC à
EAGUETTES D'OR d'Afrique riviere Dui
venhoek — non decrit.
LE PIC à MOU-
STACHES NOIRES d'Afrique pays des
Caffres — non decrit.
MEDIUS (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 436.
LE PIC VARIÉ À TÊTE ROUGE, OU PIC
MAR de Loraine (Male) Buff. pl. 611.
MIDDLE SPOTTED WOODPECKER Lath.
Syn. v. 2. p. 565.
Norvegicus. Lath. Ind. v. 1. 236. CANUS. Gmel. Syst. 1. p. 434.
1 101
PIC VERD à TÊTE GRISE de l'Europe
Septentrionale Edwards t. 65 GREY
HEADED GREEN WOODPECKER Lath.
Syn. v. 2. p. 583.
OLIVACEUS. Gmel. Syst. 1. p. 431.
LE PIC ROC d'Afrique pays des Caffres.
Vaillant Second voyage en Afrique p. 144.
Le Pic Marcheur Sonnini v. 19. p. 273.
CRIMSON-BREASTED WOODPEC-
KER Lath. Syn. v. 2. p. 599.
ELE

(1\*) OU GRAND PIC VERDATRE de Barbarie
—— non desrit.

LE PETIT PIC ROUGEA-

(83\*) TRE de Ceylan — non decrit.

### DIVISION PIC-GRIMPEREAU.

PICUS SCANDENS. Mihi. — Gracula Scandens Lath.

Syn. v. 1. p. 193. — LE PIC GRIMPE
(055) REALL, OU PICUCILE de Cajienne Ruff.

(955) REAU, OU PICUCULE de Caijenne Buff.

pl. 621. — Climbing Grakle Lath. Syn. v.
2. p. 467.

PICUS ORIOLUS. Mihi — Oriolus Picus Lath. Ind.

Orn. v. 1. p. 188. — LE TALAPIOT de

Caijenne Ruff. pl. 605 — Climbing Oriole

(86) Caijenne Buff. pl. 605 — Climbing Oriole Lath. Syn. v. 2. p. 453.

### GENUS GALBULA.

# GENRE JACAMAR.

GALBULA PARADISEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 458. — LE JACAMAR à LONGUE-

(364) QUEUE de Suriname (Male) Buff. pl. 271.

— Audebert jacamars pl. 3. — Vaillant Oif.

de paradis pl. 52. — PARADISE JACAMAR Lath. Syn. v. 2. p. 605. — Edw.

t. 10.

GALBULA VIRIDIS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

1. p. 459. — LE JACAMAR de la Guija(386) ne et du Brésil (Male et Femelle) Buff. pl.

(380) ne et du Breni (Maie et Femelle) Buff. pl. 238. — Audeb. pl. 1 et 2. — Vaill. pl.

47 et 48. — GREEN JACAMAR Lath. Syn. v. 2. p. 603.

GALBULA FLAVIROSTRIS. Mihi — Galbula
Albirostris (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn.

(712) v. i. p. 245. — LE PETIT JACAMAR à BEC JAUNE, OU LE VENETOU de l'Amerique Meridionale (Male et Femelle) — Audb. pl. 4 et 5. — Vaill. pl. 51. — WHITE-BILLED JACAMAR Lath. Syn. Supp. v. i. p. 113.

## GENUS ALCEDO. GENRE MARTIN-PÉCHEUR.

ALCEDO FUSCA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p.
454. — LE GRAND MARTIN PÉCHEUR
(212) de la nouvelle Guinée (Male et Femelle) Buff.
pl. 663. (le Male) — GREAT BROWN
KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 609.

ALCEDO CAPENCIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 455.

LE MARTIN-PÉCHEUR à GROS(206) BEC ROUGE d'Afrique Buff. pl. 590.

CAPE KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p.
610.

ALCEDO CAPENSIS. (Varietas) — LE MAR-TIN-PÉCHEUR BRUN à GROS-BEC (213) ROUGE d'Afri-que (Male) (varieté).

ALCEDO MAXIMA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 455. — LE GRAND MARTIN-PÉCHEUR (202) HUPPÉ d'Afrique (Male et Femelle) Buff. p. 679. — GREAT AFRICAN KINGS. FISCHER Lath. Syn. v. 2. p. 611.

Εo

- ALCEDO RUDIS Gmel. Syst. 1. p. 457. LE MARTIN-PÉCHEUR TACHETÉ, OU
- (201) PIE d'Afrique Buff. pl. 62. BEACK AND WHITE KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 612.
- ALCEDO SMYRNENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 456.

  B. MARTIN-PÉCHEUR BLEUET
- (207) ROUX de Madagascar Buff. pl. 232. GREAT GAMBIA KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 616.
- Alcedo Chlorocephala. Gmel. Syst. 1. p. 454. Le Martin Pécheur à Tê-
- (489) TE VERTE des Moluques Buff, pl. 783, GREEN-HEADED KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 620.
- ALCEDO ARTRICAPILLA. Gmel. Syst. 1. p. 453.

  LE MARTIN-PÉCHEUR à COIFFE
  - (486) NOIRE de la Chine Buff. pl. 673. BLACK-CAPED KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 624.  $N^{\circ}$ . 15.
  - ALCEDO ISPIDA. Gmel. Syst. 1. p. 448. LE MARTIN PÉCHEUR VULGAIRE d'Eu-
  - (667) rope (Male) Buff. pl. 77. THE COM-MON KINGSFISHER Lath. Syu. v. 2. p. 626. No. 16.
  - ALCEDO DEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 458. —
    LE MARTIN PÉCHEUR à LONGS BRINS
  - (485) de Ternate (Male) Buff. pl. 116. TERNATE KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 634. N. 24.

- ALCEDO BICOLOR. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 451. — MARTIN FÉCHEUR VERD
- (208) ET ROUX, OU MARTIN PECHEUR à COLLIER de Caijenne (Male et Femelle)

  Buff. pl. 592. RUFOUS AND GREEN KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 640.
- ALCEDO AMERICANA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 451. LE MARTIN-PÉCHEUR
- (387) VERD ET BLANC de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 591. WHITE AND GREEN KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 641.
- ALCEDO ALCYON. Gmel. Syst. 1. p. 451. ——
  LE MARTIN-PÉCHEUR HUPPÉ, OU LE
- (214) JAGUACATI de la Louisiane Buff. pl. 715.

   BELTED KINGSFISHER Lath. Syn.
  v. 2. p. 637.
- ALCEDO TORQUATA. (Maset Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 452. LE MARTIN-PÉCHEUR
- (203) HUPPÉ, ON L'ALATLI du Mexique (Male et Femelle) Buff. pl. 284. CINEROUS KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 636. No. 26.
- ALCEDO CRISTATA. (Mas) Gmel. Syst. I. p. 447. LE PETIT-MARTIN PÉCHEUR HUP-
- (204) PÉ, OULE VINTSI de l'isle de Luçon (Male)

  Buff. pl. 756. f. I. CRESTED KINGS
  FISHER Lath. Syn. v. 2. p. 652. No. 22.
- ALCEDO RUDIS. (Varietas) MARTIN-PÉ-E 3 CHEUR

	CHEUR HUPPE, OU LE PIE d'Affique
(205)	Buff. pl. 716 BLACK AND WHITE
	KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 612.
	- Edwards t. 9.
ALCE	DO SUPERCILIOSA. (Mas et Femina) Gmel.
	Syst. 1. p. 450 LE MARTIN-PÉ-
(209)	CHEUR PETIT-VERD à COLIER de
	Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 756. f.
	2. — SUPERCILIOUS KINGSFIS-
	HER Lath. Syn. v. 2. p. 643. — Ed-
	wards t. 245.
	LE MARTIN-CHAS-
••	SEUR d'Afrique, pays des Caffres (Male et
(210*)	Femelle) — non decrit.
	LE MARTIN-PÉ-
•	CHEUR AIGUE-MARIN à VENTRE
(731*)	SABLÉ de la Côte d'Angôle non de-
,	cris.
	LE MARTIN-CHAS-
	SEUR TOUZI de la Côte d'Angôle (Male
(786)	et Femelle) — Sonnini v. 20. p. 231.
	(Variété du Martin-pécheur bleu et noir.)
•	GRAND MARTIN-
	PÉCHEUR à PLASTRON, OU LE VER-
(787*)	
,	non decrite.
	LE PETIT MARTIN- PÉCHEUR
	AIGUE-MARIN de Java (Male) — non
(466*)	décris.
	WCG/130

- LE MARTIN-PÉCHEUR SACRÉ des iles
- (963) de l'Ocean Austral. Le Martin Pécheur des mers du Sud. — Sonnini v. 20. p. 219. — SACRED KINGSFISHER Lath. Syn. v. 2. p. 621. var. A.
- ALCEDO SENEGALENSIS. Lath. Ind. v. 1. p. 249.

   Gmel. Syst. 1. p. 455. LE MARTIN
- (1032) PÉCHEUR À TÊTE GRISE du Sénégal Buff.
  pl. 594. SENEGAL KINGSFISCHER
  Lath. Syn. v. 2. p. 618.

#### GENUS TODUS.

### GENRE TODIER.

- Todus Cinereus. Gmel. Syst. 1. p. 443. LE TIC-TIC, OU TODIER à VENTRE
- (310) JAUNE d'Amerique Buff. pl. 585. f. 3. CINEROUS TODY Lath. Syn. v. 2. p. p. 658.
- Todus Viridis. (Mas) Gmel. Syst. 1 p. 442. LE TODIER VERD de l'Amerique septen-
- (599) trionale (Male) Buff. pl. 585. f. 1. ——GREEN TODY Lath. Syn. v. 2. p. 657.
- Todus Regius. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 445.

  LE TODIER HUPPE, OU ROI DES
- (430) TODIERS (Male) Roi des Gobe-Mouches, ou Tyran huppé Buff. pl. 289. — KING-TODY Lath. Syn. v. 2. p. 662.

#### GENUS MEROPS.

## GENRE GUÈPIER.

- Merops Apiaster. Gmel. Syst. 1. p. 460. Le guèpier, ou grand guèpier
- (103) VERD d'Europe Buff. pl. 938. THE BEEATER Lath. Syn. v. 2. p. 667. No. 5.
- MEROPS VIRIDIS. Gmel. Syst. 1. p. 460. ——
  LE GUÈPIER VERD & COLLIER de Ma-
- (426) dagascar (Male) Buff. pl. 740. INDIAN BEE-EATER Lath. Syn. v. 2. p. 672. No. 2. Edw. pl. 183.
- Merops Nubicus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 464.  $N^{\circ}$ , 14. Le guèpier rouge à
- (454) TÊTE BLEUE de Nubie (Male) Buff. pl. 649. BLUE-HEADED BEE-EATER Lath. Syn. v. 2. p. 680.
- MEROPS NOVÆ SEELANDIÆ. Gmel. Syst. 1.
  p. 464. LE GUÈPIER KOGO de la
- (899) Nouvelle Zélande Buff. de Sonnini v. 12.

  p. 284. POE BEE-RATER Lath.

  Syn. v. 2. p. 682. No. 17. La Cravate
  frisée Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 92.

LE GUÈPIER à

COLLIER GROS BLEU de Malymbe.

(714) Guèpier à plumage Varié Sonnini v. 18. p. p. 278.

PETÍT GUÈPIER

(105) TAWA d'Afrique Vaill. 2. voy. d'Afriq. v. 2. p. 318. — Sonnini v. 18. p. 273.

--- PE-

à HAUSSECOL NOIR du Sénégal (Male)

(1046\*) — non decrit.

### GENUS UPUPA

GENRE HUPPE.

- UPUPA CAPENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 466. No.
  4. LA HUPPÈ NOIRE ET BLAN(418) CHE d'Afrique Buff. pl. 697. Audeb.
  Oif. Dorés pl. 3. MADAGASCAR
- Oif. Dores pl. 3. MADAGASCAR
  HOPPO Lath. Syn. v. 2. p. 690.
- UPUPA EPOPS. Gmel. Syst. 1. p. 466. LA
  HUPPE d'Europe Buff. pl. 52. Au-
- (900) deb. pl. 1. THE HOPPO Lath. Syn v. 2. p. 687. — Frisch T. 43.
- UPUPA PROMEROPS. Gmel. Syst. 1. p. 467. LE PROMEROPS d'Afrique, Cap de Bonne
- (110) Esperance Buff. pl. 637. Audeb. pl. 4. —— CAPE PROMEROPS Lath. Syn. v. 2. p. 692.
- frique, Roijaume du Congo. Audeb. pl.

  (189) 2. Buff page 511. v. 6. Var.
- TRE des iles de la mer pacifique Audeb.

  (568) pl. 5.
- TRON BLEU, OU LE PROMÉFIL de la (525\*) nouvelle Guinée (Male) non decrit.
- UPUPA ERYTHRORYNCHOS. (Mas et Femina)
  E 5

  Lath.

Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 280. — LE PRO
(99) MEROPS à BEC ROUGE, OU LE GRIMPART d'Afrique (Male et Femelle) Audeb.
pl. 6. — RED-BILLED PROMEROPS
Lath. Syn. Supp. p. 124. t. 110.

NAMAQUOI d'Afrique, pays des grands
o\*) Namaquois — non decrit.

UPUPA SUPERBA. (Mas et Femina) Lath. Ind. v. 1. p. 279. — Upupa Papuensis Lath.

(254) Ind. p. 279. (Femina) — Upupa Magna (Mas) — Upupa Fusca (Femina) Gmel. Syst. 1. p. 468. — LE GRAND PROMEROPS de la nouvelle Guinée (Male et Femelle) Buff. pl. 639. (le Male) pl. 638. (la Femelle) — Audeb. pl. 7. et 8. — Lath. Syn. v. 2. p. 695. t. 32. (le Male) p. 694. N°. 4. (la Femelle)

UPUPA SUPERBA. Hornotinus (Mas) — LE GRAND PROMEROPS de la nouvelle Gui-(372) née Jeun age (Male)

GENUS CERTHIA. GENRE GRIMPEREAU.

CERTHIA SENEGALENSIS. (Mas) Gmel. Syst. 1.

p. 477. N°. 14. — SOUÏMANGA VIO(453) LET à POITRINE ROUGE d'Afrique,
Rivière du Sénégal (Male) Buff. v. 6. p. 335.

Edit. folio. — Audebert Oiseaux dorés v. 2.

pl. 8. —	SENEGAL	CREEPER	Lath
v. 2. p. 209	•		

CERTHIA CHALYBEA. Gmel Syst. 1. p. 475,
No. 10. — LE SOUÏ-MANGA 2 COLLIER

(116) d'Afrique, pays Anténiquoi Buff. pl. 246.

f. 3. — Aud. v. 2. pl. 13. — COLLARED CREEPER Lath. Syn. v. 2. p.
709.

FRONT DÖRÉ (Male et Femelle) d'Afrique (113) Audeb. v. 2. pl. 516.

TE BLEUE de Malimbe (Male) Audeb. v. (705) 2. pl. 7.

CERTHIA SPERATA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 477. — LE SOUÏ-MANGA à CINTU-

(118) RE MARON des Philippines (Male) Buff.
v. 6. page 340. Edit. folio. — Audeb. pl.
16. — RED BREASTED CREEPER
Lath. Syn. v. 2. p. 706.

TURE BLEUE du Sénégal — Audeb.

(114) v. 2. pl. 10.

CERTHIA FAMOSA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

1. p. 481. — LE GRAND SOUÏ-MANGA

(111) à LONGUE QUEUE du Cap de Bonne Esperance (Male et Femelle) — Buff. pl. 83 (le Male) — Audeb. v. 2. pl. 37 et 38. — FAMOUS CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 720. No. 21.

- CERTHIA VIOLACEA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 482. LE SOUÏ-MANGA
- (112) 2 CAPUCHON VIOLET d'Afrique (Male et Femelle, Buff. pl. 670. f. 2. (le Male) Audeb. v. 2. pl. 39. VIOLET-HEADED CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 718. No. 10.
- CERTHIA PULCHELLA. Gmel. Syst. 1. p. 481.

  No. 19. LE PETIT SOUÏ-MANGA À
- (452) LONGUE QUEUE de la Côte de Guiné

  Buff. pl. 670. f. 1. Audeb. pl. 40. —

  BEAUTIFUL CREEPER Lath. Syn. v.
  2. p. 719.
- DROIT, OU LE MIGNON d'Afrique, pays

  (115\*) des Caffres (Male et Femelle) Audeb. v. 2.

  pl. 75. (la Femelle) Le Male non de-
- Crit.

  LE SOUÏ-MANGA ROU
  GE ET GRIS des Indes Orientales Au
  (66) deb. v. 2. pl. 36.
- CERTHIA MURARIA. Gmel. Syst. 1. p. 473.—
  LE GRIMPEREAU DE MURAILLE
- (101) d'Europe Buff. pl. 372. Audeb. v. 2. pl. 73. WALL CREEPER Lath Syn. v. 2. pl. 730. Edw. pl. 361.
- à LUNETTES du Port Jackson Audeb.

  (707) v. 2. pl. 28.
- CERTHIA CINNAMOMEA. Gmel. Syst. 1. p. 480.

	GRIMPEREAU ROUX, OU LE CINNA-
(163)	Mon de Caijenne Audeb. v. 2. pl. 62.
	CINNAMON CREEPER Lath. Syn. v. 1.
	298. N°. 56.
	LE SOUÏ-MANGA VIO-
	LET à VENTRE JAUNE d'Afrique Deserts
(622*)	du Zahara (Male et Femelle) - non decrit.
	Espèce nouvelle.
	LE SOUÏ-MANGA 2
	VENTRE AURÔRE des Iles de l'Océan pa-
(623*)	cifique non decrit.
•	CINTE des lles de l'Ocean pacifique (Male)
(708*)	— non décrit.
	LE SOUÏ-MANGA À
	COLLIER BLEU ET ROUGE de Malimbe
(706)	(Male) — Souimanga verd et brun. —
••	Audeb. v. 2. pl. 24.
	LE SOUÏ-MANGA À
	FLANCS SOUCI, OU SOUÏ-MANGA NA-
(t30*)	MAQUOI d'Afrique — non decrit.
CERTI	HIA CAYANEA. Gmel. Syst. 1. p. 483. —
₹, ,	LE GUIT-GUIT-NOIR ET BLEU à
<b>(</b> 85)	TÊTE VERTE de Caijenne Buff. pl. 83 f.
	2. — Audeb. pl. 44. — BLACK AND
•	BLUE CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 724:
CERT	HIA CAYANEA. (Varietas) — LE GUIT-
	GUIT NOIR ET BLEU À TÊTE VERTE
(309)	varieté, ou Oiseau en mue. — Audeb. v. 2.
	pl. 42.
CERT	HIA CAYANEA. Gmel. Syst. 1. p. 475. — LE
	GUIT-

OUIT-GUIT VERD TACHETÉ à GOR-GE ROUSSE de Caijenne (Male) Buff. pl. (389) 682 f. 2. CAYENNE CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 728. No. 29. CERTHIA CERULEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 474. - LE GUIT-GUIT NOIR ET (506)BLEU, OU LE BICOLOR de la Guiane (Male) Audeb. v. 2. pl. 45. — BLUE CREPER Lath. Syn. v. 2. p. 725. ۲. Edw. t. 21. CERTHIA CÆRULEA (Varietas) - LE GUIT-GUIT NOIR ET BLEU, OU LE BICO-(487) LOR de la Guiane (en Mue) - non figuré. CERTHIA SPIZA (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 476. — LE GUIT-GUIT VERD à (410) CAPUCHON NOIR (Male et Femelle) du Brésil Buff. p. 362. v. 6. — Audeb. v. 2. pl. 47 et 48. --- BLACK-HEADED CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 726. CERTHIA SPIZA. (Varietas) - LE GUIT-GUIT VERD à CAPUCHON NOIR du Brésil jeun age — Audeb. v. 2. pl. 49. CERTHIA FLAVEOLA. Gmel. Syst. 1. p. 479. LE GUIT-GUIT SUCERIER des Antilles (164) Buff. v. 6. p. 368. — Audeb. pl. 51. YELLOW - BELLIED CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 737.

CERTHIA VESTIARIA. (Mas) Lath. Ind.
Orn. v. 1. p. 282.
CERTHIA COCCINEA. — Gmel. Syst. 1.

(102)	HEOROTAIRE ROUGE d'Otaheite (Male)  Audeb. v. 2 pl. 52. — HOOK-BILLED
	RED CREEPER Lath. Syn. v. 2. p. 704.
	PRE des Indes (Male) Audeb. v. 2. pl. II.
(929)	PURPLE INDIAN CREEPER Edwards to 265. Figure superieure.
	TANT de la Côte de Guiné (Male) Audeb.
(69)	v. 2. pl. 2.
(984*)	GRACULE de la nouvelle Zelande —— non decrit.
(985*)	LOUTÉ de la nouvelle Galle Meridionale (Male) — non decrit.
(670*)	BICAPIL de la nouvelle Hollande — non decrit.
GENUS	TROCHILUS. GENRE MELLIVORE.
TROCE	Suct I a 18 (Mas et Femina) Gmel.
(432)	Syst. I. p. 485. — LE COLIBRI TOPAZE  (Male et Femelle) de Caijenne Buff. pl. 599.  fig. I. — Audebert Oifeaux dorés v. I. pl.  2. et 3. — TOPAZ HUMING-BIRD
Troci	Lath. Syn. v. 2. p. 746. HILUS JUGULARIS. Gmel. Syst. 1. p.
	489. — Le Colibri à gorge carmin Buff.
<b>(433)</b>	pige 39. v. 7. Edis. felie LE COLIBRI
	GRE•

GRENAT de St. Domingue Audeb. v. 1. pl.
4. — RED-BREASTED HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 735. No 10.

TROCHILUS CAMPYLOPTERUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 499. No. 65.

TROCHILUS CINEREUS. (Femina) Gmel. Syst. 1. p. 490.  $N^{\circ}$ . 41.

COLIBRI à LARGES TUYAUX (Male et Femelle) de Caijenne ——— Audebert pl.

- (121) 5. (la Femelle) et pl. 21. (le Male) ——

  ASCH-BELLIED HUMING-BIRD Lath.

  Syn. v. 2. p. 759. (la Femelle) —— BROAD

  SHAFTED HUMING-BIRD Lath. Syn.
  v. 2. p. 765. (le Male).
- TROCHILUS PECTORALIS. Lath. Ind. v. 1. p. 306. Trochilus Gramineus Gmel. Syst.
  - (119) I. p. 488. LE COLIBRI HAUSSECOL VERD de l'Amerique Septentrionale

    Buff. pag. 47. v. 7. Audeb. v. 1. pl. 9.

     BLACK BREASTED HUMINGBIRD Lath. Syn. v. 2. p. 756. N°. 16.
  - TROCHILUS PECTORALIS. (Varietas) Mihi
    Trochilus Gularis Lath. Ind. v. 1. p. 306.
  - Trochilus Maculatus Gmel. Syst. 1. p. 488.

    LE COLIBRI à CRAVATE VERT
    TE (Varieté du hausse-col verd) Buff. pl.

    671. f. 1. Audeb. v. 1. pl. 10. —

    Green Throated humming bird Lath. Syn.

    2. 2. p. 755.

TROCHILUS HIRSUTUS. Gmel. Syst. 1. p. 490.

- LE COLIBRI À VENTRE ROUX

  (365) ET PIEDS VETUS du Bresil Audeb. pl. 16.

   RUFOUS BELLIED HUMING-BIRD

  Lath. Syn. v. 2. p. 760. No. 21.
- TROCHILUS THAUMANTIAS. Gmel. Syst. 1. p. 489. LE PETIT COLIBRI ROUX à
- (408) QUEUE DE PIE (Male) Le Colibri Buff. p. 50. v. 7. Ed. folio Le brinblanc Jeun age Audeb. v. 1. pl. 19. Admirable Huming-bird Lath. Syn. v. 2. p. 763.
- TROCHILUS VIRIDIS. (Mas) Audebert
  TROCHILUS MARGARITACEUS. Gmel.

  Syst. 1. p. 490. (Femina)

  COLIBRI GROS-VERD (Male et Femelle)
- (513) des lles de l'Amerique Septentrionale Audeb.
  v. 1. pl. 15. (le Male) et pl. 16. (la Femelle).
- TROCHILUS MANGO. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 491. LE COLIBRI à PLAS-
- (356) TRON NOIR (Male et Femelle) de la Jamaique Buff. pl. 680. fig. 2. Audeb. pl. 7. (le Male) (la Femelle n'est pas decrite) MANGO HUMMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 758. No. 18.
- TROCHILUS HOLOSERICEUS. Gmel. Syst. 1. p.
  491. LE COLIBRI VERD ET NOIR
- (126) à CINTURON BLEU du Mexique Buff. v. 7. p. 42. Ed. folio. Audeb. v. 1. pl. 6. BLACK BELLIED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 754.
- TROCHILUS SUPERCILIOSUS. (Mas et Femina)

  F Gmel.

- Gmel. Syst. 1. p. 485. LE COLIBRE

  (407) à BRINS-BLANC (Male et Femelle) de la

  Guiane Buff. pl. 600. fig. 3. Audeb. pl. 17. (le Male) LONG-TAILED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p.

  748. N°. 4.
- TROCHILUS MELLIVORUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 499. L'OISEAU-
- (123) MOUCHE à COLLIER DIT LA JACOBINE (Male et Femelle) de Caijenne Buff. pl. 640. fig. 2. Audeb. pl. 23 et 24. WHITE-BELLIED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 765. N°. 31.
- TROCHILUS AURITUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 493. L'OISEAU-MOUCHE
- (405) à OREILLES BLEURS (Male et Femelle) de la Guiane Buff. v. 7. p. 25. Ed. folio.

   Audeb. pl. 25 et 26. VIOLETEARED HUMING-BIRD Lath. Syn v. 2. p.
  767. N°. 33.
- TROCHILUS MOSCHITUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. p. 494. L'OISEAU-MOUCHE
- (500) RUBIS-TOPAZE (Male et Femelle) de Caijenne Buff. pl. 227. fig. 2. Audeb. pl. 29. (le Male) pl. 55. (la Femelle) RUBY-NECKED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 779. No. 46.
- TROCHILUS MOSCHITUS. (Pullus) —— L'OI-SEAU MOUCHE RUBIS-TOPAZE (Male (514) Jeun 2ge) Audeb. v. 1. pl. 30.

Tro.

- TROCHILUS COLUBRIS (Mas) Gmel. Syst. 1.p. 492. - L'OISEAU MOUCHE RUBIS
- (Male) d'Amerique Buff. v. 7. p. 10. Ed. (428) folio. - Audeb. v. I. pl. 31. - RED-THROATED HUMMING - BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 769.  $N^{\circ}$ . 35.
- TROCHILUS COLUBRIS (Pullus) --- L'OISEAU MOUCHE RUBIS (Male Jeun age) Audeb. (125) v. I. pl. 33.
- TROCHILUS FURCATUS (Mas) Gmel. Syst.1. p. 486. — L'OISE A U- MOUCHE VIOLET
- (412) A QUEUE FOURCHUE (Male) de la Jamaique- Buff. v. 7. p. 30. Ed. folio. Audeb. v. 1. pl. 34. - LESSER FORK-TAILED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2'. p. 751.
- TROCHILUS FURCATUS. (Pullus) L'OISEAU-MOUCHE VIOLET à QUEUE FOUR-CHUE (Male Jeun age) - non decrit. (577)
- . TROCHILUS ORNATUS (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 497. \_\_\_\_ L'OISEAU MOU-
  - CHE HUPPECOL (Male et Femelle) de la (378) Guiane Buff. pl. 640. fig. 3. - Audeb. v. 1. pl. 49 et 50. --- TUFFED-NEC-KED HUMING . BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 784. No. 55.
- TROCHILUS CRISTATUS. (Mas) Gmel Syst. 1. p. 498. — L'OISEAU-MOUCHE HUP-- (124) PÉ de Caijenne (Male) Buff. pl. 227. fig. 1.
  - \_\_\_ Audeb. v. 1. pl. 47. \_\_ CRESTED

creen huming-bird Lath. Syn. 7.
2. p. 783. No. 53. — Edwards pl. 37.

TROCHILUS VIRIDISSIMUS. (Mas et Femina)

Gmel. Syst. 1. p. 496. — L'OISEAU-

(120) MOUCHE EMERAUDE, OU TOUT VERD (Male et Femelle) Audeb. v. 1. pl. 42 et 43. — ALL-GREEN HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 786. No. 58. — Edwards pl. 360. fig. 1.

TROCHILUS VIRIDIS. Audeb. Oif. dorés — L'OI-SEAU-MOUCHE VERD DORÉ à QUEUE

(269) BLANCHE ET VERTE de la Guijane ——
Audeb. v. 1. pl. 41.

TROCHILUS SAPHIRINUS. Gmel. Syst. 1. p. 496. L'OISEAU-MOUCHE SAPHIR de Caijenne

(382) Buff. v. 7. p. 20. Ed. folio. — Audeb. v.
1. pl. 35. — SAPHIR HUMING-BIRD
Lath. Syn. v. 2. p. 775. No. 39.

TROCHILUS SAPHIRINUS. (Junior) — L'OI-SEAU-MOUCHE SAPHIR passant du jeun

(406) age à l'age fait.

Trochilus Longicaudus. (Mas) Gmel.

Syst. 1. p. 498. — L'OISEAU-MOU-

(396) CHE À RAQUETTES de l'Amérique Meridionale (Male) Buff. v. 7. p. 18. Edit. folio — Audeb. v. 1. pl. 52. — RACKET-TAILED HUMING-BIRD Lath. Syn. v. 2. p. 782.

TROCHILUS MAUGAEUS. (Mas) Audebert — (517) L'OISEAU-MOUCHE MAUGE de Porto-Rice

Rico (Male) — Audeb. Oif. dorés v. I. pl. 37. - L'OISEAU - MOUCHE VERD DE MER d'Amerique (Male) ---(555\*) non decrit. GENUS STURNUS. GENRE ETOURNEAU. STURNUS VULGARIS. Gmel. Syst. 1. p. 801. ---L'ETOURNEAU d'Europe Buff. pl. 75. COMMON STARE Lath. Syn. v. 3. p. 2. STURNUS CAPENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 802. ---L'ETOURNEAU PIE du Cap de Bonne Espérance Buff. pl. 280. - CAPE STARE (156)Lath. Syn. v. 3. p. 5. STURNUS LUDOVICIANUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 802. — LE STOUR-(339) NE, OU L'ETOURNEAU DE LOUISIANE (Male et Femelle) Buff. pl. 256. (le Male) LOUISIANE STARE Lath. Syn. v. 3. p. 6. STURNUS MILITARIS. Gmel. Syst. 1. p. 803.  $N^{\circ}$ . 6. — LE BLANCHERAIE, OU ETOURNEAU DES TERRESMAGELLA-(422)NIQUES Buff. pl. 113. - MAGELLANIC STARE Lath. Syn. v. .3 p. 7. STURNUS NABIROP. Daudin. Orn. v. 2. p. 312. - Turdus Auratus Gmel. Syst. 1. p. 819. (144)  $N^{\circ}$ . 64. — LE NABIR OP, OU ET OUR-NEAU CUIVRÉ d'Afrique Vaill. Ois. d'Af. v. 2. pl. 89. - Le Merle Violet de Juida

F 3

Buf.

- Buff. pl. 540. Gilded Thrush Lath. Syn. v. 3. p. 57.
- STURNUS NITENS. Daudin. Orn. v. 2. p. 313.

  —— Turdus Nitens Gmel. Syst. 1. p. 818.
- (259) L'ETOURNEAU COUIGNOP, d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 90. Le Merle verd d'Angola Buff. pl. 561. Shining Thrush Lath. Syn. v. 2.
- STURNUS MORIO. Daudin Ornith. v. 2. p. 307.

  —— Turdus Morio Gmel. Syst. 1. p. 297.
- Nº. 26. L'ETOURNEAU ROUPEN-NE, OU LE JAUNOIR d'Afrique Vaill, Oif. d'Af. v. 2. pl. 83 et 84. — Buff. pl. 199. (Male) — African Thrush Lath. Syn. v. 3. p. 55.
- STURNUS ÆNEUS. (Mas) Daudin Orn. v. 2. p. 310. Turdus Æneus Gmel. Syst. 1. p.
  - (135) 818. No. 63. LE VERD DORÉ, OU ETOURNEAU à LONGUE QUEUE d'Afrique (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 87. Le Merle verd à longue queue Buff. pl. 220. Glosfy Thrush Lath. Syn. v. 2. p. 57. No. 61.
- STURNUS BARITA. Daudin Orn. v. 2. p. 320.

   Gracula Barita Gmel. Syst. 1. p. 396.
- .(717) L'ETOURNEAU à QUEUE BRISÉE EN GOUTIÈRE, OU LE BARITE des Antilles Buff. de Sonnini v. 9. p. 106. Boat-tailed Grakle Lath. Syn. v. 2. p. 460.
- STURNUS SPLENDENS. (Mas) Daudin Ornith,

- (435) TANT des iles de l'Ocean Indien (le Male)

  Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 85. Buff. de

  Sonnini v. 9. p. 90.
- STURNUS NABOUROUP. (Mas) Daudin Orn. v. 2. p. 308. — L'E TOURNEAU NABOU-
- (145) ROUP d'Afrique (le Male) Vaill. Oif. & Af. v. 2. pl. 91.

LANT d'Afrique, Roijaume de Congo (Male)

(701) — Le Merle Brillant Sonnini Edit. de Buff. v. 10. p. 209.

#### GENUS TURDUS.

## GENRE GRIVE.

- Turdus Viscivorus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 806. LA GROSSE GRIVE, OU LA
- (735) DRAINE d'Europe (le Male) Buff. pl. 489.

   MISSEL THRUSH Lath. Syn. v. 3.
  p. 16.
- Turdus Pilaris. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 807. LA LITORNE, OU LA
- (736) TOURDELLE d'Europe (Male et Femelle)

  Buff. pl. 490. Frisch T. 26. FIELD
  FARE THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 24,

  No. 11.
- TURDUS MIGRATORIUS. Gmel. Syst. 1. p. 811.

  LA LITORNE À POITRINE ROUSSE

  (638) du Canada Buff. pl. 556. f. 1. —— RED

  F 4

- Breasted thrush Lath. Syn. v. 3. P. 43.
- TURDUS MERULA. (Mas et Femina) Gmel. Syst., 1. p. 831. — LE MERLE (Male et Fe-
- (737) melle) d'Europe Buff. pl. 2. et 555.

  Frisch T. 29. BLACK-BIRD Lath.
  Syn. v. 3. p. 43.
- TURDUS TORQUATUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 832. LE MERLE à COL-
- (738) LIER, OU LE PLASTRON BLANC (Male et Femelle) Buff. pl. 516. Lath. Frisch T. 30. RING-OUZEL THRUSH Syn. v. 3. p. 46.
- TURDUS MAURITANUS. Gmel. Syst. 1. p. 822.

  No. 75. LE MERLE VERD d'isle de
- (60) France Buff. pl. 648. f. 2. MAURITIUS THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 69.
- Turdus Capensis. Gmel. Syst. 1. p. 822.— LE MERLE à CUL JAUNE, OU LE
- (136) BRUNOIR d'Afrique Buff. pl. 317. ——

  Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 106. BRUNET

  THRUSII Lath. Syn. v. 3. p. 71.
- TURDUS PLUMBRUS. Gmel. Syst. 1. p. 814. LE TILLY, OU LA GRIVE CENDRÉE
- (753) d'Amerique Buff. pl. 560. f. 1. RED LEGGED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 33.

OU LE RECLAMEUR d'Afrique (le Male)

Vaill.

(132)	Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 104 Sonnin
	Edit. de Buff. v. 9. p. 192.
	LE MERLE ESPION d'A
(137)	
-	Buff. de Sonnini v. 9. p. 187.
TURD	us Cinereus. Gmel. Syst. 1. p. 810. No
	36. — LE MERLE CENDRÉ DE
(123)	INDES Buff. page 104. Ed. folio.
	ASH-COLOURED THRUSH Lath. Syn
	v. 3. p. 67.
<del></del>	LE MERLE à CRAVAT
	BLANCHE de Batavia Vaill. Oif. d'Af. 1
<b>(</b> 462)	3. pl. 115. Sonnini Edit. de Buff.
	9. p. 252.
<del></del>	LE MERLE ECAILL
	de l'isle de Java Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl
<b>(</b> 460)	116 Sonnini v. 9. p. 254.
	LE MERLE FLUTEU
	du Cap de Bonne Espèrance (le Male) Vail-
<b>(</b> 68)	Oif. d'Af. v. 3. pl. 112. f. 2 Sonnin
	v. 9. p. 212.
TURD	us Mindanensis. Gmel. Syst. p. 823
	- LE MERLE CADRAN d'Afrique Vail
(20)	Ois. d'Af. v. 3. pl. 109. — Sonnini v. 9
	p. 256. — Merle de Mindanao Buff. pl
	627. — MINDANAO THRUSH Lath
	Syn. v. 3. p. 69. No. 87.
TURD	us Musicus. (Mas) Gmel. Syst. 1. p
	809 LA GRIVE VULGAIRE, OU
(943)	
	F 5

•	pl. 406. — Song Thrush Lath. Syn. v. 3.
	p. 18. No. 2.
TURDU	JS SINENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 829
	L'HOAMY, OU LA GRIVE ROUSSE de la
(902)	Chine (Male) Buff. v. 4. p. 45. Edit. folio
- •	CHINESE THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 36.
TURDUS ILIACUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.	
	p. 808 LE MAUVIS, OU MAUVIETTE
(949)	d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 51
	REDWING THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 22.
Turd	us Saxatilis. Lath. Ind. Orn. v. 1.
	p. 336. — Lanius infaustus Minor Gmel.
(950)	Syst. 1. p. 310 LE MERLE DE RO-
	с не d'Europe Buff. pl. 562. — Frisch T.
	32 LESSER ROCK THRUSH Lath.
	Syn. v. 3. p. 54. — et v. 1. p. 177.
	LE MERLE GRIMPEUR
	à QUEUE EPINEUSE de la nouvelle Galle
(968*)	meridionale Espèce nouvelle non decrite.
	LE MERLE GUTTU.
	RAL de la nouvelle Zelande (Male) ———
	non decrit.
Turdus Cayanus. Gmel. Syst. 1. p. 834	
	LE MERLE BLEU, OU LE MERLE SO-
(845)	LITAIRE d'Europe — Buff. pl. 250.
	(la Femelle) — Edw. T. 18. (le Male) —
	BLUE THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 51.
	LE MERLE à CROIS-
	SANTS de la nouvelle Zelande — non
(1000*)	
	Tur-

- Turdus Perspicillatus, Lath. Ind. v. 1. p. 349. Gmel. Syst. 1. p. 830. Le
- (1048) MERLE à LUNETTES de la Chine. Merle de la Chine Buff. pl. 604. SPEC-TACLE THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 6.
- Turdus Moluccensis (Mas) Brisf. Ornith. p. 316. v. 2. — Le Brève à Bai.
- TURDUS MOLUCCENSIS. (Varietas) LE BRÈVE à BANDEAU NOIR de Madagas(476) car Variété.
- TURDUS ARUNDINACEUS. (Mas) Gmel. Syst.

  1, p. 834. LA GRIVE ROUSSE-
- (904) ROLLE d'Europe (Male) Buff. pl. 513. REED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 32.
- Turdus Jocosus. (Mas) Mihi. Lanius Jocofus Gmel. p. 310. LE PETIT MER-
- (492) LE HUPPÉ, OU LE BOULBOUL des Indes (le Male) Sonnerat voy. v. 2. p. 189. T.

  109. Jocofe Shrike Lath. Syn. v. 1. p.

  175.
- TURDUS OLIVACEUS. Gmel. Syst. 1. p. 810.— LE GRIVERON du Cap de Bonne Espè-
- (903) rance Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 98. Le Merle Olive du Cap de B. E. Buff. v. 4. p. 101. Edit. folio. OLIVE THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 66.

# GENUS FORMICIVORUS. GENRE FOURMI-LIER.

- FORMICIVORUS TINIENS. Mihi Turdus Tiniens Gmel. Syst. 1. p. 827. No. 96. —
- (134) LE FOURMILIER GRAND BEFFROI de Caijenne Buff. pl. 706. fig. 1. ALARUM THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 86.
- FORMICIVORUS COLMA. Mihi Turdus Colma Gmel. Syst. 1. p. 827. LE
- (146) FOURMILIER à TÊTE ROUSSE, OU LE TETMA de Caijenne Buff. pl. 821. RUFOUS-NAPED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 85. N°. 117.
- FORMICIVORUS BAMBLA. Mihi Turdus Bambla Gmel. Syst. 1. p. 827. No. 93. —
- (721) FOURMILIER BARÉ, OU LE BAMBLA de Caijenne Buff. pl. 703. f. 2.

  BLACK-WINGED THRUSH Lath. Syn.
  v. 3. p. 84. N°. 115.
- FOR MICIVORUS CINNA MOMEUS. Mihi

  Turdus Cinnamomeus Gmel. Syst. 1. p. 825.
- (756). LE FOURMILIER à CRAVATE de Caijenne Buff. pl. 560. fig. 2. (Merle) BLACK BREASTED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 79.
- FORMICIVORUS CANTANS. Mihi. Turdus dus

- dus Cantans Gmel. Syst. 1. p. 825. No. 87. L'ARADA, OU FOURMILIER
- (791) CHANTEUR d'Amerique (le Male) Buff.
  pl. 706. f. 2. MUSICAN THRUSH
  Lath. Syn. v. 3. p. 80. No. 109.
- FOR MICIVORUS CAYANURUS. Mihi Turdus Cayanurus (Mas et Femina) Gmel. Syst.
- (366) I. p. 828. No. 99. L'AZURIN, OU LE FOURMILIER à QUEUE BLEUE de Java (Male et Femelle) Sonnini Le Merle à queue bleue Buffon pl. 355. BLUETAILED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 88.
- CALOTTE NOIRE de la Guijane (Male) —

  (793\*) non decrit.
- FORMICIVORUS PECTORALIS Mihi Turdus Pectoralis Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 357.
- (138) LE PETIT FOURMILIER à GORGE ROUSSE de Caijenne. Petit Merle Brun Buff. pl. 644. f. 2. YELLOW BREASTED THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 78.
- FORMICIVORUS PALIKOUR Mihi Turdus Formicivorus Gmel. Syst. 1. p. 828.
- (860) LE PALIKOUR, OU FOURMILIER de la Guijane Buff. pl. 700. f. 1. ANT THRUSH Lath. Syn. v. 3. p. 87.

	MILIER GRIS RAYÉ de la Guijane (Fe-
(966*)	melle) non decrit espèce nouvelle.
	LE FOURMILIER &
	GUTIPENNES de la Guijane - non
(957*)	decrit espèce nouvelle.
	LE FOURMILIER
(087*)	GRI-NOIR d'Amerique (Male) - non decrit.
	LE FOURMILIER
	SOURCI-BLANC de la Guijane — non
(1008*)	
(1000)	
CENTIS	AMPELIS. GENRE COTINGA.
OLIVOS	nun Leis. Olivie Comon.
AMART	18 MAYNANA. Gmel. Syst. 1. p. 840. No. 5.
AMPEL	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4-4-3	LE COTINGA à PLUMES SOYEU-
(303)	ses des Maynas Buff. pl. 229. — Vaill.
•	H. Nat. Cotingas pl. 43. — SILKY.
	CHATERER Lath. Syn v. 3. p. 95. No.4.
AMPEL	us Pompadora. (Mas) Gmel. Syst. 1. p.
	839. — LE COTINGA PACAPACA,
(47)	ou pompadour de la Guijane (Male) —
	Buff. pl. 279. — Vaill. Cot. pl. 31. —
	POMPADOUR CHATTERER Lath. Syn. v.
'	3. p. 96.
AMPEL	IS POMPADORA. (Pullus) (Mas)
	LE COTINGA PACAPACA, OUPOMPA-
(557)	
	Cor. pl. 33.
AMPEL	IS POMPADORA. (Biennis) (Mas)
	CO-
- (	C04

- LE COTINGA PACAPACA, OU POMPA(573) DOUR (moyen age) (le Male) Vaill.
  Cotingas pl. 31. bis.
- AMPELIS CAYANA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 840. LE COTINGA QUEREÏVA
- (44) de la Guijane (Male et Femelle) Buff. pl. 624.

  (le Male) Vaill. Hist. Nat. des Cot. pl.

  27 et 30. PURPLE-THROATED
  CHATTRER Lath. Syn. v. 3. p. 95.
- AMPELIS CAYANA. (Varietas) (Mas) LE CO-TINGA QUEREÏVA passant du jeun age (566) à l'age fait (Male) — Vaill. Cotingas pl. 20.
- (566) à l'age fait (Male) Vaill. Cotingas pl. 29. AMPELIS COTINGA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p.
  - 840. LE COTINGA CORDON-BLEU
- (416) du Brésil (le Male) Buff. pl. 188. —

  Vaill. Cot. pl. 40. PURPLE BREASTED CHATERER Lath. Syn. v. 3. p. 94.
- Ampelis Caruleus. (Mas et Femina) Mihi Ampelis Cotinga (Femina) Gmel. Syst. 1. p.
- (361) 840. LE COTINGA BLEU de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 186. (Celui-ci en fait la Femelle du cordon bleu) Vaill.

  Hist. Nas. des Cot. pl. 34 et 35.
- AMPELIS CÆRULEUS. (Varietas) (Mas) LE COTINGA BLEU (Male) Varieté (458) Vaill. Cotingas. pl. Supplementaire.
- (716\*) ROU de la Guijane (Male) non decrit

  Espèce nouvelle.

LE PETIT COTINGA À
FLANCS

AMPELIS CARUNCULATA (Femina) Gmel. Syst.

1. p. 841. — COTINGA BLANC CA<sup>2</sup>
(567) RONCULÉ, OU LE GUIRAPANGA de la

(567) RONCULE, OU LE GUIRAPANGA de la Guijane (Femelle) Buff. pl. 794. — Vaille Cotingas pl. 40. — CARUNCULATED CHATERER Lath. Syn. v. 3. p. 98.

AMPELIS RUBRICOLLIS. (Mas) Mihi — Musficapa Rubricollis Gmel. Syst. 1. p. 933.

- (51) LE COTINGA à HAUSSECOL ROUGE,
  OU LE PIAHAU de Caijenne (le Male) Buff.
  pl. 381. (Celui-ci le range dans le Genre Gobe Mouches) Vaill. Hist. Nat. des Cotingas pl. 47. PURPLE THROATED
  FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 365.
  N., 78.
- Ampelis Grandis. (Mas) Mihi Corvus Calvus Gmel. Syst. 1. p. 372. Le Grand
- (586) COTINGA à CALOTTE GRISE dans son etat parfait ayant, la tête couverte de plumes)
  (Male) Vaill. Cot. pl. 49. sigure imparfaite Choucas Chauve Buss. pl. 521. —
  Bald Crow Lath. Syn. v. 1. p. 383. N<sup>n</sup>. 16.

Ampelis Carnifex. (Mas et Femina) Gmel.

Syst. 1. p. 839. — LE COTINGA

(349) ROUGE, OU L'OUETTE (Male et Femelle) Buff. pl. 378. (le Male) — Vaill. Hist. Nat. des Cot. pl. 37 et 38. — RED CHATERER Lath. Syn. v. 3.

(1052) (Male) (Un individu en mue, conservant quelques plumes de son jeun age.)

AMPELIS NUDUS. (MAS) Mihi — Corvus Nudus Gmel. Syst. 1. p. 371. — LE CO-

(52) TINGA COL-NUD de Caijenne (Male) — Vaill. Hist. Natur. des Oiss. des Ind. et d'Ameriq. pl. 45. — Buff. pl. 609. Cet Auteur le range dans le genre Choucas. — BARE-NECKED CROW Lath. Syn. v. 1. p. 382.

### GENUS COLIUS.

CENRE COLIOU.

Colius Erythropus. Gmel. Syst. 1. p. 842.

Colius Leuconotus. Lath. Ind. Orn.

(160) COLIOU à CROUPION BLANC du Cap de bonne Espérance Sonnini v. 13. p. 230.

— WHITE-BACKED COLY Lath. Syn. v. 3. p. 101. pl. 41.

Colius Striatus. (Femina) Gmel. Syst. 1. p. 843. — LE COLIOU RAYÉ du Cap de

(183) Bonne Espérance (Femelle) Sonnini v. 13. p. 227. — RADIATED COLY Lath. Syn. v. 3. p. 102.

(162\*) d'Afrique pays des Caffres — non decrit.

LE COLIOU à GORGE NOI-

(780\*) RE de Malymbe - non decrit.

G

GE-

## GENUS LOXIA.

#### . GENRE GROS-BEC.

- LOXIA CAPENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 862. No. 39. LE GROS BEC à CROUPION
- (276) JAUNE de Coromandel Baff. pl. 101. f. 1.

  —— CAPE GROSBEAK Lath. Syn. v. 3.
  p. 113.
- LOXIA CURVIROSTRA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 843. LE BEC-CROISÉ d'Eu-
- (290) rope (Male et Femelle) Buff. pl. 218. COM-MON CROSS-BILL Lath. Syn. v. 3. p. 106.
- LOXIA CARDINALIS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 847. LE GROS-BEC DE
- (385) VIRGINIE, OU LE CARDINAL HUPPE (Male et Femelle) Buff. pl. 37. — CAR-DINAL GROSBEAK Lath. Syn v. 3. p. 118.
- LOXIA ORIX. Gmel. Syst. 1. p. 863. No. 42. ——
  LE CARDINAL ROUGE ET NOIR du
- (275) Cap de Bonne Espérance Buff. pl. 6. f. 2.

  GRENADIER GROSBEAK Lath.

  Syn. v. 3. p. 120.
- LOXIA DOMINICANA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 848.

  —— LE PAROARA, OU CARDINAL
- (285) DOMINICAIN (Male) Buff. pl. 55. f. 2. —
  DOMINICAIN GROSBEAK Lath. Syn. v.
  3. p. 123. Edw. t. 127.
- LOXIA CUCULATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. I.
  p. 378. LE CARDINAL DOMINI-

Loxia.

LOXIA MADAGASCARIENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 847. - LE GROS-BEC FOUDIS de Madagascar (Male) Buff. pl. 134. f. 2. (295) MADAGASCAR GROSBEAK Lath. Syn. v. 3. p. 119. LOXIA SIBIRICA. Gmel. Syst. 1. p. 849. LE GROS-BEC RÔSE, OU LE CARDI-(165)NAL DE SIBERIE (Male) Buff. de Sonnini v. II. p. 99. - SIBIRIAN GROS-BEAK Lath. Syn v. 3. p. 124. No. 21. LE GROS-BEC MANGEUR DE RIZ, OU LE PADDA-GRI d'Isle de (797\*) France -- non décrit. -- LE GROS-BEC COL-COUPÉ (641\*) d'Afrique pays des Caffres --- non décrit. --- LE GROS-BEC À VENTRE PERLÉ d'Afrique Coté d'Angôle --- non (703\*) décrit. LOXIA ORYZIVORA. Gmel. Syst. 1. p. 850. — LE PADDA, OU L'OISEAU DE RIZ dela (278) Chine Buff. pl. 152. f. 1. \_\_\_ JAVA GROSBEAK Lath. Syn. v. 3. p. 129. -Edw. pl. 41. LOXIA COCCOTHRAUSTUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.p. 844. — LE GROS-BEC d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 99 et (822)100. — THE HAWFINCH Lath. Syn. v. 3. p. 103. - Frisch t. 4. LOXIA MALACCA. Gmel. Syst. 1. p. 851. — LE JACOBIN, OU GROS-BEC DE JAVA Buff. pl. 139. f. 3. - MALACCA GROS-

G 2

BEAK

- BEAK Lath. Syn. v. 3. p. 140. Edwards pl. 355. f. 2.
- LOXIA BRASILIANA. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 377. LE GROS-BEC, OU GRIVE-
- (281) LIN du Bréfil Buff. pl. 309. f. I.

  BRASILIAN GROS-BEAK Lath. Syn. v.
  3. p. 122.
- LOXIA PUNCTULARIA. Gmel. Syst. 1. p. 851.

  LE GROS-BEC TACHETÉ, OU
- (282) LE COURY de Java (Male) Buff. pl. 139.

  f. 1. —— COWRY GROSBEAK Lath. Syn.
  v. 3. p. 142. —— Edwards t. 40.
- LOXIA MALACCA. Gmel. Syst. 1. p. 851. Var. B.

   LE GROS-BEC CAP-NOIR de la Chine
- (280) Brisson Orn. v. 3. p. 235 THE CHINESE SPARROW Edwards pl. 43. Lath. Syn. v. 3. p. 141. Var. A.
- LOXIA CHLORIS. (Mas et Femina). Gmel. Syst. 1.
  p. 854. LE VERDIER d'Europe
- LOXIA RUBRA. Mihi Emberiza Zubra Gmel.

  Syst. 1. p. 877. LE GROS-BEC FOU-
- (795) DIS à VENTRE GRIS d'Isle de France

  Moineau d'Isle de France Buff. pl.
  665. CRIMSON BUNTING Lath.
  Syn. v. 3. p. 194.
- ET NOIR, OU LE CARDINALIN du (606\*) Sénégal (Male) non décrit.

PETIT GROS-BEC à COURONNE
ET PLASTRON COULEUR DE FEU de
(437\*) Java — non decrit.

LOXIA GROSSA (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.

p. 864. — LE GROS-BEC BLEU à

(981) BEC ROUGE d'Amerique (Male et Femelle)

— Buff. pl. 154. (le Male) — WHITE

THROATED GROSBEAK Lath. Syn. v.

3. p. 115.

# DIVISION BOUVREUIL.

- LOXIA PYRRHULLA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 846. LE BOUVREUIL d'Eu-
- (651) rope (Male et Femelle) —— Buff. pl. 145. —— THE BULFINCH Lath. Syn. v. 3. p. 145. —— Frisch t. 2.
- LOXIA MINUTA. Gmel. Syst. I. p. 865. LE BOUVREUIL BEC-ROND à VENTRE
- (455) ROUX de Caijenne Buff. pl. 319. f. 2. MINUTE GROSBEAK Lath. Syn. v. 3. p. 158.
- LOXIA PORTORICENSIS. (Mas) Daudin. Ornith.
  v. 2. p. 411. LE GRAND BOUVREUIL
- (628) FER-à-CHEVAL de Portorico (Male) Daudin. pl. 29.
- LOXIA TORRIDA. Gmel. Syst. 1. p. 854. LE

  G 3

  BOU-

• •	BOUVREUIL BEC-BLANC de la Guiane
(353)	Buff. 353. Oif. v. 5 WHITE - BILLED
	GROSBEAK Lath. Syn. v. 3. p. 146.
-	LE PETIT BOUVREUIL
	GRIS du Cap de Bonne Esperance
(331*)	non decrit.
	Angolensis. Gmel. Syst 1. p. 853.
	LE BOUVERON à VENTRE BRUN
	d'Afrique. — BLACK GROSBEAK Edw.
	t. 352. f. 2. — ANGOLA GROSBEAK
	Lath. Syn. v. 3. p. 145.
	DIVISION ANGROYAN. (*)
-	L'ANGROYAN GRIS de
	la nouvelle Galle meridionale — non decrit.
<del></del>	L'ANGROYAN LONGI-
	BANDE des iles de l'Ocean Austral.
(1009*)	) non decrit.
	DIVISION REPUBLICAIN (*).
<u> </u>	LE REPUBLICAIN à
	CAPUCHON ECARLATE d'Afrique Roi-
(702*)	jaume de Congo (Male) — non decrit.
	LE REPUBLICAIN à
1000	VENTRE ET GORGE JAUNE d'Afri-
(754*)	que Côte d'Angôle (Male) - non decrit.
	LE REPUBLICAIN NA-
	MAQUOI d'Afrique (Male) — Vaill. voy.
(313*)	2. p. 322. — Paterson trav. in Africa pl.
	GE-

- EMBERIZA ORYZIVORA. (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 880. LA GRIPENNE, OU L'OR-
- (823) TOLAN DE RIZ d'Amerique (Male) Buff. pl. 388. f. I. RICE BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 188. Edwards t. 291.
- EMBERIZA CAYANEA. Gmel. Syst. 1. p. 876.— LE MINISTRE d'Amerique Buff. p. 274.
- (299) Edit. folio. INDIGO BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 205. Edwards t. 273.
- EMBERIZA SIRIS. Gmel. Syst. 1. p. 885. LE PAPE de la Caroline Buff. pl. 159. f. 1. —
- (306) PAINTED BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 206. Edwards t. 130.
- EMBERIZA CITRINELLA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 870. — LE BRUANT d'Eu-
- (563) rope (Male et Femelle) Buff. pl. 30. f. 1. YELLOW BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 170. Frisch t. 5.
- EMBERIZA CIRLUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 879. LE BRUANT DE HAYE
- (565) d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 653. f.
  1. et 2. CIRL BUNTING Lath. Syn.
  v. 3. p. 190.
- EMBERIZA MILIARIA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 879. LE PROYER d'Eu-
- THE BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 171.

   Frisch t. 6.

- EMBERIZA PARADISEA. Gmel. Syst. 1. p. 882.

  LA VEUVE à COLIER D'OR d'An-
- (274) gole Buff. pl. 194. WHIDAH BUN-TING Lath. Syn. v. 3. p. 178. — Edwards t. 86.
- EMBERIZA SERENA. Gmel. Syst. 1. p. 883. —
  LA VEUVE DOMINICAINE d'Afrique
- (273) Buff. pl. 8. f. 2. DOMINICAN BUN-TING Lath. Syn. v. 3. p. 180.
- EMBERIZA SCHENICLUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 881. L'ORTOLAN.
- (792) DE ROSEAUX d'Europe (Male et Femelle)

  Buff. pl. 247. f. 2. (le Male) pl. 477. f. 2.

  (la Femelle) REED BUNTING Lath.

  Syn. v. 3. p. 173. Frisch t. 7.
- EMBERIZA REGIA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 884.

  LA VEUVE à QUATRE BRINS de
- (272) la Côte d'Afrique (le Male) Buff. pl. 8. f.

  I. —— SHIFT-TAILED BUNTING
  Lath. Syn. v. 3. p. 183.
- EMBERIZA LONGICAUDA (Mas) Gmel. Syst. 1.

  p. 884. LA GRANDE VEUVE à
- (271) EPAULETTES du Cap de Bonne Esperance (Male) Buff. pl. 635. ORANGESHOUL DERED BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 184.
- EMBERIZA NIVALIS. (Mas et Femina) Gmel.
  Syst. 1. p. 866. L'ORTOLAN BLANC,
- (696) OU L'ORTOLAN DE NEIGE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 497. f. 1. SNOW

- BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 161. —— Edw. t. 126. (the Male)
- EMBERIZA CIA. Gmel. Syst. 1. p. 402. LE BRUANT, FOUON DE PRÈS d'Europe
- (973) Buff. pl. 30. f. 2. FOOLISH BUN-TING Lath. Syn. v. 3. p. 191.
- BRAUNT BICOLOR (Male) de Java ——

  (294\*) non decrit.
  - EMBERIZA CAPENSIS. Lath. Ind. v. 2. p. 407.

    L'ORTOLAN DU CAP DE BONNE
  - (308) ESPERANCE Buff. v. 5. p. 72. Edit. folio — CAPE BUNTING Lath. Syn. v. 3. p. 185.
  - EMBERIZA QUELEA. (Mas et Femina) Lath. Syn. v. I. p. 409. Gmel. Syst. I. p. 877.
  - (287) LE BRUANT à BEC ROUGE du Sénégal Moineau à bec rouge Buff. pl. 183. f. 2. (le Male) BLACK-FACE, BUNTING v. 3. p. 192.
  - EMBERIZA QUELEA. Hornotinus (Mas)

    LE BRUANT à BECROUGE du Sénégal
    (1033) (le Male dans fon Jeun age.)
  - GENUS TANAGRA. GENRE TANGARA.
  - TANAGRA RUBRA. Gmel. Syst. 1. p. 889. —
    LE SCARLATE, OU LE TANGARA
  - (298) DU CANADA Buff. pl. 156. f. 1. Desmaret Tangaras pl. Enl. SCARLET TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 217.

G 5  $T_A$ .

- TANAGRA MISSISSIPIENSIS. Gmel. Syst. 1.
  p. 889. LE TANGARA ROUGE DU
- (139) MISSISSIPI (Male) Buffon pl. 741.

  Desmaret Tang. pl. Enl. MISSISSIPI
  TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 218.
- TANAGRA JACAPA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 888. LE CARDINAL POUR-
- (303) PRE, OU LE TANGARA BEC-D'ARGENT de Caijenne (Make et Femelle) Buff.

  pl. 128. (le Male) —— Ramphocèle becd'argent (Male et Femelle) Desmaret Tang. pl.

  Enl. —— RED-BREASTED TANAGER

  Lath. Syn. v. 3. p. 214. Edwards. t. 267.
- TANAGRA BRASILIA. Gmel. Syst. 1. p. 888.

  LE TANGARA ROUGE, OU LE
- (304) CARDINAL du Mexique Buff. pl. 127. f.

  1. Ramphocèle Scarlate Desmaret Tangaras pl. Enl. BRASILIAN TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 215.
- TANAGRA MAGNA. Gmel. Syst. 1. p. 890. LE GRAND TANGARA, OU TANGARA
- (650) DES GRANDS BOIS de Cajenne Buff. pl. 205. GRAND TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 220.
- TANAGRA CRISTATA. Gmel. Syst. 1. p. 898.

  LA HOUPETTE, OU TANGARA
- (3.5) HUPPÉ de la Guijane (Femelle) Buff. pl. 7. f. 2. CRESTED TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 221.
- TANAGRA ATRA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 898.  $N^{\text{p}}$ . 39.—LE TANGARA à CAMAIL, OU

- (684) CRAVATE NOIRE de Caijenne (Male)

  Buff. pl. 714. f. 2. BLACK-FACED

  TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 222. No.
  10.
- TANAGRA EPISCOPUS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 896. LE TANGARA
- (305) BLEUET, OU L'EVEQUE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 178. fig. 1. et 2.

   Desmaret Tang. pl. Enl. BISCHOP
  TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 226.
- TANAGRA GULARIS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 894. — LE TANGARA ROUGE-
  - (805) CAPE d'Amerique (Male et Femelle) Buff.

    pl. 155. f. 2. Desmaret Tang. pl. Enl. —

    RED HEADED TANAGER Lath. Syn. v.

    3. p. 228.
  - TANAGRA MEXICANA. Gmel. Syst. 1. p. 893.

     LE TANGARA TACHETÉ, OU DIA-
  - (402) BLE ENRHUMÉ de Caijenne Buff. pl. 290.

    f. 2. —— BLACK AND BLUE TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 230. —— Desmaret Tang. pl. Enl.
  - TANAGRA CAYANA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 892. LE PASSEVERT, OU TAN-
  - (302) GARA À TÊTE ROUSSE de Caijenne (Male) Buff. pl. 201. f. 2. et 290. f. 1. RUFOUS HEADED TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 231.
  - TANAGRA TRICOLOR. (Mas) Gmel. Syst. 1.

    p. 891. LE TANGARA VARIÉ à
    TÈ-

- (301) TETE VERTE, OU LE TRICOLOR de Caijenne Buff. pl. 33. f. 1. GREEN-HEADED TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 234. N°. 30.
- TANAGRA TRICOLOR. (Varietas) LE TAN-GARA VARIÉ À TÊTE BLEUE, OU LE.
- (554) TRICOLOR de Caijenne (Male) Buff. pl., 33. f. 2. Lath. Syn. var. A.
- TANAGRA GYROLA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 891.

  LE TANGARA ROUVERDIN du
- (346) Pérou (Male) Buff. pl. 133. f. 2. RED-HEADED TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 233. — Edwards t. 23.
- TANAGRA TATAO. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 893.

  LE TANGARA SEPTICOLOR du
- (300) Brefil (Male) Buff. pl. 127. f. 2. PA-RADISE TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 236.
- TANAGRA VIOLACEA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 890. —— LE PETIT TAN-
- (360) GARA NOIR ET JAUNE, OU LE TEITÉ du Bresil (Male et Femelle) Buff. pl. 114. f. 2. GOLDEN TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 239. (la Femelle non decrite.)
- TANAGRA CAYANENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 894. —— LE PETIT TANGARA NÈ-
- (411) GRE de Caijenne Buff. pl. 114. f. 3. ——
  NEGRO TANAGER Lath. Syn. v. 3. p.
  240.
- TANAGRA ARTICAPILLA. Gmel. Syst. 1. p. 899.

899. — LE TANGARA JAUNE à TÊTE (640) NOIRE, OU LE MORDORÉ de Caijenne Buff. pl. 809. f. 2. - BLACK-HEADED TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 224. TANAGRA VELIA. - Motacilla Velia Gmel. Syst. 1. p. 991. - LE TANGARA VA-RIÉ de Surinam Desmaret Tangaras pl. (427) Enl. — Le pipit varié Bust. pl. 669. f. 3. TANAGRA NIGERRIMA. Gmel. Syst. 1. p. 899. - LE TANGARA NOIR d'Amerique Buff. pl. 179. f. 2. Desm. Tang. pl. -(1881) GUYANA TANAGER Lath. Syn. v. 3. p. 225. TANAGRA SILENS. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 432. — LE TANGARA SILENTIEUX de la Guijane (Male) Buff. pl. 742. (637) Desmaret Tang. pl. Enl. ---- LE TRÈS PETIT TAN-GARA NOIR, OU LE NEGRIN de la (798\*) Guijane (Male et Femelle) --- non decrit Espèce nouvelle. - LE TANGARA BLEU À VENTRE JAUNE d'Amerique (Male) -(604\*) Espèce nouvelle non decrite. LE TANGARA ISABEL LE de Guijane (Male et Femelle) - non (994\*) decrit. LE TANGARA ARCHE-VÉQUE à EPAULETTES BLEUES du (307\*) Perou (Male) - non décrit.

TANAGRA PUNCTATA. Gmel. Syst. 1. p. 897.—
LE TANGARA SYACOU de l'Amerique

(1051) Meridionale Desmaret Tang. pl. Enl.

Le Tangara tacheté des Indes Buff. pl. 133.

fig. 1.——SPOTTED TANAGER Lath.

Syn. v. 2. p. 228.

### GENUS FRINGILLA.

GENRE PINÇON.

- FRINGILLA CRISTATA. Gmel. Syst. 1. p. 926.

  LE FRIQUET à HUPPE ROUGE.
- (311) de Caijenne Buff. pl. 181. f. 1. BLACK-FACED FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 253.
- FRINGILLA PÉTRONIA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 919. LE MOINEAU DE
- (838) BOIS, OU LA SOULCIE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 225. RING SPAR-ROW Lath. Syn. v. 3. p. 254.
- FRINGILLA DOMESTICA. Gmel. Syst. 1. p. 925.

   LE MOINEAU d'Europe Buff. pl. 6. f. 1.
- (344) HOUSE SPARROW Lath. Syn. v. 3.
  p. 284. Frisch T. 8.
- FRINGILLA CŒLEBS. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 901. LE PINÇON (Male
- (839) et Femelle) d'Europe Buff. pl. 54. f. 1. ——
  CHAFFINCH Lath. Syn. v. 3. p. 257. ——
  Frisch T. 1.
- FRINGILLA MONTIFRINGILLA. Gmel. Syst. 1.
  p. 902. LE PINÇON D'ARDENNES
- (840) d'Europe Buff. pl. 54. f. 2. BRAM-BLING

- FRINGILLA GRANATINA. (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 906. LE GRENADIN des Côtes
- (293) d'Afrique (Male) Buff. pl. 109. f. 3. Vieillot Oif. Chant. pl. 17. BRASILIAN FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 316.
- FRINGILLA CARDUELIS. Gmel. Syst. 1. p. 903.

  LE CHARDONNERET d'Europe
- (479) Buff. pl. 4. f. 1. THISTEL FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 281. — Frisch T. 1.
- Fringilla Benghalus. (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 920. LE BENGALI BLEU à
- (182) MOUSTACHES ROUGES, OU LE MARP POZA d'Afrique Buff. pl. 115. f. 1. \_\_\_\_\_\_ BLUE-BELLIED FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 310. \_\_\_\_\_ Edw. pl. 131. (la Femelle)
- FRINGILLA AMANDAVA. Gmel. Syst. 1. p. 905. —
  LE BENGALI PIC QUETÉ de Java Buff.
- (289) pl. 115. f. 3. l'Amandava Vieillot pl. Enl. —— AMANDAVA FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 311. —— Edw. pl. 355. f. 1.
- FRINGILLA ASTRILD. Mihi. Loxia Astrild Gmel. Syst. 1. p. 852. LE SENEGA-
- (642) LIRAYÉ, OU L'ASTRILD d'Afrique Buff.

  pl. 157. f. 2. Vieillot Oif. Chant. pl. 12.

   WAX-BILL GROSBEAK Lath. Syn.

  v. 3. p. 152. Edw. pl. 179 et 354.
- FRINGILLA SPINUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 914. LE TARIN d'Europe (Ma-

- (861) le et Femelle) Buff. pl. 485. f. 3. SIS-KIN OR ABERDEVINE Lath. Syn. v. 3. p. 289.
- FRINGILLA CANNABINA. (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 916. LA GRANDE LINOTTE
- (862) DES VIGNES d'Europe (Male) Buff. pl. 485. f. 1. —— GREATER RED-HEA-DED LINNET Lath. Syn.v. 3.p. 304. —— Frisch T. 9.
- FRINGILLA SPINUS (Var.) (Mas) Lath. Ind. v. 1. p. 452. B. LE TARIN DE LA
- (503) NOUVELLE YORK (Male) —— Buff. pl. 292. f. I. —— NEW YORK SISKIN Lath. Syn. v. 3. p. 291. var. B.
  - TICOLOR de la nouvelle Hollande.
- (994) Vieillot Hist. Natur. des Ois. Chanteurs p. 15.
- FRINGILLA FRONTALIS. (Mas) Mihi

  Loxia Frontalis Lath. Ind. Supp. p. XLVI.
- (499) LE SENEGALI À FRONT POINTILLÉ (Male) Daudin. Orn. v. 2. p. 445. ——
  Vieillot. Oif. Chants. pl. 16. FRONTAL GROSBEAK Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 197.
- FRINGILLA MONTIUM (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 917. LA PETITE LI-
- (863) NOTTE, OU LE CABARET d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 485. f. 2. ——
  TWITE Lath. Syn. v. 3. 307.

FRIN-

- FRINGILLA LINARIA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 917. LA PETITE LI-
- (1026) NOTTE DE VIGNES (Male et Femelle)
  d'Europe Buff. pl. 151. f. 1. et 2. —

  COMMON LINET Lath. Syn. v. 3. p. 302.

  LESSER RED-POLE Lath. Syn. v.
  3. p. 305.
- FRINGILLA MONTANA. Gmel. Syst. 1. p. 925. —
  LE FRIQUET, OU MOINEAU DE MON-
- (1027) TAGNE d'Europe Buff. pl. 267. f. 1. —
  Mountain Sparrow Edw.t. 269. TREE
  SPARROW Lath. Syn. v. 3. p. 252. —
  Frisch T. 1. LE HAMBOUVREUX
  Buffon Oif.
- FRINGILLA SENEGALA. (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 909. LE SENEGALI ROUCE d'Afri-
- (291) que (Male) Buff. pl. 157. f. 1. SENE-GAL FINCH Lath. Syn. v. 3. p. 312.
- FRINGILLA TRISTIS. (Mas) Lath. Ind. v. 1. p. 452. Gmel. Syst. 1. p. 907. LE
- (1049) CHARDONNERET JAUNE de Surinam (Male) Buff. pl. 202. f. 2. AMERICAN GOLDFINCH Lath. Syn. v.3. p. 288. Edwards t. 274.
- PION ROUGE d'Afrique pays des Cassres

  (292\*) (Male) non décrit Espèce nouvelle.
- JAUNE des lles de la mer pacifique ——

  (601\*) non décrit Espèce nouvelle.

--- LE CAPI À GORGE

(796*)	(Male et Femelle) — non décrit Espèce
•	nouvelle.  LE BENGALI NOIR à
	EPAULETTES BLANCHES du Sénégal
(211*)	non decrit Espèce nouvelle.
GENUS	MUSSICAPA. GENRE GOBE-MOUCHES.
Mussi	CAPA FORFICATA. Mihi - Lanius
	Forficatus Gmel. Syst. 1. p. 297. — LE
(351)	
	Buff. pl. 189. — Vaill. Oif. d'Af. v. 4.
	pl. 166. — Fork-Tailed-Shrike Lath.
•	Syn. v. 3. p. 158.  LE DRONGOLON à
	QUEUE FOURCHUE du Bengale Vaill.
(682)	Oif. d'Af. v. 4. pl. 174.  LE GRAND DRONGO
	ou le drongur des Indes. Vaill. Oif.
(424)	d'Af. v. 4. pl. 173.
-	GRIS d'Afrique (Male et Femelle) Vaill. Ois.
(43)	d'Af. v. 4. pl. 162 et 163.
-	L'ECHENILLEUR
	JAUNE RAYÉ d'Afrique Vaill. Oif. d'Af.
(45)	v. 4. pl. 164.
<del></del>	L'ECHENILLEUR
(060 <b>*</b> )	LONG-BEC du Bengale — non decrit. —
<b>(</b> 969*)	
	3.√I 11.0±

Mussicapa Cristata. (Mas et Femina) Gmel.

Syst. 1. p. 938. — Gobe-Mouches huppe du Sénégal Buff. pl. 573. f. 2. — Le
Gobe-mouches tcheitrec du Cap
de Bonne Espérance (Male et Femelle) Vaill.

Oif. d'Af. v. 3. pl. 142. — Crested
senegal flycatcher Lath. Syn. v.

3. p. 329.

(38)

MIGNARD du Cap de Bonne Espérance Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 154.

Mussicapa Cærulea. Gmel. Syst. 1. p. 943.

Gôbe-Mouches bleu, ou le

(715) PETIT AZUR des Philippines Buff. pl. 666.
f. 1. — Vaill. ()if. d'Af. v. 3. pl. 153. —
AZUR FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3.
p. 339.

Mussicapa Paradist. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 929. — Le Gobe-mouches

- (34) TCHEITRECBE BLANC du Cap de Bonne Esperance Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 145. Gobe-Mouches blanc huppé Buff. pl. 234. f. 2. PARADISE FLYCAT-CHER Lath. Syn. v. 3. p. 345.
- Mussicapa Paradisi. (Mas et Femina) (Varietas) ——— dôbe-mouches Tchei-
- (35) TRECBE ROUX du Cap de Bonne Esperance (Male en Femelle) Vaill. Oif. d'Af. v. 3.

  pl. 144. Gôbe-Mouches roux huppé
  H 2

  Buff.

	Buff. pl. 234. f. 1. —— Lath. Syn. v. 3.
	var. A.
	LE GÔBE-MOUCHES
	MANTELÉE du Cap de Bonne Esperance
(36)	(Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 151.
	GOBE - MOUCHES
	BLANC À FILETS ET AILES NOIRES,
(495)	_
	Namaquois Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 149.
Mussi	CAPA CINNAMOMEA. Gmel. Syst. 1. p.
	937 LE TYRAN ROUX de Caijenne
(864)	CINNAMOM FLYCATCHER Lath.
(0,04)	Syn. v. 3. p. 354. No. 56.
	LE GÔBE·MOU•
	CHES SOURCILS BLANC des Îles de l'O-
(865*)	cean Austral — Espèce nouvelle non dicrite.
	CAPA ERYTHROGASTRA. (Mas) Lath.
100001	Ind. v. 1. p. 479. — Musicapa Multico-
(624)	lor Gmel. Syst. 1. p. 499. — LE GOBE-
(024)	MOUCHES à POITRINE ROUGE de l'Isle
	Norfolk (Male) — RED BELLIED FLY-
	CATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 343. t. 50.
-	LE GÔBE -
	MOUCHES BICOLOR de la nouvellle Galle
(1002*)	Meridionale — non decrit.
	LE GÔBE -
	MOUCHES MILITAIRE de la nouvelle
	Zelande — non decrit.
Mussi	CAPA FLAMMEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p.
-	942•

- 942. LE GÔBE-MOUCHES ORAN(21) GE ET NOIR des Indes Orientales (Male)

  Sonnini Edit. de Buff. v. 14. p. 142. —

  FLAMMEOUS FLYCATCHER Lath. Syn.
  v. 3. p. 338.
- MUSSICAPA MUTATA (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 930. LE GÔBE-MOUCHES SCHET-
- (342) ROUX Vaill. Oif. d'Af. v. 3. p. 147. ——
  Gôbe-Mouches à longue queue et ventre blanc de Madagascar Buff. pl. 248. f. 2. ——
  MUTABLE FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 347.
- MUSSICAPA MUTATA. (Mas) Varietas LE GOBE - MOUCHES SCHET - BLANE de
- (350) Madagascar (Male) Vaill. Oif. & Af. v. 3.

  pl. 148. Gobe-Mouches blanc à longa queue Buff. pl. 248. f. 1.
- Mussicapa Malabarica. Mihi. Parus Malabaricus Gmel. Syst. 1. p. 1012. —
- (42) LE GÔBE-MOUCHES ORANOR de Ceylan Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 155. Mefange du Malabar Sonnerat voy. ind. t. 114. Malabar Titmous Lath. Syn. v. 4.p. 555.
- Mussicapa Borbonica. (Mas et Femina) Gmel.
  Syst. 1. p. 939. LE Côbe Mouches
- MUSSICAPA CAYANENSIS. (Mas et Femina)
  H 3
  Gmeli

	Gmel. Syst. I. p. 937 LE GOBE-MOU-
(647)	CHES à VENTRE JAUNE de Caijenne
,	(Male et Feurelle) Buff. pl. 569. f. 2. (le
	Male) - YELLOW BELLIED FLY-
	CATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 359.
Mussi	CAPA TYRANNUS. Ginel. Syst. 1. p. 931.
•	LE SAVANA, OU LE TYRAN À
(357)	QUEUE FORCHUE de la Guijane (Male)
-po(x	Buff. pl. 571. f. 2. FORK-TAILED
	FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 355.
	No. 19.
Mussi	CAPA RUTICILLA. (Mas et Femina) Gmel.
	Syst. 1.p. 935 LE GÔBE-MOUCHES
(727)	PETIT NOIR AURORE d'Amerique (Ma-
(1-1)	he et Femelle) Ruff. pl. 566. f. 1. (le Male)
	BLACK-HEADED WARBLER Lath. Syn.
	v. 2. p. 427. Edwards t. 80.
	TRES PETIT TY
	RAN à HUPPE JAUNE, OU LE TYRA-
(719*)	NIN de Caijenne - non decrit Espèce
	nouvelle,
·	LE GÓBE-MOU-
	ches à capuchon Blanc d'Afrique,
(496)	pays des Houzonanas (Male) Vaill. Oif.
	d'Af. v. 4. pl. 159.
	LE COBE-MOUCHER
	PRIRIT d'Afrique Cap de Bonne Esperance
(515)	
	ICAPA GRISOLA (Mas et Femina) Gmel.
•	Syst. 1. p. 949 LE GOBE-MOU-

CHES

- (683) CHES d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 565. f. 1. SPOTTED FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 323. Frisch T. 22.
- Mussicapa Atricapilla (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 935. Le Gobe-mou-
- (366) CHES NOIR à COLIER, OU GÔBE-MOUCHES DE LORAINE (Male et Femelle) Buff. pl. 565. f. 2. et 3. — PIED. FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 324.

LE COBE-MOU-

- (802) CHES MOLENAAR d'Afrique pays Autenique (1802) niquoi (Femelle) Vaill. Oif. d'Afr. v. 4. pl. 160. fig. 2.
- Mussicapa Ferox. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 934. LE TYRAN à HUPPE SOUCI,
- (867) OU PETIT TYRAN de Caijenne (Male)

  Buff. pl. 571. f. 1. TYRAN FLYCAT.

  CHER Lath. Syn. v. 3. p. 357. et 358.
- Mussicapa Audax. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 934. LETYRANTACHETÉ, ou
- (868) LE CAUDEC de Caijenne (Maie) Buff. pl. 453. f. 2. (Gôbe-Mouches) —— WELL-LOW CROWNED FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p. 358.
- Mussicapa Bicolor. (Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 946. —— LE GILLIT, OU 6.0 BE-
- (869) MOUCHES PIE de Caijenne (Femelle) Buff.

  pl. 675. f. i. BLACK AND WHI
  THE FLYCATCHER Lath. Syn. v. 3. p.

  327.

#### GENUS ALAUDA.

## GENRE ALOUETTE.

ALAUDA CRISTATA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p.
796. — LE COCHEVIS, OU GROSSE
(841) ALOUETTE HURPÉE d'Europe (Male)

Buff. pl. 502. f. 1. — CRESTED LARK.

Buff. pl. 503. f. 1. —— CRESTED LARK.
Lath. Syn. v. 4. p. 389. No. 23.

LA PETITE ALOUETTE

à TÊTE ROUSSE d'Afrique Cap de Bonne

(268) Espèrance Vaill. Oif. d'Afr. v. 4. pl. 199.

ALAUDA ALPESTRIS. Gmel. Syst. 1. p. 800. — L'ALOUETTE à HASSE-COL NOIR Ruff,

(779) page 341. Edition folio. — SHORE LARK Lath. Syn. v. 4. p. 385.

ALAUDA NEMOROS A. (Maset Femina) Gmel. Syst.

1. p. 797. — L'ALOUETTE DE BOIS,

(870) OU LE LULU d'Europe (Male et Femelle)

Buff. pl. 503. f. 2. — LESSER CRESTED LARK Lath. Syn. v. 4. p. 391.

ALAUDA PRATENSIS. (Mas et Femina) Gmel.

Syst. 1. A. 792. — LA FARLOUSE, OU

(871) L'ALOUETTE DES PRÉS (Male et Fed'Europe Buff. v. 5. pl. 660. f. 1. — TIT-LARK Lath. Syn. v. 4. p. 374. — Frisch T. 16.

ALAUDA ARVENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 791. —
L'ALOUETTE VULGAIRE d'Europe Buff.

(999) pl. 363. f. 1. — FIELD-LARK Lath. Syn. v. 4. p. 368.

ALAUDA TATARICA. Gmel. Syst. 1. p. 795. -

- (270) Tartarie Sonnini Edit. de Buff. BLACK LARK Lath. Syn. v. 4. p. 380.
- Alauda Mosellana. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 794. La Rousseline, ou
- (1003) L'ALOUETTE DE MARAÍS d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 661. f. 1. MARSH LARK Lath. Syn. v. 4. p. 377.
- ALAUDA CAPENSIS (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 798.

  L'ALQUETTE SENTINELLE d'Afri-

de la nouvelle Galle meridionale — non (872\*) decris.

# GENUS MOTACILLA. GENRE MOTACILLE.

MOTACILLA ALBA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 960.

LA LAVANDIÈRE d'Europe (Mal)

(279) Buff. pl. 652. f. 1. — WHITE WAGTAIL Lath. Syn. v. 4. p. 395. — Frisch T. 23.

ou l'aguime d'Afrique pays des Nama-

(71) quois Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 178.

Motacilla Cinerea. Gmel. Syst. 1. p. 961.

 $N^{\circ}$ . 79. — LA BERGERONETTE GRI-(283) SE d'Europe Buff. pl. 674. f. 1. —— CI-

H 5 NE-

NEROUS WAGTAIL Lath. Sym. v. 4. p. 397.

- MOTACILLA FLAVA. Gmel. Syst. 1. p. 963. —
  LA BERGERONETTE DE PRINTEMS
- (842) Buff. pl. 674, f. 2. YELLOW WACTAIL Lath. Syn. v. 4. p. 400. Frisch 2. 23.
- MOTACILLA BOARULA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 997. LA GRANDE BER-
- (72) GERONETTE, OU LA BERGERONETTE JAUNE d'Europe (Male et Femelle)

  Buff. pl. 28. f. 1. GREY WAGTAIL

  Lath. Syn. v. 4, p. 398.

#### GENUS SYLVIA,

#### GENRE BEC -FIN.

- SYLVIA SCHOENOBANUS, Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 510. Motacilla Schoenobanus
- (843) Gmel. Syst. 1. p. 953. LA FAUVET-TE DE BOIS, OU LA ROUSSETTE Buff. v. 6. p. 49. Ed. folio. — RED WARE-LER Lath. Syn. v. 4. p. 418.
- Sylvia Phoenicurus. (Mas et Femina) Lath.

  Ind. Orn. v. 2. p. 511. Motacilla
- (844) Phoenicurus Gmel. Syst. 1. p. 987.

  LE ROSSIGNOL DE MURAILLE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 351.

  THE REDSTART Lath. Syn. v. 4. p. 421.
- SYLVIA MAURA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 526.

- Motacilla Maura Gmel. Syst. 1. p. 975. LE TRAQUET PATRE, OU LE MAURE du Cap de B. E. (Male) Vaill. Qif. d'Af. v. 4. pl. 180. f. 1. MOOR WARBLER Lat. Syn. v. 4. p. 458. No. 60.
- SYLVIA LEUCOMELA. Mihi Motacilla Leucomela Gmel. Syst. 1, p. 974. No. 117. —
- (59) LE TRAQUET À TÊTE BLANCHE, OU LE LEUCOMÊLE de Siberie LEUCOMELE WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 456.
- SYLVIA PROTONOTARIUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 542. — Motacilia Protonotarius Gmel.
- (723) Syst. 1. p. 972. LE FIGUIER à VENTRE ET TÊTE JAUNE, OU LE PROTONOTAIRE de la Caroline Buff. pl. 704. f. 2. PROTONOTARY WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 494. No. 128.
- SYLVIA VARIA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 539. —
  Motacilla Varia Gmel. Syst. 1. p. 979. —
- (175) LE FIGUIER VARIÉ de St. Domingue Buff. page 182. v. 6. Ed. folio. -- WHITE-POLL WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 488.

  Edw. t. 300.
- SYLVIA ÆSTIVA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 551.

  Motacilla Æstiva Gmal. Syst. 1. p.
- (398) 169. LE FIGUIER JAUNE TACHETÉ du Cauada Buff. pl. 58. f. 2. YEL-LOW-POLL WARBLER Lath. Syn. v. 4. P. 515.

- Sylvia Madagascariensis. Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 533. Motacilla Madagas-
- (63) carienfis Gmel. Syst. 1. p. 981. LE
  FIGUIER À PAUPIÈRES BLANCHES,
  OU LE CHERIC du Cap de B. E. Buff.
  page 161. v. 6. Edit. folio Vaill. Oif.
  d'Af. v. 3. pl. 132. WHITE-EYED
  WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 475. No. 91.
- Sylvia Tiphia. (Mas et Femina) Mihi Motacilla Tiphia Gmol. Syst. 1. p. 963. —
- (663) LE FIGUIER QUADRICOLOR de Ceylan (Male et Femelle) Vaill. Oif. d'Af. v. 3. -Le Figuier verd et Jaune Buff. v. 6. page 160.

  Edit. folio. -- GREEN INDIAN WARB,
  LER Lath. Syn. v. 4. p. 474. -- Edwards,
  t. 79. (le Male)
- p. 547. Motacilla Troglodytes Gmel.
- (58) Syst. 1. p. 993. LE ROITELET TRO-GLODYTE d'Europe Buff. pl. 651. f. 2. — THE WREN Lath. Syn. v. 4. p. 506. —— Frisch t. 24.
- Orn. v. 2. p. 508. Motacilla Regulus

  - SYLVIA CAYANA. Lath. Ind. Orn. v. s. p. 545.

	• • •
	- Motacilla Caijana Gmel. Syst. 1. p. 990.
(70)	- LE PIPIT BLEU de Caijenne (Male)
5,4-7	
. •	Buff. pl. 669. — CAYENNE WARBLER
	Lath. Syn. v. 4. p. 502.
	LA FAUVETTE à LONGUE
	QUEUE, OU LE CITRIN du Cap de B.
(62)	E. Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 127.
	LA FAUVETTE à CUL ROUX,
,	
	ou le grignet d'Afrique (Male)
(61).	Vaill. Oif. d'Af. v. 3. pl. 126.
SYLVE	1A SIALIS. (Mas) Lath. Syn. v. 2. p. 446.
•	- Motacilla Sialis Gmel Syst. 1. p. 989
(77)	LE ROUGE-GORGE BLEU de l'Amerique
	Septentrionale (Male) Buff. pl. 396. f.
	I. BLUE WARBLER Lath. Syn. v.
	4. p. 446.
	LE TRAQUET à EPAULET-
	TES RÔSES, OU LE TRAQUET COM-
(788)	MANDEUR d'Afrique Côte d'Angole Vaille
	Oif. d'Af. v. 4. pl. 189.
SYLVI	A HORTENSIS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v.
	2. p. 507. — Moțacilla Hortenfis Gmel.
(67)	Suct. I A. OSS I.A RAHVETTE

d'Europe (Male) Buff. pl. 579. f. 1. ——
PETTYCHAPS Lath. Syn. v. 4. p. 413.
SYLVIA RUBICOLA. (Mas et Femina) Lath. Ind.

Orn. v. 2. p. 523. - Motacilla Rubicola

(Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 678.

f. I.

(874) Gmel. Syst. 1. p. 969. — LE TRAQUET

- f. i. —— STONE SMICH Lath. Syn. v. 4. p. 448.
- SYLVIA RUBETRA. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 525. — Motacilla Rubetra
- (875) Gmel. Syst. 1. p. 967. LE TARRIER, OU GRAND TRAQUET d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 678. f. 2. WHINCHAT Lath. Syn. v. 4. p. 454. Frisch T. 22.
- SYLVIA ENANTHE. (Mas et Femina) Lath. Syn. v. 2. p. 529. Motacilla Enanthe Gmel.
- (876) Syst. 1. p. 966. LE CUL-BLANC, OU MOTTEUX (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 554. f. 1 et 2. WHEAT-EARE Lath. Syn. v. 4. p. 465.
- SYLVIA SUECIA. (Mas et Femina) Lath. Ind.

  Orn. v. 2. p. 521. Matacilla Suecia
- (877) Gmel. Syst. 1. p. 989. LE GORGE-BLEUE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 610. f. 1 et 2. — BLUE-THROA-TED WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 444. — Frisch. T. 19.
- Sylvia Modularis. (Mas et Femina) Lath.

  Ind. Orn. v. 2.p. 511. Motacilla Modu-
- (878) laris Gmel. Syst. 1. p. 952. LE

  TRAINE BUISSON, OU LA FAUVET
  TE D'HIVER d'Europe Buff. pl. 615. f. 1.

   HEDGED SPARROW Lath. Syn. v.

  4. p. 419. Frisch T. 21.

- SYLVIA ALPINA. (Mas et Femina) Mihi Motacilla Alpina (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 957.
- (879) LA FAUVETTE DES ALPES (Male) le et Femelle) Buff. pl. 668. f. 2. (le Male) ALPINE WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 434.
- SYLVIA ERYTHACUS. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 513. Motacilla
- (880) Erythacus Gmel. Syst. 1. p. 988. LE
  ROUGE-QUEUE des Voges (Male et Femelle) Buff. v. 6. p. 82. Edit. folio.

  RED-TAIL Lath. Syn. v. 4. p. 425.

  Frisch T. 20.
- SYLVIA LONGICAUDA. Lath. Ind. Orn. v. 2.

  545. Motacilla Longicauda Gmel. Syst.
- (881) I. p. 954. LE PETIT FIGUIER
  à LONGUE-QUEUE de la Chine Sonnerat voy. v. 2. p. 206. Sonnini
  Edis. de Buff. LONG-TAILED
  WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 501.
- OU LE MONTAGNARD d'Afrique pays
  (56) des grands Namaquois Vaill. Oif. d'Af. v. 4.
- (56) des grands Namaquois Vaill. Oif. d'Af. v. 4.
  pl. 184. f. 2.
- SYLVIA HOTTENTOTTA. (Mas) Lath. Ind. Orn.
  v. 2. p. 531. Motacilla Hottentotta
- (53) Gmel. Syst. 1. p. 963. LE TRAQUET

  IMITATEUR d'Afrique Cap de Bonne Esperance (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl.

  181. Grand Motteux, ou Cul-blanc

- Buff. v. 6. p. 135. Edit. folio. CAPE WHEAT-EAR Lath. Syn. v. 4. p. 470.
- Sylvia Atricapilla. (Mas et Femina) Lath. Ind. v. 2. p. 508. Motacilla Atricapilla
- (873) Gmel. Syst. 1. p. 970. LA FAUVETTE à TÊTE NOIRE d'Europe (Male et Femelle)

  Buff. pl. 580. f. et 2. BLACKAP Lath.

  Syn. v. 4. p. 415. Frisch T. 23.
- SYLVIA CAYANOCEPHALA. Lath. Ind. v. 2. p. 546. Motacilla Caijanocephala Gmel. Syst.
- (558) 1. p. 990. LE PETIT VERD de Caijenne Buff. v. 6. p. 209. Edit. folio BLUE-HEADED WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 503.
- SYLVIA MALACHURA. (Mas et Femina) Mihi Mussicapa Malachura Lath. Ind. Supp. p.
- (451) LII. LA FAUVETTE à QUEUE GAZÉE des lles l'Archipel Indien (Male et Femelle) Vaill. Oif. & Af. v. 3. pl. 130. f. 2. (le Male) SOFT-TAILED FLY-CATCHER Linn. Trans. v. 4. pl. 21. Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 224.
- MILLIER d'Afrique Cap de Bonne Espe-(54) rance (Male) Vaill. Oif. d'Af. v. 4. pl. 186.
- (800\*) BIN d'Isle de France non decrit Espèce, nouvelle.
- SYLVIA PUSILLA (Mas et Femina) Lath. Ind. (1001) Supp. p. LVI. LE FIGUIER NAIN de

v. 2. p. 251. - White pl. p. 257.

de la nouvelle Hollande (Male. et Femelle)

— DWARF WARBLER Lath. Syn. Supp.

	LE FIGUIER SERCLE-EN-
(996*)	QUEUE de la Guijane - non decrit.
	LE FIGUIER LANCIFER de
	de la nouvelle Galle Meridionale — non
(997*)	decrit Epèce nouvelle.
	A PASSERINA. (Mas et Femina) Lath. Ind.
	v. 2. p. 508. — Motacilla Passerina Gmel.
(ioio)	p. 954. — PETITE FAUVETTE,
(1019)	OU LA PASSERINETTE d'Europe (Male
	et Femelle) Buff. pl. 579. f. 2. — PAS-
C	SERINE WARBLER Lath. Syn v. 4. p. 414.
SYLVI	A CURRUCA. (Mas et Femina) Lath. Ind.
_	v. 2. p. 509. — Motacilla Curruca Gmel.
(1020)	Syst. 1. p. 954. — LA FAUVETTE
	BABILLARDE d'Europe (Male et Femelle)
	Buff. pl. 580. f. 3. — BABBLING WAR-
	BLER Lath. Syn. v. 4. p. 417. — Frisch
•	T. 21.
SYLVI	A SALICARIA. (Mas et Femina) Lath. Ind.
•	v. 4. p. 516. — Motacilla Salicaria Gmel.
(1021)	Syst. 1. p. 955. — LA FAUVETTE
	DE ROSEAU d'Europe (Male et Femelle)
	Buff. pl. 581. f. 2 SEDGE WAR-
	BLER Lath. Syn. v. 4. p. 430.
	LE GRIVETIN (Male)
	d'Afrique Riviere Gamtos Vaill. Ois.
(1040)	d'Af. v. 3. pl. 118.
\7-J	I Cur-

- SYLVIA LUSCINIA Lath. Ind. v. 2. p. 506.

  Motacilla Luscinia Gmel. Syst. 1. p. 950.
- (1057) LE ROSSIGNOL d'Europe Buff. pi. 615. f. 2. — Frisch T. 21. — NIGHTIN-GALE Lath. Syn. v. 4. p. 408.
- SYLVIA RUFA. (Mas) Lath. Ind. v. 2. p. 516.

   Muscipeta minima Frisch T. 24.
- (1058) LA FAUVETTE ROUSSE, OU LA PE-TITE ROUSSE ROLLE (Male) d'Europe Buff. pl. 581. f. 1. — RUFOUS WAR-BLER Lath. Syn. v. 4. p. 431. No. 22.
- SYLVIA ARUNDINACEA. Lath. Ind. v. 2. p. 510.

  Motacilla Arundinacea Gmel. Syst. 1.
- (1066) p. 992. LA BOUSCARLE de Provence Buff. pl. 655. f. 2. — REED WREN Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 184.
- SYLVIA FICEBULA. (Mas et Femina) Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 517. Motacilla Ficedula
- (1067) Gmel. Syst. 1. p. 956. Frisch T. 22.:

  (Mas) LE BECFIGUE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 668. f. 1. EPI
  CUREAN WARBLER Lath. Syn. v. 4.

  p. 432.
- SYLVIA Nævia. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 517.

   Motacilla Nævia Gmel. Syst. 1. p. 957.
- rope Buff. pl. 581. f. 3. FIG-EATER Lath. Syn. v. 4. p. 433.

#### GENRE MANAKIN.

- PIPRA PAREOLA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 999. LE TIJE, OU GRAND MANAKIN HUP-
- (43) PÉ de Caijenne (Male) Buff. pl. 687. f. 2.

  Desmaret H. N. des Manakins pl. Enl. —

  BLUE BACKED MANAKIN Lath. Syn.

  v. 4. p. 520.
- PÍPRA PAREOLA. Varietas. (Mas) LE TIJE, OU CRAND MANKIN HUPPÉ (passant
- (504) du feun age à l'age fait) (Male) Desmaret Manak. pl. Enl.
- PIPRA PAREOLA. Hornotinus (Mas) LE TIJE, OU GRAND MANANAKIN (Dans
- (847) fon premier age) (Male) non figuré.
- PIPRA ERYTHROCEPHALA. (Mas) Gmel. Syst.
  1. p. 1001. LE MANAKIN à TÊTE
- (296) D'OR du Bréfil (Male) Buff. pl. 34. f. 1.

  —— GOLD-HEADED BLACK TITMOUS

  Edw. t. 21. —— Lath. Syn. v. 4. p. 522.
- PIPRA LEUCOCAPILIA (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1002. LE MANAKIN à TÊTE BLAN-
- (370) CHE de la Guijane (Male) Buff. pl. 34. f. 2.

  WHITE CAPPED MANAKIN Lath.

  Syn. v. 4. p. 523.
- PIPRA AUREOLA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 1001. — LE MANARIN ROUGE
- (332) de Mexique (Male et Femelle) Buff. pl. 34.

  f. 3. —— RED AND BLACK MANAKIN Lath. Syn. v. 4. p. 525.
  - GRAND MANAKIN TACHE-

- TÉ, OU LE COTIMANAK de Caijenne:

  (46\*) non décrit Espèce nouvelle.
- PIPRA PUNCTATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. Supp.
  v. 2. p. LVI. LE PETIT MANAKIN
- (964) DERLÉ des Îles de l'Ocean Austral (Male)
  —— SPECKLED MANAKIN Lath. Syn.
  Sup. v. 2. p. 253. Nat. Misc. T. III.
- PIPRA ALBITRONS. (Mas) Gmel. Syst. 1-p. 1000-LE PLUMET-BLANC, OU LE MA-
- (494) NICUP de Caijenne (Male) Buff. pl. 707.

  f. I. WHITE-FACED MANAKIN

  Lath. Syn. v. 4. p. 530.
- PIPRA SERENA. Gmel. Syst. 1. p. 1002. LE MANAKIN à FRONT BLANC de Caijenne
- (50) Buff. pl. 324. f. 2. WHITE-FRON-TED MANAKIN Lath. Syn. v. 4. p. 521.
- PIPRA MANACUS. Gmel. Syst. 1. p. 1002. —
  LE MANAKIN CASSE-NOISETTE du
- (40) Bréfil (Male) Buff. pl. 302. f. 1. Edwards T. 260. f. 1. — BLACK-CAP-PED MANAKIN Lath. Syn. v. 4. p. 521.
- PIPRA ATRICAPILLA Gmel. Syst. 1. p. 1003.

   LE COTIMANAK GRIS à CALOTTE
- (908) NOIRE de la Guijane Manakin Cendré Buff. pl. 687. f. 1. BLACK-CROWNED MANAKIN Lath. Syn. v. 4.
- PIPRA FULYA. (Mas) Mihi. LEMANAQUIN JAUNE ET NOIR, OU MANAKIN D'OR (297) de la Guijane (Male) non décrit.

GE.

# GENUS PARUS.

### GENRE MESANGE.

- PARUS CÆRULEUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1008. LA MESANGE BLEUE d'Eu-(657) rope (Male) Buff. pl. 3. f. 2. BLUE
- (657) rope (Male) Buff. pl. 3. f. 2. BLUE TITMOUS Lath. Syn. v. 4. p. 543. —— Frisch T. 14.
- PARUS CAYANEUS. (Mas) Mihi. Motacilla Caijanea Gmel. Syst. 1. p. 991. LA
- (84) MESANGE à FRONT ET MOUSTACHES BLEUES, OU LA MESANGE SUPERBE du Cap de Diemen (Male) SUPERB WARBLER Lath. Syn. v. 4. p. 501. pl. 53.
  - NOIRE, OU LE GRISET d'Afrique Cap
- (167) de B. E. Vaill. Oif. d'Af. pl. 138.
- PARUS CAUDATUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.
  1. p. 1010. Frisch T. 14. LA
- (757) MESANGE à LONGUE QUEUE (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 502. f. 3. (le Male) LONG-TAILED TITMOUSE Lath. Syn. v. 4. p. 550.
- PARUS BIARNICUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 1011. Frisch T. 8. LA
- (730) MESANGE BARBUE, OU LE MOUSTA-CHE (Male et Femelle) d'Europe Buff. pl. 618. f. i. et 2. — BEARDED TITMOU-SE Lath. Syn. v. 4. p. 552.
- PARUS MAJOR. Gmel. Syst. 1. p. 1006. LA GROSSE MESANGE, OU CHARBONNIÉ-

- (859) RE d'Europe *Buff. pl. 3. f. 1.* GREAT TITMOUSE, OR OX-EYE *Lath. Syn. v.* 4. p. 536.
- PARUS CRISTATUS. (Mas et Femina) Guel. Syst.
  1. p. 1005. Frisch T. 14. LA ME-
- (905) SANGE HUPPÉE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 502. f. 2. CRESTED,
  TITMOUSE Lath. Syn. v. 4. p. 545.
- PARUS PENDULINUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1014.— LE REMIS, OU MESANGE
- (906) DE POLOGNE (Male) Buff. pl. 618. f. 3.

  PENDULINE TITMOUSE Lath.

  Syn. v. 4. p. 547.
- PARUS PALUSTRIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1009.

  LA MESANGE DE MARAIS, OU
- (907) LANONETTE CENDRÉE d'Europe (Male) Buff. pl. 3. f. 3. — MARSH TIT-MOUSE Lath. Syn. v. 4. p. 541.
- PARUS ATER. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1009. ——
  LA PETITE MESANGE CHARBONNIE-
- (1017) RE (Male) d'Europe Buff. v. 6. p. 257.

  Edit. folio. Frisch T. 13. COLEMOUSE Lath. Syn. v. 4. p. 540.

# GENUS HIRUNDO. GENRE HIRONDELLE.

HIRUNDO RUSTICA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 1015. — Frisch T. 18. — L'HIRON-(808) DELLE DE CHIMINÉE, OU L'RIRON-DELLE DOMESTIQUE (Male) Buff. pl.

- 543. f. i. CHIMNY SWALLOW Leth. Sym. v. 4. p. 561.
- HIRUNDO FASCIATA. Gmel. Syst. 1. p. 1022. -L'HIRONDELLE à CINTURE BLAN-
- CHE de Caijenne Buff. pl. 724. f. 2. WHITE BELLIED SWALLOW Lath. Syn. v. 4. p. 567.
- HIRUDO LEUCOPTERA. Gmel. Syst. 1, p. 1022. - L'HIRONDELLE à VENTRE BLANC
- de Caijenne Buff. pl. 546, f. 2. --- WHI7 (379) TE WINGED SWALLOW Lath. Syn. v. 4. P. 577.
- HIRUNDO PELAS GIA. Gmel. Syst. 1. p. 1023. -L'HIRONDELLE BRUNE à CUTIPEN-
- NES de la Lousiane Buff. pl. 726. f. 2. -(238) ACULATED SWALLOW Lath. Syn. v. . 4. p. 583.
- HIRUNDO BORBONICA. Gmel. Syst. 1. p. 1917. - L'HIRONDELLE à VENTRE TA-
- CHETÉ, OU L'HIRONDELLE DES (725)BLEDS d'isle de France Buff. pl. 544. f. 2. (Varieté) --- WHEAT SWALLOW Lath, Syn. v. 4. A. 581.
- HIRUNDO URBICA. Gmel. Syst. 1. p. 1017. -L'HIRONDELLE à CROUPION BLANC,
- OU LE PETIT MARTINET d'Europe (909) Buff. pl. 542. f. 2. - THE MARTINET Lath. Syn. v. 4. p. 564.
- HIRUNDO RIPARIA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 1019. - L'HIRONDELLE DE I 4

- (910) RIVAGE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 643. f. 2. —— SAND MARTIN OR SHORE-BIRD Lath. Syn. v. 4. p. 568. —
  Frisch T. 18.
- HIRUNDO APUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.

  p. 1020. —— LE GRAND MARTINET
- (911) d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 542. f.

  1. BLACK MARTIN OR SWIFT

  Lath. Syn. v. 4. p. 584. Frisch T. 17.
- HIRUNDO MELBA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 1023. LE GRAND MARTI-
- (951) NET à VENTRE BLANC d'Europe (Male et Femelle) Edw. t. 27. Buff. Oif. WHITE BELLIED SWIFT Lath. Syn. v. 4. p. 586.
- L'HIRONDELLE VERTE des

  lles Sandwich non decrit Espèce nou
  (986\*) velle.
- GENUS CAPRIMULGUS. GENRE ENGOULE-VENT.
- CAPRIMULGUS VIRGINIANUS. Gmel. Syst. 1.
  p. 1028. L'ENGOULEVENT à GOR-
- (794) GE BLANCHE, OU LE WHIP-POUR-WILL de Virginie Buff. v. 6. page 568. — VIRGINIAN GOATSUCKER Lath. Syn.
- CAPRIMULGUS EUROPÆUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 1027. L'ENGOULEVENT d'Europe (Male et Femelle) Buff.

pl. 193. — EUROPEAN GOATSUCKER Lath. Syn. v. 4. p. 593. — Frisch T. 101.

CAPRIMULGUS GRANDIS (Mas et Femina) Gmel.

Syst. 1. p. 1029. — LE GRAND ENGOU-

- (497) LEVENT, OU GRAND IBIJAW de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 325. (le Male) — GRAND GOATSUCKER Lath. Syn. v. 4. p. 590.
- CAPRIMULGUS SEMITORQUATUS. Gmel, Syst. 1. p. 1031. LE PETITEN-
- (603) GOULEVENT TACHETÉ de Caijenne

  Buff. pl. 734. WHITE-COLLARED

  GOATSUCKER Lath. Syn. v. 4, p. 599.
- CAPRIMULGUS ASIATICUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 588. L'ENGOULEVENT à
- (608) COLIER d'Afrique Vaill. Ois. d'Af. v. 1.
  pl. 49. BOMBAY GOATSUCKER Lath.
  Syn. Supp. v. 2. p. 260.

GOULEVENT GRIVELÉ de la Guijane —

(621\*) non décrit.

GOULEVENT, OU L'ENGOULEVENT

- (709\*) PIGMÉ de la Guijane non décrit Espèce nouvelle.
- CAPRIMULGUS CAYANENSIS. Gmel. Syst. i.
  p. 1031. L'ENCOULEVENT VARIÉ
- (65) à QUEUE BLANCHE de Caijenne Buff. pl. 760. WHITE NECKED GOATSUC-KER Lath. Syn. v. 4. p. 599.

CAPRIMULGUS MEGACEPHALUS. (Mas) Lath. Ind. Orn. Supp. page LVIII. — LE GRAND

(965) ENGOULE VENT à GROSSE TÊTE, OU LE BENIT de la nouvelle Hollande (Male)

—— GREAT-HEADED GOATSUCKER,

Lath. Supp. 10 Syn. v. 2. p. 263.

### GENUS MENURA.

GENRE MENURA.

MENURA NOVÆ HOLLANDIÆ. (Mas et Femina) Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. LXI.

(255) LE MENURA à QUEUE EN LYRE, OU LE PARKINSON (Male et Femelle) de la nouvelle Hollande Audebert Oif. Dorés pl. 14. à la fuite des Oifeaux de Paradis — NEW HOLLAND MENURA Lath. Supp. to Syn. v. 2. p. 271. pl. 136.

### GENUS COLUMBA.

GENRE PIGEON.

- COLUMBA CORONATA, Gmel. Syst. 1. p. 774. LE GRAND PIGEON COURONNÉ, OU
- (626) LE GOURA des Îles de l'Ocean Indien Buff.

  pl. 118. GREAT CROWNED PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 620. Edwards t. 338.
- COLUMBA NICOBARICA (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 783. LE PIGEON RAMIER DE NI-
- (328) GOBARE (Male) Buff. pl. 491. NICO-BAR PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 642. No. 38. — Edwards t. 339.

- Columba Palumbus. Gmel. Syst. 1. p. 776. —
  Frisch T. 138. LE PIGEON RAMIER
- (858) d'Europe Buff, pl, 316. RING PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 635.
- COLUMBA ÆNEA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 780.

  LE PIGEON RAMIER DES MOLUT
- (478) QUES (Male) Buff. pl. 164, Le pigeon cuivré mangeur de Muscade Sonnerat voy. pl. 102. NUTMEG BIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 636. No. 30.
- COLUMBA CHALCOPTERA. (Mas) Lath. Ind., Orn. v. 2. p. 604. — LE PIGEON RA-
- (490) MIER À AILES DORÉES, OU LE GOA-GANG des lles Norfolk (Male) Sonnini Edit. de Buff. v. 7. p. 309. BRONZE WINGED PIGEON Lath. Syn. to Supp. v. 2. p. 266.
- COLUMBA RUBRICAPILLA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 599. No. 19. LE PIGEON
- (465) VIOLET à TÊTE ROUGE d'Antigue (Male) Sonnini Edit. de Buff. v. 7. p. 261. — Sonnerat voy. p. 112. pl. 67. — RED CROW-NED PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 628.
- COLUMBA SPECIOSA. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 783. LE PIGEON RAMI-
- (327) RET à COU ET POITRINE ECAILLÉE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 213.

   SCALLOP-NECKED PIGEON Lath.
  Syn. v. 4. p. 643.

- COLUMBA AROMATICA. (Mas et Femina) Gmel, Syst. 1. p. 778. - LE PIGEON VERD
- D'ANBOINE (Male et Femelle) Buff. pl. (323)163. (la Femelle) ---- AROMATIC PI-GEON Lath. Syn. v. 4. p. 631. No. 21.
- COLUMBA AROMATICA. Varietas (Mas) -LE PIGEON BRUN D'ANBOINE (Male) - Varieté du Pigeon verd.
- COLUMBA JAVANICA. Gmel. Syst. 1. p. 781. No. 55.
- COLUMBA INDICA. Gmel. Syst. 1. p. 785. Nº. 29.

TURVERT, OU TOURTERELLE VER-

- (329) TE DORÉE des Indes Buff. pl. 177. -GREEN-WINGED PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 625. — Edwards t. 14.
- COLUMBA GUINEA. Gmel. Syst. 1. p. 774. LE PIGEON RAMIER ROUX à TACHES
- TRIANGULAIRES d'Afrique. Edwards t. (620) 75. — Tourterelle du Cap de Bonne Esperance Sonnerat voy. v. 2. p. 179. TRIANGULAR SPOTTED PIGEON Lath. Syn. v. 4. p. 639.
- COLUMBA TURTUR. Gmel. Syst. 1. p. 786. -LA TOURTERELLE d'Europe Buff. pl.
- 394. COMMMON TURTLE Lath. (912) Syn. v. 4. p. 644. - Frisch T. 140.
- COLUMBA RISORIA. Gmel. Syst. 1. p. 787. --LE TOURTERELLE à COLLIER d'Euì

- (913) rope Buff. pl. 244. COLLARED TURTLE Lash. Syn. v. 4. p. 648. Frisch T. 14.
- QUE MOUCHETÉE de la Chine.
- (320) Tourterelle grife de la Chine Sonnerat voy. v. 2. pl. 102. p. 176. — CHINESE GREY TURTLE Lath. Syn. v. 4. p. 649.
- COLUMBA CRUENTA. Gmel. Syst. 1. p. 785. ——
  LA TOURTERELLE GRISE ENSAN-
- (318) GLANTÉE de Ceylan Sonnerat voy. v. 2.
  p. 52. pl. 21. RED BREASTED
  TURTLE Lath. Syn. v. 4. p. 657.
- COLUMBA CAYANOCEPHALA. (Mas) Gmel. Syst.

  1. p. 781. LA TOUR TERELLB 2
- (656) CRAVATTE, de la Jamaique (Male) Buff. pl. 174. BLUE HEADED TURTLE Lath. Syn. v. 4. p. 651.
- COLUMBA CAROLINENSIS (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 789. No. 37.
  - COLUMBA CANADENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 785. No. 30.

  - COLUMBA CAPENSIS. Gmel. Syst. 1. p. 790. LA
    TOURTELETTE, OU TOURTERELLE
    2 GRA-

(326)	å CRAVATTE NOIRE d'Afrique Buff. pl.
• •	140 CAPE TURTLE Lath. Syn. v.
	4. p. 666.
' <del>در در در در</del>	LE PIGEON RAMIER
	BLEU à NUQUE ECAILLÉE de la Tri-
(750*)	nité non décrit.
	LE PIGEON RAMIER
-	ECAILLÉ, OU LE RAMMERON d'Afri-
Vrn6*1	que pays Auteniquoi (Male) — non décrit.
	LE PIGEON à CINTURON
	NOIR des lles de l'Ocean Indien — non
·	
<b>(470*)</b>	
	LE PIGEON à FRONT-
	NUE ET EPAULETTES VIOLETTES
(776*)	d'Afrique Côte d'Angôle non décrit
	Espèce nouvelle.
.Colub	ABA AFRA (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 786.
	- LA TOURTERELLE à TACHES
(634)	DORÉES de la Côte d'Angôle (Male)
	Tourterelle du Sénégal Buff. pl. 160.
1	AFRICAN TURTLE Lath. Syn. v. 4.
	p. 656.
COLU	MBA LEUCOCAPILLA (Mas) Mihi. —
*	Columba Capite albo Seligman Sam. Selt.
	Vög. v. 1. pl. 50. — LE PIGEON RA-
	MIER à CALOTTE BLANCHE de la Tri-
3	
	nite (Male)
	LA TOURTEREL-
	LE VELOUTÉE des Îles Sandwich
<b>(.950*)</b>	non decrit Espece nouvelle.

LA TOURTEREL

LE à CALOTTE VIOLETTE des Iles

(978*)	Sandwich (Male) — non decrit.
(639*)	GEON RAMIER ECLATANT des lles des Amis (Male) — non décrit.
<del></del>	MIER ARDOISÉ d'Otaicti (Male)
(57°°)	non decrit.
	779. LA TOURTERELLE GRISE
(324)	DE SURATE Sonnerat voy. v. 2. p. 180. — CABAYAN TURTLE Lath. Syn. v. 4. p. 652.
€ oL UI	MBA MALACCENSIS Gmel. Syst. 1. p. 788.  LA PETITE TOURTERELLE
(322)	RAYÉE de Queda Sonnerat vey. v. 2. p. 177.  — MALACCA TURTLE Lath. Syn. v. 2. p. 661.
	TERELLE VERTE à PLASTRON ROU-
(471*)	GE de Java (Male) — non decrit.
€0È U}	ABA PURPURATA. Gmel. Syst. 1. p. 784.  — LA TOURTERELLE à COURONNE
(472)	PURPLE CROWNED PIGEON Lath.
	Syn. v. 4. p. 626.
Colu	MIBA PURPURATA. (Varietas) - LE
•	KURUKURU, OU TOURTERELLE à
	· 60 De

(914)	COURONNE POURPRE de Tongotaboo — Lath. Syn. v. 4. p. 626. — Varietas.
	LA TOURTERELLE
	à VENTRE BLANC d'Afrique pays d'Au-
<b>(</b> 325*)	teniquoi non decrit.
	LA TOURTERELLE
	POURPRÉE d'Afrique pays Auteniquoi (Ma-
(319*)	le) — non decrit.
	LE PIGEON CUI-
(658*)	VREUX de Tongotaboo. (Male) — non decrit.
CoLUI	MBA PASSERINA. (Mas et Femina) Gmel.
	Syst. 1. p. 787. — LA PETITE TOUR-
(915)	TERELLE, OU LE COCOTZIN d'Ame-
	rique (Male et Femelle) Buff. pl. 243. f. 1.
	et 2. — GROUND DOVE Lath. Syn.
•	v. 4. p. 659.
Colu	MBA MINUTA. (Femina) Gmel. Syst. 1. p.
	788. — TRÈS PETITE TOURTEREL-
(916)	•
(3)	l'Amerique Meridionale (Femelle) Briss. v. 1.
•	p. 116. — Seligman v. 1. pl. 52. — PASSE-
	RINE TURTLE Lath. Syn. v. 4. p. 660.
ror n	MBA MONTANA. (Mas) Lath. Ind. Ornith.
COLO	v. 2. p. 594. — Gmel. Syst. 1. p. 772.
(1061)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(1961)	BLANCHES de la Jamaique (Male) — Le
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
: :	Pigeon roux Brisf. Orn. v. 1. p. 131.
÷ 🗓	PARTRIDGE PIGEON Lath. Syn. v. 4.
* : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	p. 615. — Edw. t. 119.

Co-

COLUMBA ENAS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 589. — Gmel. Syst. 1. p. 769. —

(1064) Frisch T. 139. — LE PIGEON VUL-GAIRE, OU SAUVAGE d'Europe (Male) STOCK PIGEON, OR STOCK DOVE Lath. Syn. v. 4. p. 604.

### GENUS PAVO.

GENRE PAON.

PAVO CRISTATUS INDICUS. (Mas) Temminck

Gallinaces — LE PAON SAUVAGE, OU

(660) PAON PRIMITIF des lles de l'Archipel Indien

(Male) Temm. H. N. des Gall. v. 1. pl. Enl.

### GENUS GALLUS.

GENRE COQ.

GALLUS DOMESTICUS. (Mas) Briss. Orn. v. 1.

—— Temm. Gall. —— LE COQ COM-

(700) MUN, OU COQ à CRÊTE (Male) Buff. pl.

1. — Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. —

DOMESTIC COCK Lath. Syn. v. 4. p. 700.

GALLUS CRISTATUS. (Mas) Temm. Gall.

LE COQ DOMESTIQUE HUPPÉ (Male)

(952) Buff. pl. 49. — Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — [CRESTED COCK Lath. Syn. v. 4. p. 703.

Gall. — LE COQ SANS CROUPION,

(257) OU LE WALLIKIKILI de Ceylan (Male)

K (Es-

- (Espece primitive) Temm. Gall. v. I. pl. Enl.
- GALLUS FURCATUS (Mas) Temm. Gall. ——
  LE COQ à QUEUE FOURCHUE, OU LE
- (401) MALKOTORA (Male) des Iles de l'Archipel Indien (Espèce primitive) —— Temm.
  Gall. v. 1. pl. Enl.
- Galeus Crispus. (Mas) Temm. Gall. ——
  Brisf. Orn. v. 1. —— LE COQ FRISÉ
- (953) (Male) Buff. Oif. v. 2. Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. CRISPED COCK Lath. Syn. v. 4. p. 704.
- GALLUS LANATUS. (Mas) Temm. Gall.

  LE COQ à DUVET du Japon (Male) Buff.
- (1047) Buff. pl. 98. (la Femelle) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. SILK COCK Lath. Syn. v. 4. p. 708.

# DIVISION HOUPPIFÈRE.

- GALLUS IGNITUS. (Mas et Femina) Temm. Gall.

   Phasianus Ignitus Lath. Ind. v. 2. —
- (440) LE MACARTNEY, OU HOUPPIFERE à CROUPEON COULEUR DE FEU (Male et Femelle) des lles de l'Archipel Indien Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le Faisant Couleur de Feu Sonnini Edit. de Buff. v. 6. p. 247. Fire-Backed Phesant Embas. to China v. 1. p. 246. pl. 13. Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 274.

- GALLUS IGNITUS. (Mas) (Varietas) Temm.

  Gall. LE MACARTNEY, OU HOUP-
- (740) PIFÈRE à CROUPION COULEUR DE FEU (Male) (Varieté) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.
- GALLUS IGNITUS. (Mas) (Junior) Temm. Gall.

  LE MACARTNEY, OU HOUPPIFE-
- (473) RE à CROUPION COULEUR DE FEU (Jeune Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.

### GENUS PHASIANUS.

GENRE FAISAN.

- Phasianus Impejanus Lath. Ind. Orn. v. 2. —
  LE FAISAN MOMOUL de l'Indostan (Male)
- (920) Sonnini Edit. de Buff. v. 6. p. 244. Temm.

  Gall. v. 1. pl. Enl. IMPEYAN PHESANT Lath. Syn. Supp. v. 1. p. 208. No. 11.
- PHASIANUS SUPERBUS. Gmel. Syst. 1. p. 744.

   LE FAISAN SUPERBE de la Chine
- (054) (les deux longue plumes caudale) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. —— Sonnini v. 6. p. 242. SUPERB PHESANT Lath. Syn. v. 4. p. 709.
- PHASIANUS COLCHICUS. (Mas et Femina) Gmel.
  p. 741. LE FAISAN d'Europe (Male
- (589) et Femelle) Buff. pl. 121 et 122. Temm.

  Gall. v. 1. pl. Enl. Frisch T. 123. —

  COMMON PHESANT Lath. Syn. v. 4.
  p. 712.

K 2

PHA-

- PHASIANUS COLCHICUS Varius (Mas) Gmet.

  Syst. 1. p. 742. Frisch T. 124. —
- (1070) LE FAISAN PANACHÉ Varieté (Male)

  Buff. Oif. v. 2. Temm. Gall. v. 1. pl.

  Enl. VARIEGATED PHESANT Lath.

  Syn. v. 4. p. 267.
- PHASIANUS TORQUATUS (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 742. LE FAISAN à COLLIER
- (376) de la Chine (Male) Sonnini v. 6. p. 197.

  —— Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.

  RING-PHESANT Lath. Syn. v. 4. p. 715.

  var. A.
- PHASIANUS PICTUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 743. FAISAN DORÉ, OU LE
- (252) TRICOLOR HUPPÉ de la Chine (Male et Femelle) Buff. pl. 217. Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. PAINTED PHESANT Lath. Syn. v. 4. p. 717.
- PHASIANUS NYCTHEMERUS. (Mas et Femina)

  Gmel. Syst. 1. p. 743. FAISAN NOIR
- (253) ET BLANC, OU LE BICOLOR HUPPÉ de la Chine (Male et Femelle) Buff. pl. 123 et 124. Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. PENCILLED PHESANT Lath. Syn. v. 4. p. 719.
- PHASIANUS PICTUS. (Hijbrijdus) (Mas) Temm.

  Gall. —— LE FAISAN POURPRÉ de (1004) la Chine (Male) Temm. Gall. v. 1. pl.

  Enl.

# GENUS POLYPLECTRON. GENRE EPERONNIER.

POLYPLECTRON ARGUS. (Mas) Temm. Gall. —
Pavo Bicalcaratus Gmel. Syst. 1. p. 730. —

(384) Lath. Ind. v. 2. p. 617. — L'EPERONNIER ARGUS de la Chine (Male) Temm.
Gall. v. 1. pl. Enl. — l'Eperonnier Buff.
pl. 492. — Edw. s. 67. — Petit Paon
de Malacca Sonnerat voy. v. 2. pl. 99. —
Iris Peacock Lath. Syn. v. 4. p. 673.

### GENUS MELEAGRIS.

GENRE DINDON:

MELEAGRIS GALLOPAVO. Gmel. Syst. 1. p.
732. — LE DINDON DOMESTIQUE
(680) Buff. pl. 97. — Temm. Gall. v. 1. pl.

(680) Buff. pl. 97. — Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — DOMESTIC TURKEY Lath. Syn. v. 4. p. 679. — Frisch T. 122.

### GENUS ARGUS.

GENRE ARGUS:

Argus Giganteus. (Mas et Femina) Temm.

Gall. — Phasianus Argus Lath. Ind. v.

(502) 1. p. 629. (Mas) — LE GRAND ARGUS, OU LE LUEN des lles de l'Archipel Indien (Male et Femelle) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Luen Buff. Oif. v. 2. — Argus Phesant Lath. Syn. v. 4. p. 710.

K 3

GE-

# GENUS NUMIDA.

## GENRE PEINTADE.

NUMIDA MELEAGRIS. Gmel. Syst. 1. p. 744. —
LA PEINTADE à POITRINE BLEUE

(288) d'Europe Buff. pl. 108. — Temm. Gall.
v. 1. pl. Enl. — GUINEA PINTADO

Lath. Syn. v. 4. p. 685. — Frisch T. 126.

NUMIDA CRISTATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v.
2. p. 622. — Pall. Spic. v. 4. p. 15. t.

(1071) 2. — LA PEINTADE HUPPÉE d'Afrique

(Male) Temm. Gall v. 1. pl. Enl. —

CRESTED PINTADO Lath. Syn. v. 4. p.
688. t. 62.

## GENUS CRAX.

## GENRE HOCCO.

CRAX ALECTOR. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 735.

CRAX MITU. Linn. Syst. 1. p. 270.

HOCCO MITUPORANGA de la Guijane et

- (918) du Bresil (Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.

   Le Hocco de la Guijane Buff. pl. 86. —

  CRESTED CURASSOW Lath. Syn. v. 4.
  p. 690.
- CRAX GALEATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p.
  624. LE HOCCO à CASQUE de Cu-
- (645) rassow (Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. GALEATED CURASSOW Lath. Supp. to Syn. v. 1. p. 206. No. 7.

CRAX

- CRAX RUBRA. (Mas) Temm. Gall. Gmel. p. 736. Crax Alector (Femina) Lath.
- (336) Ind. Orn. v. 2. p. 623. LE HOCCO
  COXILITLI (Male) du Perou Temm. Gall.
  v. 1. pl. Enl. Le Hocco du Perou
  Buff. pl. 125. (Il suppose que c'est une varieté) CRESTED CURASSOW
  Lath. Syn. v. 4. p. 693.
- CRAX GLOBICERA. Gmel. Syst. 1. p. 736. ——
  LE HOCCO TEUCHOLI de Surinam
- (919) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le Hocco de Curassow Briss. Orn. v. 1. p. 300. GLOBOSE CURASSOW Lath. Syn. v. 4. p. 605. Edw. t. 295.
- CRAX PAUXI. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 737.

  LE HOCCO à PIERRE, OU LE PAUXI
- (6.6) de Surinam (Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le pierre de Caijenne Euff. pl. 78. CUSHIEW CURASSOW Lath. Syn. v. 4. p. 696. Edwards t. 295.

# GENUS PENELOPE. GENRE PENELÔPE.

Penelope Yacou. (Mas et Femina) Temminck

Gall. —— Penelope Cristata Lath. Ind.

(679) Orn. v. 2. p. 619. (Mas) — LE PENEL OPE YACOU du Bresil (Male et Femelle)
Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. — Le Dindon du Bresil Briss. Orn. v. 1. p. 162. (le
Male) — l'Yacou Buff. v. 2. p. 337. (le
K 4 Male)

- Male) GUAN, OR QUAN Edw. 1.
  13. Lath. Syn. v. 4. p. 680.
- PENELOPE MARAIL. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 620. — Gmel. Syst. 1. p. 734. — LE PENEL OPE MARAIL de la Guijane
- (1072) (Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le Faisan verdatre de Caijenne Buff. pl. 338. (la Femelle) MARAIL TURKEY Lath. Syn. v. 4. p. 682.
- PENELOPE CUMANENSIS. (Mas) Gmel. Syst. 1.

  p. 734. No. 3. —— LE PENELOPE

  NOIR à HUPPE ELANCHE, OU LE ZA-
- (648) ZIN de l'Orenoque (Male) Temm. Gall. v.

  1. pl. Enl. CUMANA CURASSOW

  Lath. Supp. to Syn. v. 1. p. 205. N° 5. —

  Yacou Lath. Syn. v. 4. p. 681. t. 61.
- PENELOPE MEXICANA. Temm. Gall. Phafianus Cristatus Gmel. Syst. 1. p. 741. —
- (356) LE PENELÔPE HOATZIN du Mexique Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le Faisan huppé de Caijenne Buff. pl. 337. Crested Phesant Lath. Syn. v. 4. p. 720. t. 64.
- PENELOPE MOTMOT. Temm. Gall. Phasianus Motmot Gmel. Syst. 1. p. 740. —
- (571) LE PENEL OPE KATRACA de la Guijane

  Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. Le Faisan

  de la Guijane, ou le Katraca Buff. pl. 146.

   Motmot Phesant Lath. Syn. v. 4. p. 721.

- TETRAO UROGALLUS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 746. — LE GRAND TÊTRAS
- d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 73. et (747) 74. - Temminck Gall. v. 1. pl. Enl. wood grous Lath. Syn. v. 4. p. 729. ---- Frisch T. 107.
- TETRAO TETRIX. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 748. - LE COQ DE BRUYÊRE
- à QUEUE FORCHUE, OU PETIT TÉ-(748) TRAS d'Europe (Male et Femelle) Buff. 172. et 173. - Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. - BLACK GROUS Lath. Syn. v. 4. p. 733. No. 3. — Frisch T. 109.
- TETRAO UMBELLUS. Gmel. Syst. 1. p. 752.  $N^{\circ}$ : 6.
- TETRAO TOGATUS. Geml. Syst. 1. p. 752.  $N^{\circ}$ . 8.

GRANDE GELINOTTE PANACHÉE du

- (446) Canada Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. - La Grosse Gelinotte du Canada Buff. pl. 101.-- SHOULDER-KNOT GROUS Lath. Syn. v. 4. p. 737.
- TETRAO BONASIA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 753. - LA GELINOTTE d'Euro-
- pe (Male et Femelle) Buff. pl. 474. et 475. (746)Temm. Gall. v. I. pl. Enl. - HA-ZEL GROUS Lath. Syn. v. 4. p. 744. K 5

Te-

- TETRAO LAGOPUS. Gmel. Syst. 1. p. 749.

  LE LAGOPÈDE d'Europe Buff. pl. 129.

  (431) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl. (en habit d'hiver)
  - PTARMIGAN GROUS Lath. Syn.
    v. 4. p. 741.
- TETRAO LAGOPUS. (Varietas) LE LAGO-PÉDE (plumage d'été) Buff. pl. 494. — (444) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.
- TETRAO ALCHATA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 754. LE GANGA, OU GÉLI-
- (921) NOTTE DES PYRENNÉES (Male et Femelle) Buff. pl. 105. et 106. Temm.

  Gall. v. 1. pl. Enl. PINTAILED GROUS Lath. Syn. v. 4. p. 748. Edw. t. 249.
- TETRAO NAMAQUA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 754. LE GANGA à CINTU-
- (262) RON BLANC d'Afrique pays de Namaquois (Male et Femelle) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.

   Gelinotte des Namaquois Sonnini Edit. de Buff. v. 6. p. 80. NAMAQUA GROUS Lath. Syn. v. 4. p. 750. N°. 15.
- TETRAO BICINCTUS. (Mas et Femina) Temm.

  Gall. LA GÉLINOTTE à DOUBLE
- (263) COLLIER, OU LE BIBANDE d'Afrique (Male et Femelle) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.
- TETRAO UNICINCTUS. (Mas) Temm. Gall. —
  LA GÉLINOTTE à COLIER NOIR, OU
- (609) L'UNIBANDE d'Afrique deserts du Zahara (Male) Temm. Gall. v. 1. pl. Enl.

- PERDIX SAXATILIS. Meyer Dautsche Ornith. pl. Enl. — Perdrix Rusa Lath. Ind. Orn. v.
- (649) 2. p. 647. Tetrao Rufus Gmel. Syst. 1.
  p. 756. LA BARTAVELLE, OU
  PERDRIX GRÊQUE d'Europe Buff. pl.
  231. Temm, Gall. v. 2. pl. Enl.
  GREEK PARTRIDGE Lath. Syn. v. 4.
  p. 767.
- PERDIX RUBRA. Briss. Orn. v. 1. p. 236.

  LA PERDRIX ROUGE d'Europe Buff. pl.
- (598) 150. Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. ———
  GUERNSEY PARTRIDGE Lath. Syn.
  v. 4. p. 768. var. A.
- PERDIX BARBARICA. Temm. Gall. Perdix rubra Barbarica Briss. Orn. v. 1. p.
- (653) 239. LA PERDRIX BARBARESQUE Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. Perdrix rouge de Barbarie Buff. Oif. v. 2. Edit.
  folio. BARBARY PARTRIDGE Lath.
  Syn v. 4. p. 770. var. B. Edw. t. 70.
- PERDIX CINEREA (Maset Femina) Lath. Ind. Orn.
  v. 2. p. 645. LA PERDRIX GRISE
- (710) d'Europe (Male et Femelle) Temm. Gall. v.

  2. pl. Enl. Buff. pl. 27. (la Femelle)

   COMMON PARTRIDGE Lath. Syn.
  v. 4. p. 762. Frisch T. 114.
- PERDIX MONTANA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 646.

- 646. Tetrao Moutanus Gmel. Syst.
- (745) 1. p. 758. LA PERDRIX DE MONTAGNE d'Europe Buff. pl. 136. Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. MOUNTAIN PARTRIDGE Lath. Syn. v. 4. p. 765. Frisch T. 114.
- PERDIX CINEREA. (alla) Brisf. Orn. v. 1. p. 223. var. A. LA PERDRIX GRISE-
- (744) BLANCHE d'Europe (Male) Buff. p. 426.

  Edit. folio Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

   Frisch T. 115. Lath. Syn. v.
  4- p- 763. var. A.
- PERDIX DAMASCENA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 646. LA PETITE PERDRIX DE
- (106)) PASSAGE d'Europe Temm. Gall. v. 2. pl.

  Enl. La petite Perdrix grife Buff. Oif.
  v. 2. DAMASCUS PARTRIDGE
  Lath. Syn. v. 4. p. 764.
- PERDIX CORONATA. (Mas et Femina) Lath. Supp.

  Ind. Orn. v. 2. p. LXII. Columba
  Cristata Gmel. p. 774. (Mas) Tetrao viridis Gmel. p. 761. (Femina) LA PERDRIX à HUPPE DE CRAIN, OU LE
  ROULOUL des lles de l'Archipel Indien (Ma-
- (442) le et Femelle) Sonnerat voy. Ind. v.
  2. pl. 100. p. 174. (le Male) Temm.

  Gall. v. 2. pl. Enl. Lesser Crowned

  Pigeon Lath. v. 4. p. 622. (Mas) —

  Green Partridge Lath. v. 4. p. 777. (Femina)

PER-

PERDIX MACRORHYNCHA. Temm. Gall. — LA

PERDRIX GROS-BEC d'Amerique Temm.

(264) Gall. v. 2. pl. Eml.

PERDIX FASCIATA. Temm. Gall. — LA PERDIX BANDÉE d'Isle de France (Male)

(783) Tmm. Gall. v. 2. pl. Enl.

PERDIX GYMNOPHTHALMOS. Temm. Gall.—

LA PERDRIX JOUE NUE de Ternate

(251) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

PERDIX TORQUATA. (Mas) Temm. Gall. ——
LA PERDRIX HAUSSE-COL des Iles de
(1013) l'Archipel Indien (Male) Temm. Gall. v. 2.
pl. Enl.

PERDIX AURITA. Temm. Gall. — LA PERDRIX OREILLARDE d'Afrique Côte du (1036) Sénégal Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

### DIVISION FRANCOLIN.

Perdix Francolinus. (Mas et Femina) Lath.

Ind. Orn. v. 2. p. 644. — Tetrao Franco-

(247) linus Gmel. Syst. 1. p. 756. — LE FRAN-COLIN d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 147 et 148. — Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — FRANCOLIN PARTRIDGE Lath. Syn. v. 4. p. 759.

PERDIX NUDICOLLIS. (Mas et Femina) Lath.

Ind. Orn. v. 2. p. 644. — Tetrao Nudi
(258) collis Gmel. p. 759. — LE FRANCOLIN

GORGE-NUE d'Afrique (Male et Femelle)

Temm.

Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — Buff. pl. 180. (le Male) — BARE - NECKED PARTRIDGE Lath. Syn. v. 4. p. 759.

PERDIX CEYLONENSIS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 644. — Tetrao Ceylonensis Gmel.

- (260) p. 759. LE FRANCOLIN HABAN-KUKELLA de Ceylan (Male) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — CEYLON PARTRID-GB Lath. Syn. v. 4. p. 758.
- PERDIX PERLATA. Temm. Gall. Lath. Ind. v. 2. p. 648. — Tetrao Madagascariensis Gmel. p. 756. — Tetrao Perlatus Gmel. Syst. 1. p. 758. — LE FRANCOLIN
- (447) PERLÉ, OU LE TCHE·COU de la Chine Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. Perdrix Perlée Buff. p. 452. v. 2. Edit. folio Francolin d'Isle de France Sonnerat voy. v. 2. p. 166. pl. 97. PEARLED PARTRIDGE Lath. Syn. v. 2. p. 761. Pintado Partridge Lath. Syn. v. 4. p. 772.
- PERDIX LONGIROSTRIS (Mas) Temm. Gall. —
  LE FRANCOLIN LONG-BEC de Sumatra
  (445) (Male) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

### DIVISION CAILLE.

PERDIX CRISTATA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 652.

Tetrao Cristatus Gmel. Syst. 1. p. 765.

(655) — LA CAILLE HUPPÉE, OU LE ZE-NECOLIN du Mexique Buff. pl. 126. —

Temm.

Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. —— CRESTED QUAIL Lath. Syn. v. 4. p. 784.

PERDIX COTURNIX. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 651. — Tetrao Coturnix Gmel. p. 7652

- (749) LA CAILLE VULGAIRE d'Europe

  Buff. pl. 170. Temm. Gall. v. 2. pl.

  Enl. COMMON QUAIL Lath. Syn.
  v. 4. 779. Frisch t. 117.
- PERDIX MEXICANA. Lath. Ind. Orn. v. 2.

  Tetrao Mexicanus Gmel. p. 762. LE
- (654) COLENICUI de Louisiane Buff. pl. 149. —
  Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. LOUISIANA QUAIL Lath. Syn. v. 4. p. 785. —
  Frisch T. 113.
- PERDIX AUSTRALIS. Lath. Ind. Orn. Supp. p. LXII. LA CAILLE BLANCHE-RAI
- (681) des Iles de l'Ocean Austral Temm. Gall. v. 2.
  pl. Enl. NEW HOLLAND QUAIL
  Lath. Supp. Syn. v. 2. p. 283.
- Perdix Chinensis. (Mas et Femina) Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 652. (Mas) Tetrao Chi-
- (975) nensis Gmel. p. 765. LA FRAISE, OU PETITE CAILLE de la Chine (Male et Femelle) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. Buff. pl. 126. f. 2. (le Male) Edwards t. 247. (Male) CHINESE QUAIL Lath. Syn. v. 4. p. 783.

# f. . . pedibus tridactylis. . . . à trois doigts.

# DIVISION TURNIX.

PERDIX TUTURNIX. Temm. Gall. — LE TU-TURNIX du Cap de Bonne Esperance —— (265) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

PERDIX GUTTURATA. (Mas) Temm. Gall. —

LE TURNIX à GORGE NOIRE des lles

(391) de l'Ocean Indien (Male) Temm. Gall. v. 2.

pl. Enl.

PERDIX MACULATA. Temm. Gall. — LE TUR-NI-ROUX des Deserts du Zahara (Male) (625) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl.

#### GENUS TINAMUS.

F ....

#### GENRE TINAMOU.

- TINAMUS BRASILIENSIS. Lath. Ind. Orn. v. 2.
  p. 633. Tetrao Major Gmel. Syst. 1.
  p. 767. LE GRAND TINAMOU, OU
- (261) LE MAGOUA du Bresil Buff. pl. 476. —
  Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. GREAT
  TINAMOU Lath. Syn. v. 4. p. 724.
- TINAMUS Soul. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 634. —
  Tetrao Soul Gmel. Syst. 1. p. 768. ——
- (41) LE TINAMOU SOUI de la Guijane Buff. pl.
  829. Temm. Gall. v. 2. pl. LITLE
  TINAMOU Lath. Syn. v. 4. p. 727.

# GENUS PSOPHIA.

#### GENRE AGAMI.

Prophia Crepitans. Gmel. Syst. 1. p. 720. — L'AGAMI à POITRINE DORÉE d'Ame-

rique (Male) Buff. pl. 169. — Temm. Gall.
v. 2. pl. Enl. — Le Caracara des Antilles
Buff. Oif. v. 2. — GOLD BREASTED
TRUMPETTER Lath. Syn. v. 4. p. 793.
z. 68.

#### GENUS OTIS.

## GENRE OUTARDE.

- OTIS TARDA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p.722.

  Frisch T. 106. L'OUTARDE d'Europe
  (Male et Femelle) Buff. pl. 245. (le Male) —
- (691) Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. GREAT BUSTARD Lath. Syn. v. 4. p. 796. — Edwards t. 79 et 80.
- OTIS TETRAX. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 723. LA PETITE OUTARDE,
- (692) OU CANNEPITIERE d'Europe (Male et Femelle) Ruff. pl. 25 et 10. Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. LITTLE BUSTARD Lath. Syn. v. 4. p. 799. Edwards t. 251.
- OTIS AFRA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 724. LA CANNEPETIERE à OREIL-
- (224) LES BLANCHES, OU LE CORHAN d'Afrique (Male et Femelle) Temm. Gall. v.
  2. pl. Enl. WHITE EARED BUSL TARB

TARD Lath. Syn. n. 4. p. 802. — Le-Korhaan Kolbe voy. en Afrique v. 2. p. 139.

OTIS HOUBARA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 725.

L'OUTARDE à FRAISE, OU LE

(576) HOUBARA d'Afrique deserts du Zahara (Male) Buff. pag. 133. v. 2. Edit. folio — Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — RUFFED

BUSTARD Lath. Syn. v. 4. 805.

Otis Coerulescens. Temm. Gall. — LA CAN-NEPETIÈRE BLEUATRE, OU L'AR-

(225) DOISÉE d'Afrique pays des Caffres Temm.

Gall. v. 2. pl. Enl. — Sonnini Edition de Buffon v. 5. p. 100.

#### GENUS CASUARIUS.

GENRE CASOAR.

CASUARIUS EMEU. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 664. — Struthio Casuarius Gmel. Syst. 1.

(333) p. 726. — LE CASOAR, OU EMEU des Indes Orientales Buff. pl. 313. — Temm. Gall. v. 2. — GALEATED CASSOWARY Lath. Syn. v. 5. p. 10. pl. 72. — Frisch T. 105.

CASUARIUS NOVÆ HOLLANDIÆ. (Mas) Lath.
Ind. Orn. v. 2. p. 665. — LE GRAND

(559) CASOAR de la nouvelle Hollande (Male)
Sonnini Edition de Buffon v. 4. p. 333. —
Temm. Gall. v. 2. pl. Enl. — NEW HOLLAND CASSOWARY Lath. Supp. to Syn.
v. 2. p. 290. — White's Fourn. p. 129.
AVES

# AVES AQUATICÆ. OISEAUX D'EAU.

#### GENUS PLATALEA.

# GENRE SPATULE:

- Orn. v. 2. p. 667. Gmel. p. 613. —
- (826) LA SPATULE BLANCHE d'Europe (Malle) Buff. pl. 405. WHITE SPOONBILL Lath. Syn. v. 5. p. 13.
- PLATALEA AJAJA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2.p. 668. Gmel. p. 614. LA SPA-
- (516) TULE COULEUR DE ROSE de l'Amerique Septentrionale (Male) Buff. pl. 165. ROSEATED SPOONBILL Lath. Syn. v. 5. p. 16.

#### GENUS PALAMEDEA. GENRE KAMICHY.

- PALAMEDEA CORNUTA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 669. Gmel. p. 615. LE KA
- (501) MICHY CORNU d'Amerique, Rivière Orenôque Buff. pl. 451. — HORNEDSCRE-AMER Lath. Syn v. 5. p. 18.

# GENUS MYCTERIA. GENRE JABIRU.

- Orn. v. 2. p. 670. Gmel. p. 616. LE
- pl. 817. Le Guacu Buff. Oiseaux —

  L 2

AMERICAN JABIRU Lath. Syn. v. 5. p. 22.

# GENUS CANCROMA. GENRE SAVACOU.

CANCROMA COCHLEARIA. (Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 671. — Gmel. p. 617. — LE

(199) SAVACOU HUPPÉ de la Guijane (Femelle) Buff. pl. 38. (une Femelle) —— CRESTED BOAT-BILL Lath. Syn. v. 5. p. 26. t. 76.

#### GENUS SCOPUS.

#### GENRE OMBRETTE.

Scopus Umbretta. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 672. — Gmel. p. 618. — L'ombrette

(200) HUPPÉE d'Afrique (Male) Buff. pl. 796. (la Femelle) — TUFTEB UMBRE Lath. Syn. v. 5. p. 30. t. 77.

# GENUS ARDEA.

#### GENRE HERON.

ARDEA PAVONIA. (Mas et Femina) Gmel. Syst.
1. p. 619. — L'OISEAU ROYAL d'Afri-

(186) que (Male et Femelle) Buff. pl. 265. (le Male) —— CROWNED AFRICAN CRANE
Edw. t. 192. — Lath. Syn. v. 5. p. 34.

ARDEA VIRGO. Gmel. Syst. 1. p. 619. — LA DEMOISELLE DE NUMIDIE Buff. pl.

(732) 241. — NUMIDIAN CRANE Lath. Syn. 7. 5. p. 35. —— Edw. 1. 134.

AR-

- ARDEA ANTIGONE. Gmel. Syst. 1. p. 622. —.
  LA GRANDE GRUE GRISE DES INDES
- (185) ORIENTALES Briss. Orn. v. 5. p. 378. —
  GREATER INDIAN CRANE Lath. Syn.
  v. 5. p. 38. Edwards t. 45.
- ARDEA CARONCULATA (Mas) Gmel. Syst. 1.
  p. 643. LA GRANDE GRUE à PEN-
- (184) DELOQUES d'Afrique Côte de Guiné (Male)

  Le Heron à caroncules Sonnini v. 21.

  p. 178. WATTLED HERON Lath.
  Syn. v. 5. p. 82. pl. 78.
- ARDEA LEUCOCEPHALA. Gmel. Syst. 1. p. 642. LA CIGOGNE VIOLETTE
- (575) de la Côte de Coromandel Le Heron violet de Coromandel Buff. pl. 906. VIOLET HERON Lath. Syn. v. 5. p. 97.
- ARDEA CIONIA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 622. —
  LA CIGOGNE NOIRE ET BLANCHE
- (574) d'Europe (Male) Buff. pl. 866. WHITE STORK Lath. Syn.v. 5. p. 47.
- ARDEA CAYANENSIS. Gmel. Syst. 1. 626. ——
  LE BIHOREAU BLEUATRE de Caijenne
- (400) Buff. pl. 899. CAYENNE NIGHT HERON Lath. Syn. v. 5. p. 56.
- ARDEA STELLARIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 635.

  LE CRAND BUTOR d'Europe (Male)
- (198) Buff. pl. 789. —— COMMON BITTERN Lath. Syn. v. 5. p. 56.
- ARDEA MAJOR. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 627. LE HERON HUPPÉ d'Europe (Male) Buff. pl.

L 3

755•

- (824) 755. CRESTED HERON Lath. Syn. v. 5. p. 83.
- ARDEA PURPUREA. Gmel. Syst. 1. p. 626. \_\_\_\_\_\_
  LE HERON POURPRÉ d'Europe Buff. pl.
- (614) 788. CRESTED PURPLE HERON Lath. Syn. v. 5. p. 95.
- ARDEA EGRETHA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 629.

  LA GRANDE AIGRETTE d'Amerique
- (377) (Male) Buff. pl. 925. GREAT EGRET Lath. Syn. v. 5. p. 89.
- ARDEA GRAZETTA Ginel. Syst. 1. p. 628. LA PETITE AIGRETTE d'Amerique Buff.
- (419) pl. 901. LITTLE EGRET Lath, Syn. v. 5. p. 95.
- ARDEA AGAMI. (Mas et Femina) Gmel. Syst 1. p. 629. LE HERON AGAMI de Caijen-
- (143) ne (Male et Femelle) Buff. pl. 859 (le Male)

  —— AGAMI HERON Lath. Syn. v. 5.
  p. 97.
- ARDEA NOVE HOLLANDIE. (Mas) Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 701. LE PETIT HERON à
- (64) FACE-BLANCHE de la nouvelle Hollande (Male) Heron de Nouv. Holl. Sonnini v. 21. p. 181. WHITE FRONTED HERON Phill. roy. Bot. Bay. p. 163.
- ARDEA GRUS. Gmel. Syst. 1. p. 620. LA GRUE VULGAIRE d'Europe Buff. pl. 769. ——
- (825) COMMON CRANE Lath. Syn. v. 5. p. 40.
- ARDEA NYCTICORAX. (Mas et Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 624. LE BIHOREAU d'Eu-

- (354) rope (Male et Femelle) Beff. 758 et 759. NIGHT HERON Lath. Syn. v. 5. p. 52. ARDEA SOLONIENSIS. (Mas et Femina) Gmel. Syst. I. p. 637. - LE PETIT BUTOR ROUX d'Amerique (Male et Femelle) Buff, (359) p. 252. Edit. folio. - RUFFOUS BIT-TERN Lath. Syn. v. 5. p. 60. ARDEA VIRESCENS. Gmel. Syst. 1. p. 635. - LE CRABIER GRIS à TÊTE ET QUEUE VERTE de la Guijane Buff. pl. 908. ---(193) GREEN HERON Lath. Syn. v. 5. p. 68. ARDEA LUDOVICIANA. Gmel. Syst. 1. p. 630. - LE CRABIER ROUX à TÊTE ET QUEUE VERTE de Louisiane Buff. pl. 909. (369) - LOUISIANE HERON Lath. Syn. v. 5. p. 81. ARDEA CALEDONIA. (Mas) Gmel. Syst. I. p. 626. - LE BIHOREAU CANELLE de la nouvelle Caledonie (Male) - CALE-(357) DONIAN NIGHT HERON Lath. Syn. v. 5. p. 55. - Cook's voy. v. 3. part. 24 £. 50. LE PETIT BLONIQUE MANTEAU NOIR de Caijenne (Male) ----(763\*) non decrit Espèce nouvelle, ARDEA MINUTA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 646. —
- v. 5. p. 65.

  ARDEA TIGRINA. Gmel. Syst. 1. p. 638.

  L 4 L'ONO-

(1018) 323. — LITTLE BITTERN Lath. Syn;

LE BLONJOIS d'Europe (Male) Buff. pl.

(988) pl. 790. — TIGER BITTERN Lath. Syn. v. 5. p. 63.

(993\*) de la nouvelle Hollande — non decrit.

TACHETÉ du Bengale (Male et Femelle)

(352\*) — non decrit.

ARDEA SCOLOPACEA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 701. — Gmel. p. 647. — LE COURLAN,

(1037) OU COURLIRI d'Amerique Buff. pl. 848. SCOLOPACAEOUS HERON Lath. Syn. v. 5. p. 102.

ARDEA COMATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 687. — Gmel. p. 632. — LE SGUACCO,

(192) OU LE CRABIER HUPPÉ d'Europe Buff.

Oif. —— Crabier huppé de Mahon Buff.

pl. 348. —— squacco heron Lath.

Syn. v. 5. p. 74.

#### GENUS TANTALUS.

GENRE IBIS.

TANTALUS RUBER. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2.

p. 703. — Gmel. p. 651. — L'IBIS

(194) ECARLATE du Bréfil (Male) — le Courlis rouge Buff. pl. 81. — SCARLATE

IBIS Lath. Syn. v. 5. p. 106.

TANTALUS ALBICOLLIS. Lath. Ind. Orn. v. 2.

p. 704. — Gmel. Syst. 1. p. 653. —

(770) LE GRAND IBIS À COU BLANC de Caijen-

- jenne Courlis à Cou blanc Buff. pl. 976. WHITE-NECKED IBIS Lath. Syn. v. 5. p. 109.
- TANTALUS CALVUS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 709. — Gmel. Syst. 1. p. 649. —
- Le Courlis à tête nue Buff. pl. 867. ——
  BALD IBIS Lath. Syn. v. 5. p. 116.
- TANTALUS FALCINELLUS. (Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 707. Gmel. Syst. 1. p. 648.
- (922) L'IBIS BRUN VERD d'Italie (Femelle) Le Courlis verd Buff. pl. 819. BAY IBIS Lath. Ind. Syn. v. 5. p. 113.

LES CUIVRÉES d'Afrique pays Autoniquoi.

(191\*) — non decrit Espèce nouvelle.

### GENUS NUMENIUS.

GENRE COURLIS.

- NUMENIUS ARQUATA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 710. Scolopax Arquata Gmel. Syst. 1. p.
- (733) 655. LE GRAND COURLIS d'Europe Buff. pl. 818. COMMON CURLEW Lath. Syn. v. 5. p. 119.
- NUMENIUS GUARAUNA Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 712. Scolopax Guarauna Gmel. Syst. 1. p.
- (195) 654, LE GOUARONA, OU LE COUR-LIS MARON du Bréfil Buff. v. 8. p. 390. BRASILIAN WHIMBREL Lath. Syn. v. 5. p. 125.

- NUMENIUS PHEOPUS. Lath. Ind. v. 2. p. 711. -Scolopax Phoeopus Gmel. Syst. 1. p. 657. — LB PETIT COURLIS, OU LE CORLIEU (762)d'Europe Buff. pl. 842. — WHIMBREL Lath. Syn. v. 5. p. 123. - TRÊS PETIT COURLIS, OU LE COCORLIS du Sénégal - nan (923\*) decrit. GENUS SCOLOPAX. GENRE BECASSE. SCOLOPAX RUSTICOLA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 713. — Gmel. p. 660. — LA BECASSE d'Europe Buff. pl. 885. — wooncock (827)Lath. v. 5. p. 129. - Frisch T. 226. SCOLOPAX GALLINAGO. Lath. Ind. v. 2. p. 715. - Gmel. p. 662. - LA BECASSINE (828) d'Europe Buff. pl. 883. — SNIPE, on SNITE Lath. Syn. v. 5.p. 134. - Frisch T. 229. SCOLOPAX GALLINULA. Lath. Ind. v. 2. p. 715. - Gmel Syst. 1. p. 662. - LA PETITE BECASSINE d'Europe Buff. pl. 884. (829)JACK-SNIPE Lath. Syn. v. 5. p. 136. — - Frisch T. 231. SCOLOPAX LIMOSA. Lath. Ind. v. 2. 719. Gmel. p. 666. - LA GRANDE BARGE

(615)

d'Europe Buff. pl. 874. — JADREKA

Gmel. p. 664. — LE CHEVALIER

(668) AUX PIEDS ROUGES, OU LA GAMBETTE d'Europe Buff. pl. 845. — REDSHNAKE Lath. Syn. v. 5. p. 150. — Frisch
T. 240. — Albin. v. 3. pl. Enl.

SCOLOPAX MAJOR. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p.
714. — Gmel. p. 661. — LA GRANDE BE(1024) CASSINE de Sibèrie (Male) — Frisch T.
228. — GREAT SNIPE Lath. Syn. v. 5.
p. 133.

#### GENUS TRINGA.

#### GENRE BECASSEAU.

TRINGA PUGNAX. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn.

p. 725. — Gmel. p. 669. — Tringa Grenovi
(830) censis Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 731. (Femina)

—— LE CONBATTANT, OU PAON DE

MER d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl.

305 et 306. — Frisch. T. 232 et 235.

Tringa Arenaria. Gmel. Syst. 1. p. 680. — LA MAUBÈCHE SANDERLING d'Europe

--- RUFF Lath, Syn. v. 5. p. 139.

(924) Buff. v. 8. p. 338. Edit. folio — SAN-DERLING Lath. Syn. v. 5. p. 197.

TRNGA HYPOLEUCOS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 734. — Gmel. p. 678. — LE GUIGNETTE,

TRINGA ALPINA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 736. — Gmel.

(819) LE CINCLE d'Europe Buff. pl. 852.

DUNLIN Lath. Syn. v. 5. p. 185.

Frisch T. 241.

(239\*) NE ROUSSE de la Guijane — non decrit.

# DIVISION VANNEAU.

	THE PERSON AND A COUNTY OF
	BLANCHE, OU VANNEAU ECHASSIER
	d'Egypte — non decrit.
TRING	A VANELLUS. Gmel. Syst. 1. p. 670
	LE VANNEAU d'Europe (Male) Buff. pl.
(677)	242. — LAPWING Lath. Syn. v. 5. p. 161. — Frisch T. 213.
TRING	A CAYANENSIS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 727. — Para Cayanensis Gmel. Syst.
(7 <sup>6</sup> 5)	1. p. 706. — LE GRAND VANNEAU ARMÉ de Caljenne (Male) Buff. pl. 836. —
	CAYENNE SANDPIPER Lath. Syn. v.
	5. p. 164.
	LE GRAND VANNEAU
	ARMÉ à LAMBEAUX ROUGES de Terna-
(249*)	te — non décrit Espèce nouvelle.
	LE VANNEAU NAIN
(979*)	de la nouvelle Galle Meridionale non

décrit Espèce nouvelle.
TRINGA HELVETICA. Gmel. Syst. 1. p. 676.

- LE VANNEAU SUISSE d'Europe (925) Buff. pl. 853. — SWISS SANDPIPER Lath. Syn. v. 5. p. 167.

#### GENUS CHARADRIUS. GENRE PLUVIER.

- CHARADRIUS CORONATUS. Gmel. Syst. 1. p. 691. — LE PLUVIER COURONNÉ
- d'Afrique Cap de B. E. Buff. pl. 800. (227) WHREATED PLOVER Lath. Syn. v. 5. p. 216.
- CHARADRIUS LEUCOGASTER. Gmel. Syst. 1. p. 687. — LE PLUVIER à VENTRE
- (226) ET FRONT-BLANC d'Afrique pays Auteniquoi --- WHITE-BELLIED PLO-VER Lath. Syn. v. 5. p. 212.
- CHARADRIUS HYATICULA. Gmel. Syst. 1. p. 683. - LE PETIT PLUVIER à COL-
- (1030) LIER d'Europe Buff. pl. 921. RINGED PLOVER Lath. Syn. v. 5. p. 201. ---Frisch T. 214.
- LE PETIT VIER à POITRINE ROUSSE d'Afrique (230\*) pays des Namaquois — non décrit.
- LE PETIT PLU-VIER à DOUBLE COLLIER d'Afrique (229\*) pays Auteniquoi — non decrit.
- CHARADRIUS PLUVIALIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 688. — LE PLUVIER DORÉ d'Europe (926) (Malc) Buff. pl. 904. — GOLDEN, OR

GREEN PLOVER Lath. Syn. v. 5. p. 193.

Frisch T. 217.

CHARADRIUS HYMANTOPUS. Gmel. Syst. 1.

p. 690. — LE PLUVIER ECHASSE
(927) d'Europe Buff. pl. 878. — LONG-LEG-

GED PLOVER Lath. Syn. v. 5. p. 195.

CHARADRIUS MORINELLUS. (Mas) Gmel.

Syst. 1. p. 686. — LE PETIT PLU-

- (928) VIER, OU LE GUIGNARD d'Europe (Male) Buff. pl. 832. DOTTEREL Lath. Syn. v. 5. p. 208.
- CHARADRIUS SPINOSUS . Gmel. Syst. 1. p. 690.

   LE PLUVIER ARMÉ à PLASTRON
- (593) NOIR d'Afrique Buff. pl. 801. BLACK-BREASTED INDIAN PLOVER Edw. s. 47.
- CHARADRIUS CAYANUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 749. No. 25. LE PLUVIER
- (766) ARMÉ à COLLIER NOIR de Caijenne Buff. pl. 833. SPUR-WINGED PLO-VER Lath. Syn. v. 5. p. 215.
- CHARADRIUS BILOBUS. Gmel. Syst. 1. p. 691. LE PLUVIER à LAMBEAUX
- (578) de la Côte de Malabar Buff. pl. 880. ——
  WATTLED PLOVER Lath. Syn. v. 5.
  p. 216.
- CHARADRIUS PLUVIALIS. (Varius) Mihi ——
  Charadrius Apricarius Gmel.p. 687. Lath.
- (1022) Ind. Orn. v. 2. p. 742. LE PLUVIER DO-RÉ à GORGE NOIRE Buff. Oif. — SPOT-

TED PLOVER Edw. t. 140. - AL WAR-GRIM PLOVER Lath. Syn. v. 5. p. 198.

- CHARADRIUS ALEXANDRINUS. Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 744. Gmel. p. 683. LE
- (942) PLUVIER à COLLIER d'Egipte (Il se trouve aussi en Europe) Buff. pl. 920. ——
  ALEXANDRINE PLOVER Lath. Syn. v. 5.
  p. 203.
- CHARADRIUS CURONICUS. (Mas) Lath. Ind.
  Orn. v. 2. p. 750. Gmel. p. 692. LE
  (675) PLUVIER DE LA CURONIE (Male)
- GENUS CURSORIUS. GENRE COURE-VITE.
- CURSORIUS AFRICANUS. (Mas) Mihi. LE COURE-VITE à DOUBLE COLLIER (228\*) d'Afrique pays des Namaquois (Male) non décrit Espèce nouvelle.
- GENUS HÆMATOPUS. GENRE HUITERIER.
- HEMATOPUS OSTRALEGUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 752. — Gmel. Syst. 1. p. 694. ——
- (676) L'HUITERIER d'Europe Buff. pl. 929. —
  SEAPIE, PIED OISTER-CATCHER
  Lath. Syn. v. 5. p. 219.
- GENUS GLAREOLA. GENRE GLAREOLE.
- GLAREOLA AUSTRIACA. Lath. Ind. Orn. v. 1.
  p. 753. Hirundo Patrincola Gmel. Syst. 1.
  p. 695.

p. 695. — LA PERDRIK DE MER

(231) d'Europe Buff. pl. 882. — AUSTRIAN

PATRINCOLE Lath. Syn. v. 5. p. 222.

t. 85.

# GENUS CINCLUS. GENRE MERLE D'EAU.

CINCLUS AQUATICUS. (Mas et Femina) Bechfein Orn. Tasch. — Turdus Cinclus Lath.

(995) Ind. Orn. v. 1. p. 343. — LE MERLE D'E AU d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 940. (le Male) — WATER OUZEL Lath. Syn. v. 3. p. 48.

#### GENUS RALLUS.

# GENRE RALE.

RALLUS TORQUATUS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 714. No. 6. — LE TIKLIN à COL-

(764) LIER, OU RALE à CINTURON ROUX des Philippines (Male) Buff. p. 73 v. 9. Edis. folio — BANDED RAIL Lath. Syn. v. 5. p. 233. No. 5.

RALLUS HELIAS. Mihi — Ardea Helias Gmel.

Syst. 1. p. 640. — LE CURALE, OU

(421) PETIT PAON DES ROSES de Caijenne (Male) Buff. pl. 782. —— CURALE SNIPE Lath. Syn. v. 5. 156.

RALLUS CREX. Gmel. Syst. 1. p. 711. — LE RALE DE GENET, OU LE ROI DES

(812) CAILLES d'Europe Buff. pl. 750. — CRA-KE GALLINULE Lath. Syn. v. 5. p. 250. RALLUS PUSILLUS. (Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 761. — Gmel. Syst. 1. p. 719. — (1045) Pallas Reife v. 3. p. 700. - LE TRES PETIT RALE à BEC ET PIEDS VERDS de la Daourie (Femelle) - LE RALE D'EAU À GORGE BLANCHE d'Afrique Cap de Bonne Espe-(246\*) rance - non decrit. RALLUS AQUATICUS. Gmel. Syst. 1. p. 712. ---LE RALE D'EAU d'Europe Buff. pl. 749. (1012) — THE WATER-RAIL Lath. Syn. v. 5. p. 227. LE RALE D'EAU FAU. (772\*) VE de St. Domingue --- non décrit. GENRE JACANA. GENUS PARRA. PARRA AFRICANA. Gmel. Syst. 1. p. 709. -LE JACANA À GORGE BLANCHE de (243) Mosambique. — Le Jacana Canelle Sonnini Edit. de Buff. v. 23. p. 222. - AFRICAN IACANA Lath. Syn. v. 5. p. 246. PARRA JACANA. Gmel. Syst. 1. p. 707. - LE JACANA du Bresil et du Mexique Buff. pl. 322. — CHESNUT JACANA Lath. Syn. (244) v. 5. p. 241. — Edw. t. 357. \_\_\_\_ LE GRAND JACANA VERD à CRÈTE, OU LE JACANA BRILLANT

(403\*) de Ceylan - non décrit Espèce nouvelle.

# GENUS GALLINULA. GENRE POULE D'EAU.

- GALLINULA CAYANENSIS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 767. — Fulica Caijanensis Gmel.
- (242) Syst. I. p. 700. LA GRANDE POULE
  D'EAU ROUSSE de Caijenne Buff. pl. 352.

   CAYENNE GALLINULE Lath. Syn.
  v. 5. p. 252.
- GALLINULA PORPHIRIO. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 768. — Fulica Porphirio Gmel. Syst.
- (627) 1. p. 699. TALÉVE, OU LE PORPHI-RION de Madagascar (Male) Buff. pl. 810. —— PURPLE GALLINULE Lath. Syn. 7. 5. p. 254:
- GALLINULA MARTINICA. Lath. Ind. Orn. v.
  2. p. 769. Fulica Martinica Gmel. Syst.
- (241) I. p. 700. LA PETITE POULE SUL.

  TANE de Caijenne Buff. v. 9. p. 111. Edit.
  folio. MARTINICO GALLINULE
  Lath. Syn. v. 5. p. 255. pl. 83.
- GALLINULA CHLOROPUS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 770. — Fulica Chloropus Gmel. Syst.
- (811) 1. p. 698. LA POULE D'EAU d'Europe (Male) Buff. pl. 877. COMMON GALLINULE Lath. Syn. v. 5. p. 258.
- GALLINULA CHLOROPUS Africana. LA
  POULE D'EAU à PLAQUE ROUGE d'A.
- (767) frique. (Varièté de la poule d'Eau d'Europe.)

LA TRÊS PETITE

- (768\*) LA NOIRETTE d'Afrique Côte d'Angôle non décrit.
- GALLINULA PHŒNICURA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 770. — Fulica Phœnicura Gmel,
- (390) Syst. 1. p. 715: LA POULE D'EAU à VENTRE BLANC, OU LE KARUKA des Iles de l'Ocean Indien Sonnini Edit. de Buff. v. 23. p. 262. RED-TAILE B GALLINULE Lath. Syn. v. 5. p. 259.

TE PIQUETÉ d'Afrique pays Auteniquoi

- (248\*) (Male et Femelle) non décrit Espèce nuovelle.
- GALLINULA PORZANA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 772. — Rallus Porzana Gmel. Syst. 1.
- (1011) p. 712. LE MARQUETTE d'Europe

  Buff. pl. 751. Frisch T. 211. —

  SPOTTED GALLINULE Lash. Syn. v. 5.
  p. 264.

# GENUS PHALAROPUS. GENRE PHALAROPE.

PHALAR OPUS HYPERBOREUS. (Mas). Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 775. — Tringa Hyper-

(932) borea Gmel. Syst. 1. p. 675. — LEPHALL LAROPE CENDRÉ des mers Australes (Male) Buff. pl. 766. — RED PHALA-ROPE Lath. Syn. v. 5. p. 270.

# GENUS FULICA.

# GENRE FOULQUE.

FULICA ATRA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 777. — Gmel. Syst. 1. p. 702. — LA FOULQUE,

(813) OU MORELLE d'Europe Buff. pl. 197. — COMMON COOT Lath. Syn. v. 5. p. 275. — Frisch T. 208.

## GENUS PODICEPS.

# GENRE GREBE.

- Podiceps Cristatus. (Mas et Femina) Lath.

  Ind. Orn. v. 2. p. 780. Colymbus Cris-
- (831) tatus Gmel. Syst. 1. p. 589. LEGREBE CORNU d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 400. (le Male) CRESTED GREBE Lath. Syn. v. 5. p. 281. Frisch. T. 182.
- Podiceps Surinamensis. Mihi Plotus Surinamensis Gmel. Syst. 1. p. 581. Lath.
  - 237) Ind. Orn. v. 2. p. 896. LEGRÉBE FOULQUE de Caijenne (Male) Buff. pl. 893. Surinam Darter Lath. Syn. v. 6. p. 626.

à COUROUX du Cap de B. E. pays Au(250\*) teniquoi — non décrit.

PODICEPS MINOR. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 784. — Colymbus Minor Gmel. Syst. 1. p.

(982) 591. LE GRÉBE DE RIVIÈRE, OU LE CASTAGNEUX d'Europe Buff. pl.

905. - Frisch T. 184. - LITTLE GRE-BE Lath. Syn. v. 5. p. 289.

GENUS RECURVIROSTRA. GENRE AVO-CETTE.

RECURVIROSTRA AVOCETTA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 693. — Lath. Syn. v. 2. p. 786. - L'AVOCETTE d'Europe (Male) Buff. (820)

pl. 353. - scooping avocet Lath.

Syn. v. 5. p. 293.

GENUS PHOENICOPTERUS. GENRE PHOENI-COPTÈRE.

PHOENICOPTERUS RUBER (Mas) Gmel. Syst 1. p. 612. — Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 788. —

LE GRAND FLAMANT, OU PHOENI-(501)COPTÈRE ROUGE de la Côte de Guiné - RED FLAMINGO Lath. Syn. v. 5. p. 299. pl. 93. — Le Flammant Buff. pl. 63. (un jeun oiseau)

GENUS RHIJNCOPS. GENRE BEC EN CISEAUX.

-RHIJNCHOPS NIGRA. Lath. Ind. Orn.v. 2. p. 802. - Gmel. Syst. 1. p. 611. - LE COUPEUR

D'EAU, OU BEC EN CISEAUX d'Europe (930) Buff. pl. 357. - BLACK SKIMMER Lath. Syn. v. 6. p. 347.

M 3

#### GENUS ALCA.

# GENRE PINGOIN.

- LE MACAREUX du Spitherg (Male) Buff.
- (597) pl. 275. PUFFIN AUK Lath. Syn. v. 5. p. 314. Frisch T. 192.
- LE PINGOIN des mers du Nord (Male) Buffe
- (934) pl. 1003. RAZOR-BILL AUK Lath. Syn. v. 6, p. 319,
- ALCA ALLE. Gmel. Syst. 1. p. 554. LE PE-TIT GUILLEMOT, OU COLOMBE DE
- (935) GROENLANDE Buff. pl. 917. LITTLE AUK Lath. Syn. v. 5. p. 327. Edw. t. 91.

# GENUS URIA,

# GENRE GUILLEMOT.

- URIA TROILE. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 796. ——
  Colymbus Troile Gmel. Syst. 1, p. 585. I.E.
- (936) GUILLE MOT des mers du Nord Buff. pl. 903. FOOLISH GUILLE MOT Lath. Syn. v. 6. p. 329. Frisch T. 185.
- URIA TROILE. (Junior) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 797. B. Colymbus Minor Gmel Syst. 1. p.
- (1039) 585. LE PETIT GUILEMOT À VENTRE ET COU BLANC Le Guillemot Jeun age LESSER GUILLEMOT Lath. Syn. v. 6. p. 3324

#### GENUS COLYMBUS.

#### GENRE PLONGEON.

- COLYMBUS SEPTENTRIONALIS. (Mas) Gmel.

  Syst. 1. p. 586. LE LUMME, ON
- (233) PLONGEON à GORGE ROUGE de Sibèrie (Male) Buff. pl. 308. — RED-THROA-TED DIVER Lath. Syn. v. 6. p. 344.
- COLYMBUS GLACIALIS. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 588. L'IMBRIM, OU GRAND PLON-
- (232) GEON des mers du Nord (Male) Buff. pl.
  952. NORTHEREN DIVER Lath.
  Syn. v. 6. p. 337. Frisch T. 185.
- COLYMBUS STELLATUS. (Mas) Gmel. Syst. 1.

  p. 587. LE PETIT PLONGON, QU
- (728) LE CAT-MARIN d'Europe (Male) Buff. pl. 992. SPECKLED DIVER, OR LOON Lath. Syn. v. 6. p. 341.
- COLYMBUS IMMER. Lath. Ind. Orn v. 2. p. 800.

  Gmel. Syst. 1. p. 588. LE
  GRAND PLONGEON, OU L'IMMER d'Eu-
- (931) rope Buff. pl. 914. IMBER DIVER Lath. v. 6. p. 340.
- COLYMBUS ARCTICUS. Lath. Ind. Orn. v. 2, p. 800. — Gmel. Syst. 1. p. 587. —
- (1038) LE PLONGEON À CORGE NOIRE des regions Arctiques Brief. Orn. v. 6. p. 115.

  Le Lumme, ou petit Plongeon de la mer du Nord Buff. Oif. v. 9. p. 153 et 254. Edit. felio BLACK-THROA-M 4

# GENUS STERNA. GENRE HIRONDELLE DE MER.

STERNA HIRUNDO. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 807. - Gmel. p. 606. - L'HIRONDELLE DE MER PIERRE-GARIN d'Europe Buff. pl. (673) 987. - COMMON TERN Lath. Syn. у. б. р. бзі. STERNA HIRUNDO. (Hornotinus) \_\_\_\_ L'III-RONDELLLE DE MER PIERRE GAR-(1053) RIN (premier Age). STERNA CAYANA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 804. -- Sterna Caijanensis Gmel. p. 60. --LA GRANDE HIRONDELLE DE MER À (235) BEC JAUNE de Caijenne Buff. pl. 988. - CAIJENNE TERN Lath. Syn. v. 6. p. 352. STERNA BOYSII. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 806. Sterna Cantiaca Gmel. Syst. 1. p. 6c6. - LE (1029) CAUGEK, OU L'HIRONDELLE DE MER à BEC ET PIEDS NOIRS d'Europe ---SANDWICH TERN Lath. Syn. v. 6. p. 356. STERNA STOLIDA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 805. - Gmel. p. 605. - LE NODDI, OU HI-(236) RONDELLE DE MER BRUNE de Louifiane — La mouette brune Buff. pl. 997.

€

THE NODDY Lath. Syn. v. 6. p. 354.

5 TERNA FISSIPES. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2.
p. 810. — Gmel. Syst. 1. p. 610. —

(998) L'HIRONDELLE DE MER NOIRE, OU L'EPOUVENTAIL d'Europe (Male) Buff.
pl. 333. — BLACK TERN Lath. Syn.
v. 6. p. 366.

STERNA MINUTA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p.

809. — Gmel. Syst. 1. p. 608. — LA

(674) RETUTE HIRONDELLE DE MER d'Est.

(674) PETITE HIRONDELLE DE MER d'Europe Buff. pl. 996. LESSER TERN Lath. Syn. v. 6. p. 364.

#### GENUS LARUS.

# GENRE GOELAND.

LARUS MARINUS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 813. — Gmel. p. 598. — LE GRAND

(671) GOELAND MANTEAU NOIR d'Europe (Male) Buff. pl. 990. — Frisch T. 218. (un Jeun Oiseau) — BLACK-BACKED GULL Lath. Syn. v. 6. p. 371.

LARUS NAEVIUS. (Mas) Gmel. p. 598. — Larus Naevius var. ij. Lath. Ind. Orn. v. 2. p.

(695) 814. — LE GOELAND GRISARD d'Europe Buff. pl. 266. — WAGEL GULL
Lath. Syn. v. 6. p. 375.

LARUS NAEVIUS. (Albidus) (Varietas)) — LE GOELAND GRISARD BLANCHATRE (1041) (un Oiseau dans son extrême vieillesse).

M 5 LA-

- LARUS GLAUCUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 814. (Mas)
- LARUS FUSCUS. Lath. Ind. Orn. p. 815.
- (672) GOELAND À MANTEAU BLEU d'Europe
   Le Goeland Cendré Buff. pl. 253. —
  GLAUCOUS GULL Lath. Syn. v. 6. p. 372.
- LARUS GLAUCUS. (triennis) Larus Argentatus Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 814. B. — Gmel.
- (1052) p. 600. LE GOELAND à MANTEAU BLEU (à l'age de trois Ans après sa mue) SILVERY GULL Lath. Syn. v. 6. p. 375.
- LARUS FLAVIPES. Meyer Deut. Ornith. \_\_\_\_\_\_
- (1043) des mers du Nord LE GOELAND à PIEDS JAUNES Meyer pl. Enl.
- LARUS FLAVIPES. (Hornotinus) LE PETIT GOELAND MANTEAU NOIR, OU LE
- (1051) GOELAND à PIEDS JAUNES des Mers du Nord dans son premier age.
- LARUS CYANORHINCHUS. (Mas) Meyer Deut.

  Ornith. —— LA MOUETTE à BEC ET
- (117) PIEDS BLEUS d'Europe (Male) Meyer

  pl. Enl. La grande Mouette Cendrée
  à pieds bleus Buff. pl. 977.
- LARUS CYANORHINCHUS. Albus (Mas) Mihi Larus Eburneus Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 816.
- (1059) LA MOUETTE à BEC ET PIEDS
  BLEUS Variété toute blanche (Male) —
  La Mouette blanche Buff. pl. 994.

  Ivory Gull Lath. Syn. v. 6. p. 377.

- LARUS CYANORHINCHUS. Annus (Mas) \_\_\_\_\_\_
- (1063) BLEUS passant du Jeun age à l'age fait (Male)
- LARUS TRYDA CTYLUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 817. Larus Risfa Gmel. p. 594. LA
- (980) MOUETTE à TROIS DOIGTS, OU LE KUTGEGHEF d'Europe Mouette Cendrée tachetée Buff. pl. 387. Tarrock Gull (young bird) KITTIWAKE GULL Lath. Syn. v. 6. p. 393.
- LARUS RIDIBUNDUS. (Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 811. Gmel. p. 601. LA MOU-
- LARUS RIDIBUNDUS (Junior feu Annus) (Mas)

   Larus Canus Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 815.
- (1042) Gmel. p. 596. LA MOUETTE RIEU-SE à PATTES ROUGES, DANS SON JEUN AGE (Male) — Common Gull Lath. Syn. v. 6. p. 378.
- LARUS CATARACTES. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 818. Gmel. p. 603. Larus Fuscus Brisf.
- (1023) Orn. v. 6. p. 165. LE GOELAND BRUN, OU LE CATARACTE des mers Australes Buff. v. 9. Edit. folio. Port Egmon Hen Cooks voy. 1. p. 44. Forst.

vey. v. 1. p. 109—118. —— SKUA GULL. Lath. Syn. v. 6. p. 385.

# GENUS PROCELLARIA. GENRE PETREL.

PROCELLARIA CAPENSIS. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 822. — Gmel. Syst. 1. p. 565. — LE

(773) PETREL TACHETÉ, OU LE DAMIER des mers Australes (Male) Buff. pl. 964. — PINTADO PETREL Lath. Syn. v. 6. p. 401.

PROCELLARIA PELLAGICA. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 826. — Gmel. Syst. 1. p. 561. — L'01-

(832) SEAU DE TEMPÉTE des mers Australes

Buff. pl. 993, —— STORMY PETREL

Lath. Syn. v. 6. p. 411.

PROCELLARIA ALBA. B. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 822. — LEPETREL à VENTRE BLANC

(104) des lles Norfolk — NORFOLK-ISLAND PE-TREL Lath. Syn. Supp. v. 2. p. 334. — Phill. voy. pl. — p. 161.

# GENUS MERGUS.

GENRE HARLE.

MERGUS MERGANSER. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 828.

MERGUS CASTOR. (Femina seu Junior) Lath.

(814) HARLE VULGAIRE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 951 et 953. — GOO-SAN-

Dun Diver (Femina) Lath. Syn. v. 6. p. 418

MERGUS ALBELLUS. (Mas et Femina) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 831. — Gmel. Syst. 1.

(983) p. 209. — LE PETIT HARLE HUP-PÉ, OU LA PIETTE d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 449. (le Male) — Frisch T. 172. — SMEW, OR WHITE NUN Lath. Syn. v. 6. p. 428.

MERGUS MINITUS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 832.

— LE HARLE PIGMÉ, OU LE HARLE

(1005) à TÊTE ROUSSE d'Europe — La piette (Femelle) Buff. pl. 450. — MINUTE MERGANSER Lath. Syn. v. 6. p. 429.

MERGUS SERRATOR. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 829. — Mergus Cristatus Briss.

(1055) Orn. v. 6. p. 237. t. 23. — LE HARLE HUPPE d'Europe (Male) Buff. pl. 207. — RED BREASTED MERGANSER Lash. Syn. v. 6. p. 423.

#### GENUS ANAS.

# GENRE CANARD

ANAS ATRATA. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2. p.

834. — LE CYGNE NOIR à AILES
BLANCHES de la terre de Diemen (Male)

(572) d'Entercasteaux voy. — Sonnini Edit. de Buff. v. 25. p. 108. — BLACK SWAN Lath.-Supp. to Syn. v. 2. p. 343.

ANAS

- ANKS ALBITRONS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 842. Gmel. Syst. 1. p. 509. —
- (1005) L'OIE RIEUSE, OU L'OIE à FRONT
  BLANC des terres Septentrionales Buff. v.
  9. p. 399. Edit. in folo Laughing
  Goose Edw. t. 153. WHITE-FRONTED GOOSE Lath. Syn. v. 6. p. 463.
- ANAS BERNICLA. Gmel. Syst. 1. p. 513. ——
  LE CRAVANT d'Europe Buff. pl. 342. —
- (833) THE BRENT GOOSE Lath. Syn. v. 6. p. 467. Frisch T. 156.
- Anas Erythropus. Gmel. Syst. 1. p. 512. LA BERNACHE d'Europe Buff. pl. 855. —
- (834) BERNACLE DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 466. Frisch T. 189.
- Anas Moschata. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 515.

  LE CANARD MUSQUÉ d'Amerique
- (835) (Male) Buff. pl. 989. MUSCOVY DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 476. Frisch T. 180.
- Anas Tadorna. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 506.

  LE TADORNE, OU CANARD DE
- (223) MER d'Europe (Male) Buff. pl. 53.

  SHELDRAKE Lath. Syn. v. 6. p. 504. —

  Frisch T. 166.
- Anas Molissima. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p. 514. — L'eider, ou l'oye à du-
- (245) VET d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 208 et 209. EIDER DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 470.

.

- Anas Bahamensis. Gmel. Syst. 1. p. 516. LE CANARD MAREC, OU MARÈCA
- ANAS AUTUMNALIS. Gmel. Syst. 1. p. 537. —
  LE CANARD SIFFLEUR à BEC ROU-
- (665) GE ET NARINES JAUNES de Caijenne Buff. pl. 826. RED-BILLED WHIST-LING DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 498.
- ANAS RUFINA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1.
  p. 541. LE CANARD SIFFLEUR
- (216) HUPPÉ d'Amerique (Male et Femelle) Buff.

  pl. 928. —— RED CRESTED DUCK

  Lath. Syn. v. 6. p. 544.
- ANAS BOSCHAS. Gmel. Syst. 1. p. 538. LE CANARD SAUVAGE d'Europe Buff. pl.
- (933) 776. WILD DUCK Lath. Syn. v. 6, p. 489. Frisch T. 158.
- ANAS MARILA. Gmel. Syst. 1. p. 509. \_\_\_\_ LE PETIT MORILLON RAYÉ des terres
- (937) Septentrionales Brisson Orn. v. 6. p. 416. —
  LE CANARD MILOUINAN Buff. pl. 1002.
   SCAUP DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 500.
   Frisch T. 193.
- ANAS FERINA. Gmel. Syst. 1. p. 530.

  LE CANARD MILOUIN des terres Sep.
- (938) tentrionales Buff. pl. 803. POCHARD

•	DUCK Lain. Syn. v. 6. p. 523. — 1113611	
* · · · ·	T. 171.	
ANAS	Sponsa. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 539.	
• .	LE BEAU CANARD HUPPÉ de la Caro-	
(213)	line (Male) Buff. pl. 980. — SUMMER	
	DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 546.	
ANAS GLARICULATA. (Mas et Femina) Gmel.		
•	Syst. 1. p. 539. LA SARCELLE	
(217)	DE LA CHINE (Male et Femelle) Buff. pl.	
• .	805 et 806. —— CHINESE DUCK Lath.	
	Syn. v. 6. p. 548. — Edwards t. 102.	
ANAS	CRECCA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 532.	
•	LA PETITE SARCELLE d'Europe (Male)	
(989)	Buffon pl. 947. — COMMON TEAL	
<b>.</b>	Lath. Syn. v. 6. p. 551.	
Anas D	ISCORS. Lath. Ind. Orn. v. 2. p. 854.	
Anas V	IRGINIANA. Brisj. Orn. v. 4. p. 455.	
•	SARCELLE SOUCROURETTE du Por	
(771)	Jackson Buff. pl. 403. (de Caijenne)	
	BLUE-WINGED TEAL Lath. Syn. v. 6.	
:	p. 503.	
ANAS	CLANGULA. Gmel. Syst. 1. p. 523.	
•	LE GARROT d'Europe Buff. pl. 802.	
<b>(</b> 941)	GOLD-EYE Lath. Syn. v. 6. p. 535.	
•	Frisch T. 182 et 184.	
ANAS	CASARCA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. 1. p.	
	511 L'OIE ROUSSE, OU LE KASAR-	
(945)	RA de Sibérie (Male et Femelle) Sonnini Edit.	
, -	de Buff. v. 25. p. 229. — RUDDY GOOSE	
2	Lath. Syn. v. 6. p. 456.	

- ANAS LEUCOPHTALMOS. (Mas) Bechet. Orn. Tasch. v. 2. p. 450. — LE CANARD à
- IRIS BLANC de l'Europe Septentrionale (215) (Male) --- WEISAUGIGE ENTE Borkhaus Deuts. Orn. pl. Enl.
- ANAS NIGRA. Gmel. Syst. I. p. 508. LE CANARD MACREUSE des mers du nord
- Buff. pl. 978. SCOTER BLACK DI-(000) ver Lath. Syn. v. 6. p. 480.
- ANAS FUSCA. Gmel. Syst. 1. p. 507. LA GRANDE, OU DOUBLE MACREUSE
- (991) des mers du nord Buff. pl. 956. --- VEL-VET DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 482.
- ANAS QUERQUEDULA. (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 531. - LA SARCELLE d'Europe (Male)
- (992) Buff. pl. 946. GARGANEY Lath. Syn. v. 6. p. 550.
- ANAS PENELOPE. (Mas et Femina) Gmel. Syst. I. p. 527. - LE CANARD SIFFLEUR
- (1006) d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 325. (le Male) - WIGEON DUCK Lath. Syn: v. 6. p. 518.
- ANAS CLYPEATA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. I. p. 518. - LE CANARD SOUCHET
- (939) ou le Rouge d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 971 et 972. — SCHOVELER DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 509.
- ANAS ACUTA. (Mas et Femina) Gmel. Syst. I. p. 528. --- LE CANARD à LONGUE
- (940) QUEUE d'Europe (Male et Femelle) Buff. N

pl. 954. (le Male) — PINTAIL DUCK Lath. Syn. v. 6. p. 526.

ANAS CYGNOIDES. (Mas) Lath. Ind. Orn. v. 2.
p. 837. — Gmel. p. 502. — L'OIE à

(974) GOITRE de Guinée (Male) Buff. pl. 347.

Frisch T. 153 et 154. —— CHINESE GOOSE Lath. Syn. v. 6. p. p. 447.

#### GENUS APTENODYTES. GENRE MANCHOT.

APTENODYTES CRYSOCOME. (Mas) Gmel. Syst.
1. p. 555. — LE MANCHOT SAUTEUR,

(221) OU MANCHOT HUPPE des lles Falkland (Male) Buff. pl. 984. —— CRESTED PINGUIN Lath. Syn. v. 6. p. 561.

APTENODYTES DEMERSA (Femina) Gmel. Syst.

1. p. 557. — LE MANCHOT à BEC

(222) TRONQUÉ des terres Magellaniques (Femelle) Buff. pl. 1005. — BLACK-FOOTED PINGUIN Edwards t. 94. — Lath. Syn. v. 6. p. 567.

# GENUS PELECANUS. GENRE PÉLICAN.

Pelecanus Onocrotalus (Mas) Gmel. Syst. 1. p. 596. — Le Très Grand Pélican

(560) Rosé d'Egipte (Male) (varieté du pélicam commun) Buff. pl. 87. — GREAT WHITE PELICAN Lath. Syn. v. 6. p. 575.

PRIECANUS AQUILUS. (Femina) Gmel. Syst. 1.
p. 572.

- p. 572. LA GRANDE FREGATTE des Tropiques (Femelle) Buff. pl. 961. (le Male) FRIGATE PELICAN Lath. Syn. v. 6. p. 587.
- PELECANUS CARBO. (Mas et Femina) Gmel. Syst.

  1. p. 573. LE GRAND CORMORAN
- (\$15) d'Europe (Male et Femelle) Buff. pl. 927.

   GREANT CORVORANT Lath. Syn.

  v. 6. p. 593. Frisch T. 187.
- Pelecanus Graculus. (Maset Femina) Gmel.

  Syst. 1. p. 574. Le petit cormo-
- (769) RAN, OU LE NIGAUD des terres Australes Buff. v. 9. p. 197. Edit. folio. — COM-MON SHAG, OR CRANE Lath. Syn. v. 6. p. 598. No. 14.
- Pelecanus Bassanus. Gmel. Syst. 1. p. 577.

  LE FOU BLANC, OU LE FOU DE
  - (661) BASSAN des mers du Nord Buff. pl. 278.

    GANNET Lath. Syn. v. 6. p. 608.
- PELECANUS SULA. Gmel. Syst. 1. p. 578. —
  LE FOU BRUN, OU LE FOU COMMUN
- (367) d'Amerique Buff. v. 10. p. 236. Edit. folio THE BOBY Lath. Syn. v. 6. p. 612.

# GENUS PHAËTON. GENKE PAILLE-EN-QUEUE.

PHAETON ÆTHEREUS. Gmel. Syst. 1. p. 581.

LE GRAND PAILLE-EN-QUEUE

(875) des Tropiques (Male) Buff. pl. 998.

N 2 COM-

common tropic bird Lath. Syn. 7. 6. p. 615.

PHAETON PHOENICUROS. Gmel. Syst. 1. p. 583. — LE PAILLE-EN-QUEUE à

(234) BRINS ROUGES d'Isle de France Buff. pl.
979. — RED-TAILED TROPIC-BIRD
Lath. Syn. v. 6. p. 619.

#### GENUS PLOTUS.

GENRE ANHINGA.

PLOTUS NIGER. (Mas et Femina) Mihi
PLOTUS MELANOGASTER. Gmel. p. L'AN.
580. (Femina)

(219) HINGA NOIR de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 959. (la Femelle) pl. 960. (le Male) —— BLACK BELLIED DAKTER Lath. Syn. v. 6. p. 624.

PLOTUS LEVAILLANTI. (Mas et Femina) Mihi — L'ANHINGA à COU ISABELLE d'Afrique

(220\*) pays Auteniquoi (Male et Femelle) — Vaill. voy. en Afriq. pl. Enl. No. 3. Edit. in Quarto.


PLOTUS RUFUS. (Mas) Mihi — L'ANHIN-GA à COLLIER MARON du Sénégal (Ma-

(977) le) — l'Anhinga Roux Buff. pl. 107. (Femelle) Lath. Syn. v. 6. p. 626. yar. C.

# CARACTÈRES PHYSIQUES

DES

# OISEAUX NON-DECRITS.



# CARACTÈRES PHYSIQUES

DE S

# OISEAUX NON-DECRITS.

#### GENRE VAUTOUR.

# (818) LE PETIT VAUTOUR NOIR & CALESON BLANC.

Longueur 21 Pouces, Ailes atteignant aux troix quart de la Queue, Pieds rouges, Ongles noires, Gorge et Joues denuées de plumes, la Peau de ces parties est d'un rouge incarnat, Plumage generalement noir, Cuisses et Abdomen blancs.

#### GENRE AIGLE.

#### (8) LE FAUCON GRIS-RAYÉ.

Longueur 18 Pouces, Bec noir, Cire et Pieds jaunes, Ongles noires, Plumage de toutes les parties supérieures gris plombé, raijé transversalement d'obscur, parties inférieures, gris blanchatre, egalement raijé de gris soncé, Queue noire, traversée vers son origine, d'une etroite bane blanche, aux trois quarts de sa N 4 longueur par une autre bande, large d'un Pouce et de la même couleur.

#### GENRE ROLLIER.

(957) LE ROLLIER à CALOTTE AIGUEMA?

Taille et formes en tout semblables au Cuit, ou Rollier varié d'Afrique, Bec plus fort, plus robuste et plus long. Le haut de la Tête jusque derrière l'Occiput est couverte d'une emple calotte d'un aigue-marin eclatant, toutes les pennes des Ailes et de la Queue sont d'un bleu de roi brillant, les epaulettes des premières d'une teinte plus claire, le Cou, la Gorge et toutes les parties inferieures d'un beau gris bleuatre, le Dos, les Scapulaires, et les grandes couvertures Ailaires verd olive soncé, enfin les plumes du Croupion verd de Mer eclatant.

#### GENRE TROUPIALE.

- (157) LE CAROUGE GORGE-ROUSSE.

  Taille du Carouge du Mexique, Plumage noir luisant, Front, Gorge et une partie du Cou chatain.
- (423) LE CASSIQUE CUIVRÉ. (Male et Femelle)

  Taille du Cassique à Dos rouge, Longueur
  totale 11 Pouces, Bec 1 Pouce 2 lignes, dessus fus

fus de la Tête, Cou et Poitrine verd-cuivré changeant, Dos, Scapulaires et parties inférieures couleur de bronze, moijennes et grandes couvertures des Ailes frangées de violet pourpré, grandes pennes des Ailes violet foncé, Queue noire changeante en violet. — La Femelle à en general le Plumage moins brillant.

# (152) LE TROUPIALE MASQUE NOIR. (\*) (Male et Femelle)

Taille du Troupiale d'Afrique, decrit par BUFFON, fous le nom de Cap-More, Bec conformé de même. — Le Male à le Front, la region des Yeux et des Oreilles, ainsi que toute la Gorge d'un noir velouté, haut de la Tête, Cou, Poitrine, Ventre et Abdomen jaune brillant, haut du Dos jaune olivatre, cette couleur borde egalement les grandes couvertures, et les pennes Ailaires, Queue et Croupion olive. — La Femelle à en général les couleurs moins vives, elle n'a pas cette espèce de Masque, la base du Bec, etant seulement engagé dans un cercle noir, très etroit.

# (612) LE CASSIQUE VIOLET à FRAISB.

Longueur 15 Pouces, Bec 1½ Pouces, Nuque et cotés du Cou pourvus de longues plumes trés ferrées, que l'Oiseau paroit avoir la

fa-

<sup>(\*)</sup> Mr. LE VAILLANT à trouvé ce Troupiale en Afrique, il en donners l'Histoire en decrivant les Oiseaux de ce genre.

faculté de relever, en forme d'une large fraise ou camail, Plumage generalement d'un violet foncé à reslets pourprés, Ailes et Queue noires, ainsi que le Bec et les Pieds,

#### GENRE LORIOT.

(596) Le loriot bicolor, ou l'oiseau d'or.

Taille de notre Loriot, Bec plus long et plus fort que ce dernier, Plumage d'un jaune d'or eclatant, Yeux entourés d'une espace noire, qui se termine en pointe vers l'Occiput, Ailes noires, largement frangées d'un jaune etincelant, les deux pennes du milieu de la Queue noires, terminées de jaune, Laterales a mi-partie jaunes, exterieures seulement noires à leur origine.

(475) LE LORIOT GRIVELÉ.

Taille du *l'Oriot d'Europe*, Bec brun, Ailes et Queue bruns noiratres, les premieres frangées de jaune tendre et la derniere ayant toutes les pennes terminées de cette couleur, le reste du Plumage d'un jaune de paille clair, relevé sur la Gorge et la Poitrine, par de petites taches longitudinales, rependues sur le milieu de chaque plume le long des baguettes.

(Je foupçonne cet Oiseau être une Femelle, de quelque espèce inconnue, il m'a été adressé de Batavia sans auçune Notice.)

(141) LE LORIOT MASQUE NOIR(\*). (Male et Femelle)

Taille du Précedent. - Le Male à toute la Tête, les Joues, la Gorge, et une partie du Cou engagé dans une espèce de capuchon ou masque noir, cotés du Cou, Ventre et couvertures du desfus de la Queue, du même jaune, que celui qui revêt notre Loriot, mais paraissant plus sombre, par la couleur foncée, repandue sur la partie des baguettes la plus adherante au Corps, Manteau, Dos et Croupion olivatre, Ailes noires, Couvertures frangés d'olivatre clair, pennes Ailaires frangées de blanc, petites plumes du poignet de l'Aile blanches vers le bout, les quatres plumes du milieu de la Oueue olive foncé, les suivantes olive jusqu'a moitié, puis noires, et terminées de jaune les exterieures moitié jaunes. — La Femelle à la plumage generalement plus sale, l'extremité du Bec noir , la partie noire du Cou frangé de jaune, et la Poitrine marquée de taches longitudinales noires.

DI-

<sup>(\*)</sup> Mr. LE VAILLANT donners dans fon Ornithologie d'Afrique une description de cette espèce.

#### DIVISION MAINATTE.

(320) LE PETIT MAINATTE VERD à CAPU-

Longueur 9½ Pouces, Bec 6 lignes, noir, Mandibule supérieure courbée, echancrée vers la pointe, region des Yeux et Joués nues, d'un jaune d'ocre orangé, Piéds robustes verdatres, Tête et haut de la Nuque couvertes d'une calotte noire, Gorge, Poitrine, Dos, grandes et petites couvertures Ailaires verd olive, Ventre jaunatre, Queue sombre frangée de verd olive à sa partie supérieure, et grise en dessous. — l'Iris dans cette espèce est rouge.

VENTRE TACHETÉS. (Male et Femelle).

Le Male, Longueur, 12 Pouces, Bec 1 Pouce 2 lignes, jaune, Mandibule superieure echancrée à la pointe, Tarse 1 Pouce 6 lignes, cette partie et les Doigts bruns, chaque ecaille bordée de jaune blanchatre, les Ailes aboutissent à la moitié de la Queue, Plumage sur toutes les parties supérieures d'un beau verd, parties inférieures verd jaunatre, sur le milieu de chaque plume une tache blanche longitudinale, de forme ovale, Gorge blanchatre.

La Femelle, constamment plus grande que le Male, à le Bec noir, plumage supérieur verdbrun soncé, Ailes et Queue brun verdoyant, toutes les parties insérieures gris sale, sur chaque pluplume deux raijés d'un verd'obscur. Le Male ainsi que la Femelle ont les couvertures adherantes au Corps, terminées de blanc. L'Ongle pos térieure la plus forte de toutes, et la Queue non etagée.

#### DIVISION MARTIN.

# (588) LE MARTIN à joues Rouges.

Longueur totale 11 Pouces, Bec 12 Pouces, brun, arête de la Mandibule supérieure, enfoncée entre les Plumes du front, qui s'avancent jusque sur l'orifice des Narines, Joues couvertes d'une Peau d'un rouge incarnat, toute la tête jusque derrière les Oreilles, de même que la Gorge d'un blanc pur, partagé tout à l'entour du Cou par un large collier noir, et terminé vers le Manteau par un autre collier blanc. Poitrine, Ventre et Cuisses de cette couleur, Dos, Scapulaires et Ailes bruns noiratres, petites, grandes et moijenues couvertures des Ailes, terminées d'un demi cercle blanc, Queue noire, jusqu'au trois quarts, de la longueur, et teiminée de blanc, Pieds robustes et longs, d'un beau jaune, Ongles brunes.

# GENRE COUROUCOU.

(436) GRAND COUROUCOU à VENTRE BLANC.
Plus fort de taille que le Couroucou à Ventre rou-

ge de Caijenne, Bec jaune, Ventre et Abdomein blanc, Tête, Poitrine, Dos, et couvertures de la Queue d'un beau verd doré à reflets, couvertures Ailaires raijées transverfalement de zigzags noirs et blancs, grandes pennes noires bordées de blanc, Queue carrée, les deux plumes extérieures seulement plus courtes que les intermédiaires, toutes de couleur verte bronzée, et terminées de noir. Le petit couroucou à véntre rou-

(755) LE PETIT COUROUCOU à VENTRE ROU-

Longueur 9 Pouces; Bec tant soit peu comprimé vers le bout, et d'un jaune blancharre, Manteau, Poitrine et Dos verd doré à restets bleus, cette couleur est terminée sur la Poitrine, par une etroite bande blanche, Ventre et couvertures du dessous de la Queue, rouge cramoisi, Plumes caudales intermediaires verds; à restets bleus, au bout une raije noire, qui les traverse soutes, les quatre pennes laterales de chaque coté raijés à egale distance de noir et de blanc, et terminées de cette dernière couleur, les deux exterieures plus courtes que les autres.

(29) LE COUROUCOU NARINA (\*) Male et Femelle)

> Taille egalant à peu près celle du Couroucou à Ventre jaune de Caijenne, Bec plus court

eŧ

<sup>(\*)</sup> VAILLANT en fait mention dans fon voyage à la Côte d'A-frique.

et moins large, à sa base d'un jaune clair. Le Male à toutes les parties supérieures, y compris la Gorge et la Poitrine, d'un beau verd, velouté à reslets metalliques. Ventre et Abdomen, d'un beau rouge carmin tendre, Epaulettes et petites couvertures des Ailes verd-doré, les grandes, parsemées de zigzags et frangées de verd doré. Plumes caudales intermédiaires verds à reslets, Laterales mi-partie interieurement de cette couleur, le reste vers le bout blanc.

La Femelle à les mêmes couleurs que le Male, sur les parties superieures, à l'exepcion des zigzags sur les couvertures Ailaires, qui sont d'un brun plus ou moins melangé, la partie de la Gorge et de la Poitrine, qui dans le Male sont d'un beau verd, sont d'un brun clair dans la Femelle, le haut du Ventre gris soiblement rosé, Abdomen et couvertures du dessous de la Queue rose.

#### GENRE COUCOU.

# (781) LE COUCOU GRIS BRONZÉ. (\*)

Taille du Coucou d'Europe, mais plus suelte, Bec plus arqué, d'un jaune citron, Mandi-

(\*) Ce Coucou et les suivants, vont être decrits et figurés dans la magnisique Ornithologie Africaine de mon ami Mr. F. LE VAILLANT, dont la science se rejouit de voir continuer la publication, et que les Auxdibule supérieure large enboitant l'inférieure; Ailes depassant tant soit peu l'origine de la Queue, toutes les parties supérieures du plumage d'un beau verd bronzé, bleuatre sur la Queue, moins eclatant et grisaillant vers le Cou et le haut de la Tête, parties inserieures gris soncé, Abdomen gris verdoijant, Pieds noirs.

(380) LE COUCOUROUX à BECROUGE. (Male)

Longueur totale 15 Pouces, Bec 1½ Pouces, rouge foncé, Queue longue, fortement etagée, Ailes depassant son origine d'un Pouce, Paupières garnics de cils, toute la Tête couverte d'une calotte bleu de plomb, le Plumage supérieur, y compris les pennes Ailaires et Caudales roux de rouille, les dernières noires à leur extremités, et terminées de blanc, Gorge et Poitrine roux clair, Ventre, Cuisses et couvertures inférieures de la Queue noires.

(562) LE COUCAL-GEANT.

Longueur totale 23½ Pouces, Bec 1 Pouce 5 lignes, arqué dans toute sa longueur, et incliné vers la pointe, Langue pointue, Paupières supérieures pourvues de long cils, Ailes 9 Pouces, Queue 13 Pouces fortement etagée, Pieds robustes, verd sombre, des deux Doigts antérieurs,

Amateurs attendent avec l'impatience et l'interet que cet ouvrage inspire à de si justes titres,

rieurs, l'intérieur le plus court, celui-ci porte une Ongle tant soit peu arquée et très longue; Tête, Cou et haut du Dos, roux fonce marqué de zigzags noirs, Gorge, Poitrine et Ventre blanc sale, maculé de roux clair, toutes les plumes qui recouvrent ces parties, ont les barbes deliées, les Baguettes sont fortes, larges, piquantes vers le bout, et d'un blanc pur, grandes et petites couvertures des Ailes barrées transversalement de blanc sale, de roux et de noir, grandes pennes des Ailes en dedans roux eclatant, barrées de noir; Barbes extérieures d'un jaune roussatre, barrées de roux foncé et entourées de noir. Croupion et Flancs couverts d'un duvet brun noiratre, Queue de cette couleur, raijée et terminée de blanc sale.

(469) LE MALKOHA ROUVERDIN.

Plus grand de taille que le Coucou Malkoha, décrit par Sonnini; Bec large a sa base, convexe, sur les cotés fortement arqué, long d'un Pouce et demi, Mandibule supérieure verte, inférieure noire, pointe verte, Narines placées vers le bord inférieur, a la base de la Mandibule supérieure, surmontées de long poils redressés, Joues couvertes d'une espèce de velours, d'un rouge incarnat, Tête gris soncé, devant du Cou et Poitrine couleur de rouille, Nuque, Ailes, Dos, et Queue verd sombre, à ressets cuivrées, cette dernière etagée, et les pennes qui la compôsent terminées de roux soncés.

#### (483) LE TRÈS PETIT COUCOU DORÉ.

D'un quart plus petit que le Didric, longueur six Pouces, Queue etagée, Plumage sur tout le Corps verd, doré à ressets metalliques, parties inférieures blanches, chaque plume raijée à egale distance de trois bandes, d'un beau verd doré, Pennes extérieures de la Queue raijées alternativement de verd doré, et de blanc.

# (895) Le coucou à queue frangée.

Longueur 10 Pouces, Bec noir, large à fa base, comprimé vers la pointe, Queue soiblement etagée, Plumage supérieur de couleur grise unisorme, inférieur, blanc roussatre, soiblement marqué d'etroites raijes sombres, Queue gris bleuatre, elegamment frangée à l'entour de chaque plume de blanc pur; Pieds bruns.

#### GENRE PIC.

# (724) Le pic à ventre ensanglanté.

Longueur 9 Pouces; Front et tour des Yeux blanc, Tête, Cou, Manteau, Ailes et Queue noires, Croupion blanc, Gorge et Poitrine rouge, Ventre brun, sur le milieu de cette partie une tache longitudinale d'un rouge sanguin, qui s'étend depuis la Poitrine jusques sur les couvertures inférieures de la Queue.

#### (480) Le pic brun rayé de noir.

Taille plus petite que PEpeiche d'Europe,

Bec moins large, à sa base surmonté d'une arète, et comprimé vers la pointe, Pennes et couvertures Ailaires d'egale longueur, Queue soiblement etagée; tout le Plumage d'un brun chocolat, raijé sur le Dos, les Ailes, et la Queue de larges bandes noirs, et par d'etroites sur le Ventre, et les couvertures inférieures de la Queue.

# (481) Le pic tache te à dos rouge.

Taille de l'Epeiche, Bec plus long, orifices des Narines non recouvertes, haut de la Tête et Gorge noire, pointillée de blanc, plumes de l'Occiput allongées en forme de huppe pendante, d'un rouge vif; une ligne blanche de chaque coté du Cou, Poitrine et Ventre noirs, sur chaqu'une des plumes une tache blanche oblongue, haut du Dos rouge incarnat, grandes couvertures Ailaires, d'un rouge brun sur leurs Barbes extérieures, noires en dedans et marquées de grandes taches blanches, Croupion maculé de noir et de rouge sale, Queue fortement etagée et noire.

# (631) LE PIC BARBARESQUE (\*).

Taille mitoijenne entre le *Pic noir* et le *Pic verd* d'Europe. Longueur 13½ Pouces; Bec 1 Pouce 6 lignes, surmonté d'une arête; Haut de la Tête gri-

<sup>(\*)</sup> Cé Pic ainsi que quelques autres paroitront dans l'Ornithologie Afriquaine de Mr. F. LE VAILLANT.

grise, aijant chaque plume terminée de jaune verdatre. De la base du Bec part une espèce de moustache d'un gris soncé, Cou, Poitrine et Ventre blanc, raijé de verd clair, Dos ainsi que toutes les couvertures des Ailes d'un beau verd jaunatre, raijé soiblement de blanc sale; pennes Ailaires sombres, marquées en dehors, de taches blanches, Croupion jaune verdatre. — La femelle ne dissère du Male qu'en ce que la moustache est moins soncée et très peu aparente.

#### (83) LE PETIT PIC ROUGEATRE.

Longueur totale à peu près de 6 Pouces. Tête, Cou, Dos, et barbes extérieures des plumes Ailaires d'un rouge plus ou moins foncé, Barbes intérieures des Ailes marquées de grandes taches blanches. Toutes les parties inférieures du Plumage d'un brun bistre, raijé transversalement de blanc sale, Bec, Queue et Pieds bruns noiratres.

# (78) LE PETIT PIC à BAGUETTES D'OR.

Taille du petit Pic noir de BUFFON pl. Enl. 694. fig. 2. Front brun noisette, haut de la Tête et Occiput rouge, Gorge et cotés du Cou blanc, separé des deux cotés par un raije couleur de noisette qui prend naissance vers la Mandibule inférieure et se prolonge le long du Cou; Dos raijé de blanc et de brun et melangé de verd, Poitrine d'un gris blanc sale, chaque plume

plume raijée dans sa longueur de uoir; Ailes sombres raijées de blanc, toutes les Baguettes de ces dernières ainsi que celles de la Queue d'un beau jaune d'or.

# (1054) Le pic à moustaches noires.

Taille du Pic moyen de Loraine, Bec pareillement conformé, d'un brun noiratre, des deux angles de la mandibule inférieure, partent deux moustaches noires, qui s'étendant en se largissant sur toute la longueur du Cou, jusques à la Poitrine, derriere les Yeux une grande tache noire, Occiput de cette couleur, haut de la Tête couronnée d'une belle plaque d'un rouge foncé. Front noir, pointillé de blanc, la Gorge et les côtes du Cou, blanc maculé de fauve, tout le reste des parties supérieures du plumage, y compris la Queue, teintes d'un olive grisatre raijé transversalement de blanc, Ventre raijé alternativement de brun et de gris, toutes les Baguettes des grandes pennes Ailaires et caudales, d'un blanc jaunatre.

# GENRE MARTIN PÉCHEUR.

## (466) LE PETIT MARTIN PÉCHEUR AIGUE-MARIN.

Ce petit Martin Pecheur long de 5 Pouces, dont le Bec seul à plus d'un Pouce et demi, est presque entiérement d'un bleu d'aigue ma-

O 3 rin

sin eclatant, cette couleur forme un large collier fur la Poitrine, s'étendent fur les flancs, ou elle est agréablement tranchée par le blanc pur de la Gorge, du milieu du Ventre, et de l'Abdomen. Une tache longitudinale de cette couleur, fur les cotés du Cou orne encore ce bel Oiseau dont le Bec et les Pieds sont noirs.

(210) LE MARTIN CHASSEUR (\*) (Male et Femelle)

Taille à peu pres du Martin Pécheur à Tête grise du Sénégal. Longueur totale 9 Pouces, Bec 2 Pouces 2 lignes, rouge à la base, noir vers la pointe. — Le Male à la Tête couverte de plumes allongées d'un brun, mêlé de noir, petites couvertures Ailaires et manteau de la dernière couleur, parties inférieures blanc bistre, plumes du Ventre raijées longitudinalement de noir, Croupion, Queue et grandes couvertures des Ailes bleues, pennes Ailaires, de la même couleur jusqu'a la moitié de leur longueur, noires sur le reste, Barbes intérieures de toutes les plumes Ailaires d'un beau jaune d'ocre. — La Femelle ne dissère du Male qu'en ce que les plumes de la Tête sont d'une teinte moins son-

cée 🤉

<sup>(\*)</sup> Découvert par LE VAILLANT qui nous donnerà dans fon interessant ouvrage, des renseignemens sur sa manière de vivre et de se nouvrir.

cée, les Couvertures et le Manteau gris terreux, et le bleu du Croupion ainsi que des Ailes moins brillant.

(731) Le martin pécheur à ventre sablé.

Taille du Précédent, Mandibule supérieure rouge vif, pointe noire ainsi que toute la Mandibule insérieure, Pieds noirs, une ligne noire part de l'angle du Bec, et passe sous les Yeux, une autre blanche part de l'orisice des Narines, et aboutit aux Yeux, Tête, Cou, Dos, Queue et Ailes bleu d'aigue marin, petites et moijennes couvertures de ces dernières d'un beau noir; Gorge blanche, cotés du Cou, Poitrine et Ventre de cette couleur, de petites raijes, et des taches presques imperceptibles sont repandues sur ces parties.

(787) LE MARTIN PECHEUR à PLASTRON, OU LE VERDEROUX.

Longueur totale 12 Pouces, Bec plus de trois Pouces, noir, ainsi que les Pieds; Tout le Plumage supérieur verd soncé à restets metalliques, cette couleur est coupée sur la Nuque par un cercle blanc, Gorge, cotés du Cou et Ventre d'un blanc pur, sur la Potrine un large plastron roux clair, les Flancs mouchetés de verd soncé à restets. — La Femelle n'a point de plastron, du reste elle ressemble au Male.

# ( die )

#### GENRE GUEPIER.

(1046) Le petit guepier à haussecole noir.

La longueur totale de cet joil Guépier est de six Pouces, son Bec est peu arqué, long d'environ un Pouce et noir, la couleur dominante sur la Tête, le Dos, les plumes sub-ailaires et les petites couvertures est d'un verd indécis et renbruni, la Gorge est d'un beau jaune citron, terminé par un large Haussecol-noir, derrière les Yeux une taché oblongue de cette couleur, la Poitrine et le Ventre sont d'un brun olivatre; l'origine des pennes Ailaires et Caudales est ronsse, vers le bout de celle-ci une large tache noire, les deux plumes intermediaires de la Queue sont vertes.

Ce Guépier à beaucoup de rapports avec le Guépier varié de Sonnini v. 18. p. 278 mais il est d'un tiers plus petit.

# GENRE PROMÈROPS.

# (525) LE PROMÉFIL.

Longueur totale 12 Pouces 2 lignes, Bec 2½ Pouces, moins arqué et plus rensié vers sa pointe, que ne l'ont ordinairement les Oiseaux de ce genre. Narins couvertes de Plumes, arête de la Mandibule supérieure, relevée et engagée dans leur centre; De la Gorge part une espèce de plastron s'elargissant en triangle sur la Poitrine, les Plumes qui le compose sont couchées

en forme d'ecailles, d'un bleu emaillé à reflets argentés, ce plastron est terminé par un ceinturon verd bronzé, haut de la Tête et nuque à reflets pourpres, cotés du Cou, Dos et Ailes d'un beau noir velouté, marqué sur les couvertures des Ailes d'un croissant pourpre, toutes les plumes Ailaires larges et coupées carement; Queue non etagée, Pennes intermédiaires, et laterales d'un verd pourpre velouté, les premières sur toute leur longueur, les secondes sur les Barbes extérieures seulement, Pennes extérieures noir de velours; Ventre et Flancs violets, les plumes des Flancs allongés en filets à barbes clair semées, ces plumes que l'Oiseau peut etaler ont jusqu'a sept Pouces et demi de longueur.

# (100) LE PROMÊROPS NAMAQUOI. (\*)

Longueur totale to Pouces 2 lignes, Bec tres arqué long, mince délié et de couleur brune, Queue etagée, Pieds noirs, Plumage supérieur violet, Ailes et Queue verd soncé luisant, chaque penne des Ailes à vers le milieu une grande tache carrée à la Barbe intérieure, et les denx pennes intérieures de la Queue, ont une tache de la même couleur vers le bout. — La Femelle à toute la Gorge et la Poitrine d'un brun noisette.

GEN-

<sup>(\*)</sup> Découvert par LE VAILLANT.

on souci, qui partent des Flancs, empechent de consondre cette espèce.

#### (984) LE HEOROTAIRE GRI-GRACULE.

Taille du Heorotaire Graculé, decrit par AUDEBERT Vol. 2. pl. 87. Bec plus court, jaune citron de même que les Pieds, Langue terminée en brosse, les Joues denuées de plumes sont d'un beau jaune citron, Front blanc, haut de la Tête noire, tout le Plumage supérieur, gris, maculé de blanc sur le Cou; couvertures des Ailes largement frangées de verd olive, les deux pennes intérieures adherantes au corps entièrement grises, les Plumes qui recouvrent les Oreilles sont d'un gris à reslets argentés et bordées de noir, parties inférieures blanches, Poitrine legèrement raijée de gris soncé, Queue ronde terminée de blanc, pennes Ailaires bordées de cette couleur.

# (985) Le Heorotaire velouté.

Taille du Heorotaire Foulihaio, décrit par AUDEBERT pl. 69. — longueur 7 Pouces; Bec 5 lignes, jaune, ainsi que les Pieds; Plumage sur tout le corps verd olive, plus clair en dessous; Ce Heorotaire est remarquable par de petites plumes veloutées qui prennent leur origine de chaque côté, sous l'Oeil se derigent sur les Narines, garnissent l'espace entre la Mandibule superieure et l'Oeil, et recouvrent l'angle du Bec, cette espèce de velours est jaune, d'autres plumes grises, fort serrées, forment au Bec inferieur une courte moustache.

La Femelle n'a pas cet ornement en partage, tout son plumage etant uniforme, de couleur verd olive.

#### (670) LE HEOROTAIRE ALBICAPIL.

Taille du Heorotaire Fuscalbin décrit par AUDEBERT v. 2. pl. 61. Pieds et forme du Bec semblables à ceux de ce dernier, région des Yeux entourées de plumes, toute la Tête est rccouverte d'une calotte noire, qui engage aussi les côtés en dessendant en pointe le long du Cou. le milieu du Crane est traversé par une bande blanche, qui aboutit de chaque côté un peu au dessus du coin de l'Oeil, la partie antérieure du Cou, le Manteau, ainsi que toutes les autres parties supérieures sont d'une belle couleur verte olive, toutes les plumes Ailaires et caudales frangées de la même couleur, à l'exception des extremités, des grandes pennes Ailaires qui sont bordées de blanc, cette dernière couleur revet tout l'Oiseau depuis la Gorge jusqu'à l'Abdomen.

#### GENRE OISEAU-MOUCHE.

## (555) L'OISEAU-MOUCHE VERD-DE MER.

Longueur à peu près 4 Pouces, Bec 6 lignes, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche à son origine et noire vers le bout, Tête, Dos, et couvertures verd doré avec une legère teinte brune, toutes les parties inférieures jusqu'à l'Abdomen d'un beau verd de iner, clair à reflets dorés, Abdomen blanc, couvertures du dessous de la Queue largement bordées de verd très clair, toute la Queue à la partie supérieure d'un beau verd lustré, Ais les sembres à ressets de violet clair.

#### GENRE GRIVE.

## (901) LE MERLE GUTTURAL.

Taille surpassant Inotre Merle, Longueur 11½ Pouces, Bec I Pouce I ligne, noir, plus comprimé vers le bout que celui du Merle, echancrure comme ce dernier, Pieds jaunes, Ongles brunes, Queue tant soit peu arrondie, les Ailes depassent son origine d'un Pouce et demi; Plumage du Dos et du Croupion brun lavé, fur chaque plume une tache noire le long de la Baguette, haut de la Tête brun noiratre, une raije blanche part de la Mandibule supérieure, passe au dessus des Yeux, et aboutit a l'Occiput, l'Oeuil est entouré d'un cercle noir, qui se prolonge en entourant la Mandibule inférieure, et dessendant en une large raije fur le haut du Cou, aijant des deux cotés une grande tache blanche. Poitrail plastronné d'un gris foncé terminé d'un ceinturon noir, Ventre blanc, sur les Flancs et l'Abdomen de grandes taches noires en forme de larmes. Poignet et petites couvertures des Ailes noires, chaque plume de ces parties porte une

petite tache blanche à sa pointe, Pennes caudales terminées de blanc.

# (968) LE MERLE GRIMPEUR.

Je donne le nom de Grimpeur à cet Osseau nouveau, que j'ai cru devoir placer a la suite des Merles, par rapport a la construction du Bec, en attendant que des observations faites sur les lieux nous instruisent de ses habitudes, qui certainement doivent différer a beaucoup d'égards de ceux de nos Merles. J'ajoute ici les caractères physiques de cette espèce dont deux individus m'ont etés adressés.

Longueur totale huit Pouces trois lignes, envergure six Pouces et demi, Bec 6 lignes. noir, courbé vers la pointe et échancé, Narines non recouvertes, Pieds noirs, Ongles brunes très longues, peu arquées, une raijure profonde de chaque coté, jusqu'aux trois quarts de leur longueur, Pointe effilée; Queue 3 Pouces, 5 lignes, ronde, les deux plumes du milieu les plus longues, toutes les Baguettes fortes et presque depourvus de barbes à leur extremités, plumes de la Tête et du Cou antérieur brunes, une tache noire sur le coté de chaque barbe, Dos et Croupion très emplumé d'un roux ardent, petites et moijennes couvertures des Ailes noires, terminés de gris, ce qui produit deux raijés de cette couleur sur l'Aile. Gorge, Poitrine et Ventre blancs, un croissant noir renversé passe sur la Poitrine. - Cette

description convient à l'un de ces Oiseaux, le second à la Gorge et le Cou roux sans collier. (1900) LE MERLE à CROISSANTS.

Longueur 6 Pouces et demi, Mandibule supérieure recourbée vers la pointe, Narines non recouvertes, Queue ronde, Ailes depassant tant soit peu son origine, Plumage d'un noir luisant, petites plumes du Poignet des Ailes blanches, petites couvertures de ces dernières, terminées d'un croissant etroit, de cette couleur, plumes du Manteau, depuis leur origine jusqu'au trois quart de leur longueur, d'un blanc pur, et terminées d'un large croissant noir (\*), Bec et Pieds de cette couleur.

#### GENRE FOURMILLIER.

# (966) LE GRAND FOURMILLIER RAYÉ.

Taille de *l'Etourneau*, Bec conformé comme celui de *l'Azurin*, echancré vers la pointe, Narines non recouvertes, Tarse long, bleu, ainsi que les Doigts, Ailes courtes, Queue longue et ronde, haut de la Tête roux foncé, les petites couvertures des Ailes ont une zône noire, vers le bout de chaque plume, suit une

211-

<sup>(\*)</sup> Ce n'est qu'en relevant les plumes du Mantcau, que l'on appercoit le blanc, l'Oiseau pervissant entièrement noir, lorsqu'elles sont couchées les unes sur les autres.

autre de roux clair, terminée d'une troisième qui est noire, toutes les parties inférieures y compris les cotés du Cou, d'un blanc sale, raijé transversalement de noir, Queue grise raijée de noir.

(967) Le fourmillier à cuttipennes.

Longueur totale 7 Pouces 2 lignes, Bec 1
Pouce 2 lignes, droit depuis son origine et
courbé vers la pointe, ou il est echancré,
Mandibule supérieure brune, inférieure blanche à son origine, tout le Plumage d'un roux
verdoijant, plus clair sous la Gorge, Queue
ronde, de couleur brune, Baguettes sortes,
piquantes et usées vers le bout.

(987) LE FOURMILLIER GRIS-NOIR.

Taille du *Tetma*, Bec noir, Tarse alongé, Tête et Gorge noires, tout le reste du Plumage d'un gris plombé unisorme, petites couvertures Ailaires noires, chaque plume terminée d'un croissant blanc.

(793) LE FOURMILLIER à CALOTTE NOIRE.

Taille du Precédent, une ample calotte noire formée de plumes longues, que l'Oiseau paroit avoir la faculté de relever en huppe, couvre la Tête; Gorge et devant du Cou noir, cette couleur, se prolonge sur le Ventre, ou elle est terminée en forme de fer de lance, Dos brun jaunatre, Ailes et Queue noires, les premières ont toutes les couvertures tachetées de blanc,

et la dernière est terminée par un fercle de cette couleur.

#### (1008) LE FOURMILLIER SOURCI-BLANC.

Tant soit peu plus petit que le Bambla, Queue longue, Gorge et cotés du Cou ainsi que le milieu du Ventre noirs, Ailes et Queue de cette couleur, la dernière terminée de blanc pur, petites couvertures noires, aussi terminées de blanc, cotés du Ventre et une bande au dessus des Yeux de la même couleur, le reste du Plumage supérieur gris terreux.

#### (726) LE PETIT FOURMILLIER GRIVELÉ.

Longueur totale trois Pouces et demi, Bec long, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche, Queue courte, le Plumage supérieur, y compris les Ailes et la Queue noir, toutes les plumes frangées legèrement de blanc pur, sur l'Aile deux etroites raijés blanches, tout le Plumage inférieur blanc, avec des mouchetures longitudinales, sur chaque plume.

#### GENRE COTINGA.

### (716) LE COTINGA FLAROU.

Taille du Guereïva, Plumage d'un gris soncé; verdissant legérement sur le haut du Dos et le bord extérieur des pennes caudales, Plumage des parties inférieures, gris clair, petites couvertures des Ailes, ainsi que la Queue terminées de

TOUR

roux clair, deux larges tousses d'un roux brillant, ornent les Flancs, cette couleur est aussi repandue sur les petites Plumes du haut de l'Aile.

## (493) LE COTINGA à FLANCS VIOLETS.

Ce joli Petit Cotinga qui n'a guère plus de 5 Pouces de long, est d'un brun noiratre uniforme fur tout le dessus du corps', le dessous brun noisette, une raijé longitudinale d'un blanc pur commence sous la Poitrine, et paroit partager le Ventre en deux parties, une pareille zone large de deux lignes, traverse tout le Croupion dans sa largeur, et vient se terminer sur les Cuisses, Abdomen et Couvertures inférieures de la Queue blanches, les Flancs sont ornés d'une belle tousse d'un Violet pur.

#### GENRE COLIOU.

# (162) LE COLIOU JOU-NUE (\*).

Longeur 13 Pouces. Mandibule supérieure blanche a son origine, noire vers le bout, inférieure entièrement noire, région des Yeux dénuée de plumes et d'un rouge vif, Plumage en dessus gris verdatre, en dessous gris vineux, Couvertures sous-Ailaires ainsi qu'une partie des grandes pennes, rousses, plumes de la Queue à bar-

<sup>(\*)</sup> Cette espèce et la suivante paroitront dans l'Ornithologie Afrisaine de Mr. LE VAILLANT.

à barbes etroites, les intermédiaires les plus longues, Pieds gris, Ongles noires.

(780) LE COLIOU à GORGE NOIRE.

Taille du Précédent, Bec tant soit peu plus fort, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche, tour des Yeux nue, Front et Gorge noires. Plumes de la Tête allongées en huppe et a barbes déliées, couleur de tout le Plumage supérieur d'un bistre plus ou moins soncé, Ventre, Cuisses et Abdomen gris roussatres, dessous des Ailes couleur de rouille, Pieds d'un rouge vif, Ongles noires.

#### GENRE GROS-BEC.

(797) LE GROS-BEC MANGEUR DE RIZ, OU LE PADDA-GRI.

Taille du Padda de la Chine, Bec et Pieds conformés comme ceux de cet Oiseau, mais d'un blanc pur, plumage supérieur gris, Queue et Ailes plus sombres, une petite couronne noire, sur le haut de la Tête, parties inférieures blanches, plus ou moins grisaillées.

(641) LE GROS-BEC COL-COUPÉ.

Longueur 4½ Pouces, Bec et Pieds blancs, une bande, large de deux lignes d'un rouge sanguin prend son origine derrière les Yeux et environne entièrement le haut du Cou, ce qui à une certaine distance, produit l'effet comme si l'Oiseau avoit été blesse à cette partie;

le reste du Plumage gris vineux raijé de noir fur les parties supérieures, et tacheté de blanc fur le Ventre, Queue foncée, les deux plumes extérieures bordées de blanc, les autres ont une tache de cette couleur sur leur extremité.

# (703) Le gros-bec à ventre perlé.

Taille du Moineau, Bec plus epais, d'un bleu foncé, les bords] des Mandibules grises, Tête, Cou postérieur, Dos et Ailes gris foncé, Queue noire, Cou antérieur, Poitrine, parties laterales du Ventre, ainsi que les couvertures caudales, d'un rouge cramoisi, milieu du Ventre noir verdatre, sur chaque plume deux taches rondes d'un blanc pur.

#### (606) LE CARDINALIN.

Longueur 4 Pouces, Tête, région des Yeux, Ventre et Abdomen d'un beau noir velouté, Cou, Poitrine, Dos et couvertures du dessus de la Queue d'un rouge cramoisi pur et brillant, les plumes du Croupion sont allongées, elles recouvrent la Queue dans presque toute sa longeur, Ailes et Pennes caudales brunes, frangées de blanc sale.

# (437) LE PETIT GROS-BEC à COURONNE ET PLASTRON COULEUR DE FEU.

Taille du *Précédent*, Queue longue arrondie, Ailes atteignantes au quart de fa longeur, Bec rouge, Pieds noirs; depuis la Gorge jusque sous la Poitrine s'étend un large plastron couleur de seu brillant, sur le haut de la Tête

une couronne de la même couleur, cesse entourée d'un cercle noir, qui prend son origine à la base du Bec supérieur et passe sur les Yeux, origine des pennes Ailaires noires, orangées au milieu et noires sur le reste de leur longueur; Queue orangée depuis son origine, jusqu'aux trois quarts de sa longueur et noire à l'extremité, les deux pennes extérieures entiérement de cette couleur, cotés de la Tête ainsi que le Manteau, fauve tacheté de noir, Ventre et Abdomen blanc sale.

# (286) LE VERDIER à VENTRE JAUNE.

Bec et Pieds couleur de corne, pareils à ceux du Verdier d'Europe, toutes les parties supérieures sont d'un brun verdoijant, plumes de la Gorge et du haut du Cou, grises à leur origine, raijées transversalement vers leur extremité de brun et terminées de jaune, tout le reste des parties inférieures d'un beau jaune doré, petites couvertures sous-Ailaires blanches.

#### DIVISION BOUVREUIL.

#### (331) Le Bouvreuil GRIS;

Ce petit Bouvreuil qui n'a guères plus de A Pouces dans sa longeur totale, à le Bec épais et noir, tout le Plumage composé de diverses teintes de gris, plus soncé sur les parties supérieures et blanchatres en dessous, depuis la troisième jusqu'a la septième des grandes pennes Añaires, une tache blanche sur [les barbes extérieures, les grandes couvertures frangées de gris clair.

#### DIVISION ANGROYAN.

La Nature qui ne s'arrête pas aux classifications méthodiques, et qui dans sa marche toujours admirable, embrasse toute l'étendue des êtres, sans leur sixer les bornes etroites que nos savans à systèmes, se mettent a tache de lui assigner, cette nature qui par une conformation sublime lie toutes les espèces même les plus eloignées de climats, nous offre de nouveau dans ce genre d'Oiseaux, une preuve irrévocable contre tous nos systèmes, chaque jour, chaque nouvelle decouverte nous en démontre la futilité.

En effet ce genre d'Oiseaux que l'on a nommé ANGROYAN, tient à la fois a plusiers espèces, il participe du Troupiale, du Gros-bec, du Tangara, et du Guèpier, l'Oiseau avec lequel il à le plus d'analogie, quand à la conformation du Bec, est le Malimbe, découvert par Mr. PERRIN de Bourdeaux, et décrit par sonnini; je le place donc à la suite des Loxies, en indiquant les caractères qui m'ont paru distinguer cette nouvelle espèce, dont trois divers individus ont été trouvés dans les parages de l'Océan pacisique.

P 4

Bec alongé et effilé vers la pointe, Mandibule supérieure tant soit peu arquée, base s'avançant sur le Crane laissant l'espace entre les narines à nu, pointe du Bec echancrée, Mandibule insérieure s'adaptant dans l'echancrure supérieure, base du Bec environné de poils, Doigt extérieur uni jusqu'à la première phalange au Doigt du milieu, Ailes longues, Queue tant soit peu sourchue, les deux plumes du milieu depassent les Latérales de deux ou de trois lignes.

# (166) L'ANGROYAN GRIS.

Longueur totale  $8\frac{1}{2}$  Pouces, Bec r Pouce, Gris bleu depuis sa base, jusqu'au trois quarts de sa longueur, noir vers la pointe; de l'orifice de chaque Narine, part une raije noire qui s'élargit vers l'Oeil et l'enchasse, Tête, Cou et Poitrine gris de perle, Manteau et couvertures des Ailes d'un gris soncé, Queue noire terminée de blanc sur toutes les pennes Latérales, celles du milieu sont entiérement noires, les Ailes pliées, atteignent à un demi Pouce près l'extrémité de la Queue, Pieds noirs, Iris jaune.

# (1009) L'ANGROYAN LONGIBANDE.

Taille 7 Pouces, Bec 6 lignes, bleu foncé à sa base, noire vers la Pointe; tout le Plumage supérieur brun foncé, tant soit peu plus clair, sur le Cou et la Poitrine, Ailes noires, la seconde, troissème et quatrième des grandes pennes Ailaires ont les Barbes extérieures bla: ches,

fur toute leur longeur, ce qui produit une banda longitudinale fur chaque Aile, la Queue d'un beau noir, est tant soit peu plus fourchue que dans l'espèce precedente, toutes les pennes Laterales, sont blanches vers la pointe, celles du milieu ainsi que la Barbe extérieure des pennes de chaque coté, sont entièrement noires, Pieds et Ongles de cette couleur.

#### DIVISION REPUBLICAIN.

Les Oiseaux' qui composent cette division, sont ceux, qui quoique appartenants à la grande tribut des Loxies en dissèrent néanmoins par quelques legères modifications physiques, ainsi que par l'instinct tout particulier qu'ils ont de se construire une demeure ou nid commun à un grand nombre d'individus. Les voyageurs PATERSON (\*) et LE VAILLANT (†) en ont fait mention, ce dernier se reserve de nous en communiquer les détails plus circonstanciés dans son Ornithologie Africaine.

(313) LE REPUBLICAIN NAMAQUOI.

Longueur 5 Pouces, Bec et Pieds couleur de corne, Plumage en general d'un gris terreux, plus

<sup>(\*)</sup> PATERSON, travels in Africa pl.

<sup>(†)</sup> LE VAILLANT, second voyage en Afrique, Vol. 2. pag., 15 et 322, Edition in 4to.

plus foncé sur les parties supérieures et rembruni sur les plumes Laterales de la Queue, sur les Flancs quelques taches noires, l'espace entre la base supérieur et l'Oeil noir, cette couleur eutoure aussi la Mandibule insérieure et se dirige sur la Gorge qu'elle recouvre en partie.

(702) LE REPUBLICAIN à CAPUCHON ECAR-LATE. (Male)

Longueur Totale 6½ Pouces, Bec et Pieds noirs, Ailes longues, atteignantes aux deux tiers de la longueur de la Queue, un Capuchon d'un beau rouge ecarlate, recouvre toute la Tête, ainsi que la Nuque, et se dirige tant soit peu sur les cotés du Cou, le reste du Plumage d'un noir uniforme et luissant. — La Femelle est entièrement d'un noir rembruni.

(754) LE REPUBLICAIN à VENTRE ET GOR-GE JAUNES.

Longueur  $5\frac{1}{2}$  Pouces, Bec noir, Pieds bruns, Ailes plus courtes que dans l'espèce précédente, Queue arrondie, haut de la Tête tirant sur le noir verdatre, cette couleur se nuance en olive soncé sur la Nuque, et s'eclaireit sur les autres parties supérieures; de la base du Bec supérieur part une large baude jaune, qui passe au dessus des Yeux, et aboutit sur les cotés de la Tête, un beau jaune de citron, couvre en general toutes les parties insérieures de cet Oiseau.

## C 235 )

#### GENRE BRUANT.

#### (294) LE BRUANT à COLLIER.

Cette espèce de Bruant à un tant soit peu plus de 4 Pouces, depuis le bout du Beç à l'extremité de la Queue, celle-ci est courte, de même que les Ailes qui atteignent au quart de fa longueur, Bec noir, Mandibule inférieure blanche à sa base, Pieds jaunes, Ongles brunes; les principales couleurs de ce bel et rare Oiseau, sont le jaune vif, et le noir velouté, la première, couleur est repandue sur la Tête, le Cou, le Dos, la Poitrine , les Flancs et les couvertures de la Queue; la Gorge jusque dessous les Yeux est d'un beau noir, vers le mileu du Cou un collier très etroit, qui aboutit aux angles, ce Collier ainsi que le Ventre, est du même noir velouté, Ailes et Queue brun bistre, toutes les couvertures des premières, frangeés de jaune d'ocre foncé, les grandes pennes Ailaires et Caudales seulement bordées de cette couleur.

#### GENRE TANGARA.

## (307) L'ARCHEVÈQUE à EPAULETTES BLEU-ES.

Beaucoup de Ressemblance dans les couleurs avec le Bluet, ou Tangara Evêque, Buffon pl. 178. Taille moins grande, Ailes, et Queue plus courtes, Plumage généralement d'un bleu plus décidé, avec des tintes d'aigue-marin cette couleur borde aussi toutés les plumes Ailaires et Cau-

dales; Epaulettes et poignet de l'Aile, d'un beau bleu d'azur foncé.

(798) LE TANGARA NÉGRIN. (Male et Femelle)

Ce Tangara quoique aijant la même longeur que le Tangara Nègre, est cependant beaucoup plus petit de corps, et diffère totalement de cet Oiseau par le Bec, qui quoique fortement échancré, est plus menue, la Queue de beaucoup plus lougue et les Ailes plus courtes, ceux-ci ne dépassent guère le Croupion; L'on pourroit lui donner la denomination d'unicolor, tout son Plumage etant d'un noir uniforme,

La Femelle à les Ailes et la Queue noires, le reste des parties supérieures, ainsi que les bordures des couvertures Ailaires brunes, Cou et Ventre blanc sale, mélangé de brun clair sur les Flancs, et tacheté longitudinalement sur la Poitrine et le haut du Ventre, Bec et Pieds bruns,

Ce beau Tangara long de 7 Pouces, se rapproche par la conformation du Bec au Tangara du Mississipe, siguré par Buffon pl. 741,
il en à la taille et les formes à l'exeption de
ses Ailes, qui sont un peu plus courtes, la
Tête, le Cou, le Dos, les couvertures des
Ailes et la Queue sont d'un beau bleu d'azur,
à ressets verdatres sur le Dos, pur sur les autres
parties, brillant sur le devant du Cou et sur la
Poitrine, ou cette couleur est terminée en forme
de demi cercle, de chaque Flanc part une bande, qui paroit prendre la direction d'un ceintu-

ton, mais dont les extrémités ne se touchent point, tout le reste des parties inférieures du corps sont d'un jaune citron eclatant, grandes plumes des Ailes noires, les Pieds sont d'un jaune d'ocre clair.

(994) LE TANGARA ISABELLE. (Male et Femelle)

> Longueur totale 6 Pouces, Queue 22 Pouces. Ailes depassant tant soit peu le Croupion; Cette espèce se rapproche le plus dans sa conformation au Tangara noir, figuré par BUFPON pl. 179. fig. 2. - Le Male à la Tête et la Nuque gris foncé, sur le milieu du Crane, une petite couronne de verd d'olive, cette couleur entoure aussi les Yeux et forme la nuance principale du Plumage supérieur, toutes les parties inférieures sont de couleur isabelle, tirant au roux clair sur les couvertures du dessous de la Queue, Bec et Pieds couleur de corne. -La Femelle à tout le Plumage supérieur roux de rouille, sans couronne ni cercle à l'entour des Yeux, plumage inférieur comme le Male. l'Iris dans cette espèce est de couleur brune orangée.

#### GENRE MOINEAU.

(202) LE CAPI à CROUPION ROUGE. (\*)

Lon-

<sup>(\*)</sup> LE VAILLANT à trouvé cette espèce dans le Cassirerie.

Longueur totale 4 Pouces, Ailes courtes, Queue ronde, Bec supérieur noir, inférieur, blanc, Tête et Nuque gris foncé, Manteau et Couvertures verd d'olive, Croupion et couvertures supérieures de la Queue rouge sale, parties inférieures blanches, ondées de gris clair, Queue et Gorge noires.

## (601) LE CAPI À FRAISE JAUNE.

Ce charmant Oiseau, encore fort rare dans les collections, est tant soit peu plus petit que le précédent, une cravatte ou fraise formée par de longues plumes d'un beau jaune, prend naissance derrière les Oreilles, et tombe elegamment sur le haut de la Poitrine, en recouvrant une partie de cette dernière qui est noire, cette fraise est encore relevée, par le noir de toute la Face et de la Gorge, une raijé jaune passe sur les Yeux et vient aboutir aux extrémités de la Fraise, le haut de la Tête est gris soncé, le Manteau, les Ailes et la Queue sont verd olive, le Ventre est gris, les Pieds sont blancs.

## (796) LE CAPI à GORGE ET SOURCILS ORANGÉS (Male et Femelle)

Longueur totale 4½ Pouces. — Le Male à le Plumage supérieur, entiérement d'un beau verd d'olive, le Ventre gris verdoijant; immediatement au dessous de chaque angle de la Mandibule inférieure, parroit être attaché un petit rabat de couleur orange eclatant, qui est encore

relevé par le noir de toute la Poitrine et des cotés du Cou, une bande d'un orange vif, passe au dessus des Yeux en forme de sourcils, et aboutit à la Mandibule supérieure; une autre petite tache de la même couleur au dessous des Yeux, sert encore à embélir cette rare espèce. — La Femelle dont les couleurs se réduisent principalement au verd sale sur le Dos et les Ailes, et au noir unisorme sur le Cou, la Poitrine et une partie du Ventre, n'a rien en partage des belles couleurs du Male.

## (211) Le BENGALI NOIR à EPAULETTES BLANCHES.

Le nom donné à cet Oiseau, indique déja assez ses couleurs, le noir à ressets bleus est entiérement repandu sur tout le corps, de petites epaulettes blanches, sur le haut de l'Aile et les couvertures du dessous de la même couleur, sont reconnoitre cette espèce, dont la longeur totale est de 4 Pouces.

Mr. VEILLOT vient de figurer cette nouvelle espèce de Bengali dans son ouvrage des OISEAUX CHANTEURS pl. 38, il lui donne le nom de Jacarini, et cite comme synonimie, le Tanager Jacarini de LATHAM Synopsis v. 3. p. 238. No 34. Si Mr. VIEILLOT eut consulté le texte de cet Auteur, il n'auroit certainement point commis une pareille erreur. Le veritable Jacarini aiiant

aijant la taille du Bouvreuil et la Queue fourschue; tandis, que le Bengali à Epaulettes blanches, à la taille de l'Amandava et la Queue très arondie. Ces seule caractères suffiront pour justifier cette disgression.

#### GENRE GOBE-MOUCHES.

- Longueur totale 8 Pouces, Queue ronde aijant seule 4 Pouces, 2 lignes, Ailes pliées atteignant à la moitié de la Queue, Bec noir, long d'apeu près un Pouce, base entourée de poils très serrés, tout le Plumage supérieur generalement noir, à l'exception des Ailes qui sont brunes, Ventre et Abdomen blancs, une raije de la même couleur passe au dessus des Yeux en forme de sourcils.
- (969) L'echenilleur long-bec.

Taille entre l'Echenilleur gris, et l'Echenilleur jaune, décrits par LE VAILLANT dans son Ornithologie d'Afrique pl. 162. et 164; — Longueur totale II Pouces, Bec 1½ Pouce, Queue 4½ Pouces, arrondie et large à sa base, Croupion très emplumé, à baguet tes piquantes, parties supérieures y compris les Ailes et la Queue d'un brun bistre, cette dernière à les Barbes intérieures de chaque plume raijés à distances d'un brun plus son-

ce, pennes Ailaires bordées, et convertures terminées de jaune d'ocre, les autres plumes du Cou et du Dos terminées d'un croissant noir, Gorge et Poitrine couleur d'ocre clair, sur chaque plume un croissant noir, Ventre blanc, aijant aussi toutes les plumes terminées d'un large croissant noir, — (cet Oiseau m'étant parvenu après que les Echenilleurs d'Afrique avoient parus, mon ami LE VAILLANT n'a pu le placer à leur suite.)

## · (1002) LE GOBE MOUCHES BICOLOR.

Deux couleurs principales distinguent cet Oiseau, le noir plus ou moins à ressets verdatres sur la Tête, le Cou postérieur, et le haut du Dos, le noir pur sur les Ailes et la Queue, toutes les parties inférieures d'un blanc pur, de cette couleur sur le haut de l'Aile et sur les bords de ses Couvertures; Dos et Croupion d'un blanc grisatre, les deux plumes extérieures de chaque coté de la Queue terminés de blanc, Bec et Pieds noir.

## . (1010) LE GOBE-MOUCHES MILITAIRE.

Longueur 6 Pouces, Queue seule moitié de la longueur totale, Ailes 3½ Pouces, Bec très long, fortement echancré, large à sa base et entouré de poils longs et roides, origine des deux Mandibules bleues, d'un verdatre clair à leur pointe, de dessus les Narines et immediatement sur le Front s'élèvent de petites plumes veloutées d'un noir eclatant qui entourent aussi la Man-

dibule inférieure, tout le reste du Plumage supérieur ainsi que le devant du Cou gris soncé, Ventre, Cuisses et Abdomen d'un roux etincelant.

## (719) LE TYRANAIN.

Ce petit Tyran long seulement de 3½ Pouces, est le vrai Pygmé de son espèce, il à le
haut de la Tête ornée d'une huppe d'un jaune
citron, Con, Dos et Queue verds d'olive, Ailes noires, Convertures bordées de jaune clair,
Gorge grise, Poitrine d'un gris verdoijant,
Ventre jaune tendre, Pieds et Bec noirs, ce dernier est entouré de poils à sa base.

#### GENRE ALOUETTE.

## (872) L'ALOUETTE STRIÉE.

Taille de l'Alouette vulgaire; Bec brun, Pieds noirs, Ongle postérieure trois fois plus longue que les autres et fortement arqué, Queue arrondie, haut de la Tête gris terreux, toutes les autres parties d'une belle couleur de terre d'ombre clair, grandes Couvertures intermédiaires, ainfi q'une partie des pennes Ailaires brun foncé à leur origine, jaune d'ocre au milieu, de la première couleur vers la pointe et terminées d'ombre, ce qui fait que l'Oiseau en déploijant les Ailes, laisse appercevoir, quatre larges bandes transversales sur la partie intermédiaire de l'Aile, dont on ne remarque aucune trace quand elles sont dans l'état de

repos, la Queue etalée laisse aussi appercevoir vers sa pointe un large cercle; les deux
plumes intermédiaires n'aijant qu'une petite tache de forme ovale; ce cercle paraît interrompu et n'est pas visible quand la Queue est
pliée, la Gorge qui est blanche à les plumes inférieures bordées de roux, la Poitrine est grile, les plumes du Ventre et de l'Abdomen ont
une large raije blanche sur leur milieu le long
tie la Baguette, cette raije est entourée de brun
foncé et chaque plume est frangée de gris
roussatre, Couvertures inférieures de la Queue
raijés a distances de brun foncé;

#### GENRE BEC-FIN.

## (8co) Le figuier gris-Albin.

Longueur totale 3 Pouces 2 lignes, Bec 4 lignes, un peu arqué, effilé à la pointe, de couleur brune, tout le plumage supérieur est d'un beau gris, Gorge et Ventre d'un blanc pur, grisonnant sur la Poitrine, Flancs d'un gris roussatre. — Cette espèce doit être rangée à la suite du Figuier Crombec d'Afrique, décrit par Mr. LE VAILLANT Hist. Nat. des Ois. d'Afrique Tom. 3. pl. 135.

(996) Le figuier cercle-en-queue.

Longueur 4 Pouces, Bec 4 lignes, Mandibule supérieure brune, inférieure jaune, Tarses longs d'un Pouce, cette partie ainsi que les Doigts jaune d'ocre, Ongles brunes; la Tête et le haut du Dos, font tachetés de brun et de roux, Ailes de la première couleur, grandes Couvertures de celles ci entièrement entourées de blanc, pennes et petites Couvertures bordées extérieurement de roux, cette couleur regne aussi sur le Croupion, Queue courte arrondie, extrémités de toutes les Pennes d'un blanc pur, parties inférieures blanc sale, quelques taches brunes sont irregulièrement semées sur la Poitrine et le Ventre.

## (997) LE FIGUIER LANCIFER.

Longueur totale 4½ Pouces, Queue non etagée, plus longue que dans l'espèce précédente, Tarse beaucoup plus court, cette partie ainsi que les Doigts et le Bec bruns, les plumes qui recouvrent la Tête allongées, de couleur bistres, chaqu'une d'elles à une tache plus claire vers le bout, du roux eclatant passe en forme de sourcils au dessus des Yeux, tout le Dos est verd olive, maculé et tacheté de brun, Gorge, Cou, Poitrine et Ventre d'un blanc jaunissant, sur l'extrémité de chaque Plume de ces parties est une tache en forme de fer de lance, dont la pointe se dirige le long de la Baguette.

#### GENRE MANAKIN.

## .(46) LE MANAKIN COTIMANAK.

Longueur totale 6 Pouces 1 ligne, Bec et Pieds conformés comme ceux du . Cotimanak gris à calotte noire, BUFFON pl. enl. 687. fig. 1. - La base du Bec est entouré de petite poils, la Tête couverte de plumes allongées en huppe pendante, de couleur noire à reflets de bleu foncé, Cou, haut du Dos. Ailes et Queue d'un noir terne, petites couvertures des Ailes terminées de blanc, moiennes et grandes bordées de cette couleur, la Queue qui est arrondie à les pennes latérales terminées de blanc, les extérieures ont une grande espace de cette couleur, diminuant graduellement sur les Plumes qui se rapprochent du centre, intermédiaires entièrement noires, Croupion et parties inférieures gris de plomb. plus obscur sous la Gorge et le devant du Cou.

#### GENRE HIRONDELLE.

#### (986) L'HIRONDELLE VERTE.

Taille de notre *Hirondelle* de cheminée, longueur 6 Pouces, Bec très large à fa base et court, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche à son origine, base de tout le Bec ainsi que le tour des Yeux et la Gorge cou-

 $Q_3$ 

vertes de petites plumes très serrées, noires à leur origine, et terminées de blanc sale, Tête cotés du Cou, Dos et Croupion, d'un beau verd de Perroquet, toutes les plumes Ailaires et Caudales noires, bordées du même verd, grandes et petites Couvertures des premières largement frangées de cette couleur, devant du Cou, Poitrine et Flancs d'un verd eclatant raijé foiblement de verd plus clair, milieu du Ventre, Abdomen et couvertures inférieures de la Queue d'un jaune verdoijant; les Pieds dont le Doigt intermédiaire est le plus long, sont bruns, Queue tant soit peu sourchue,

## GENRE ENGOULEVENT.

Longueur totale 14 Ponces, longueur de l'ouverture du Bec 2 Pouces, largeur à sa basé 1½ Pouce, Mandibule supérieure entièrement recouverte de plumes, jusque par dessus
l'orifice des Narines qui se trouvent placées vers
la pointe, cette partie est surmontée d'une
arête fortement recourbée; Queue longue et
quarrée, Ailes atteignantes à un Pouce près
son extremité, Tête large et aplatie, Plumage
generalement brun noiratre, maculé sur la Tête
et le Dos de bron plus clair melangé de roux,
du blanc sale sur les grandes convertures des
Ailes, et de petites taches de cette couleur

fur le Croupion ainsi que sur les Barbes extérieures des Ailes, Queue raijée irregulièrement de brun soncé et de blanc sale, et maculée de brun, sur la Poitrine et le Cou quelques grandes taches noires semées irregulièrement, toutes les plumes du Ventre ont une raije noire le long de la Baguette.

## (709) L'engoulevent pygmé.

Longueur totale 7 Pouces, les Ailes longues de 5 Pouces 2 lignes depassent tant soit peu l'extrémitée de la Queue, dont les plumes sont d'égale longeur, Bec menu, ouverture longue d'un Pouce, base entourée de long poils roides qui atteignent jusqu'à son extremité, Plumage sur tout le corps d'un brun foncé noiratre, taché irregulièrement sur la Tête et le Dos de roux, les petites couvertures Ailaires ont vers leur extremité deux taches rondes d'un roux ardent, Queue foiblement raijée de gris terreux, sous la Gorge une espèce de zône, tout le reste des parties inférieures raijées transversalement de roux sur fond brun noiratre, Tarses garnis de plumes jusqu'a l'origine des Doigts qui sont jaunes, Plris est de cette dernière couleur.

#### GENRE PIGEON.

(750) LE RAMIER BLEU 2 NUQUE ECAIL-LÉE.

> Taille tant foit peu moins forte que celle du Ramier d'Europe. , longueur totale 142 Pouces, Ailes aboutissant à la moitié de la longueur des pennes caudales, les Yeux placés dans une espace nue d'un rouge carmin, Plumage des parties supérieures, du Ventre, et de l'Abdomen, d'un bleu plombé unisorme, s'obscurcissant sur les grandes pennes des Ailes. et de la Queue, haut de la Tête, partie antérieure du Cou et Poitrine, à reslets rouges, Cou postérieur, ainsi qu'une partie du Manteau changeant en restets de rouge carmin, et de pourpre eclatant, toutes les plumes de ces parties bordées de rouge mordoré, les Pieds ainsi que la peau qui recouvre les Narines d'un rouge fanguin, Bec et Ongles jaunes, Iris rouge.

(659) LE RAMIER ECLATANT.

Longueur totale à peu près 19 Pouces, Bec 1 Pouce et demi, Queue longue, parfaitement quarrée, pennes qui la composent au nombre de huit, chaqu'une d'elles large d'un Pouce, six lignes; la Queue est en dessus d'un brun bistre à ressets de verd et de pourpre soncé, extremité de toutes les Pennes couleur d'ocre, en dessous d'un gris sale, changeant legerement en verd clair, vers son extremité une large bande d'un brun bistre; les Ailes qui aboutisfent à la moitié de la longueur de la Queue ont
toutes les grandes pennes de couleur gris de
lin foncé à reflets de verd eclatant, grandes
Couvertures gris de lin clair verdoijant; moijennes pennes et plumes du Poignet vertes dorées,
petites Couvertures mordorées à reflets de verd
doré. Tête, Cou et Poirrine verts à reflets metalliques, Ventre, Cuisses et Abdomen d'un
blanc pur, Pieds et Bec rouges, Ongles brunes.

## (526) LE RAMIER ECAILLÉ, OU LE RAMME-RON.

Taille du Ramier d'Europe, longueur totale apeu près 15 Pouces, la couleur dominante de ce Ramier est le bleu plombé, plus ou moins foncé, et le rouge vineux, cette dernière couleur fe remarque sur le Front, sur le haut du Dos, et sur toutes les parties inférieures, plus claire sur le Cou et la Poitrine, ou elle borde toutes les plumes, haut de la Tête et Occiput gris bleuatre; l'on remarqué sur le haut des Ailes quelques taches blanches arrondies, des taches triangulaires de la même couleur sont semées irregulièrement sur le Ventre, une partie du Tasse est emplumée, le reste est nu d'un jaune clair, de même que les Doigts et les Ongles, Bec jaune foncé.

(470) LE PIGEON à CEINTURON NOIR.

Longueur totale 13 Pouces, taille elancée,

O 5

Ailes courtes, Queue alongée, un camail d'un beau blanc jaunissant, couvre la Tête et le Cou, et se dirige le long de la Poitrine, ou cette couleur est agréablement coupée par un large ceinturon noir, dont les angles supérieures remontent sur le Manteau, haut du Dos d'un bleu noiratre changeant en ressets de verd soncé sur les Ailes et la partie supérieure de la Queue, toutes les pennes caudales sont terminées en dessus de gris à restets verts, en dessous de blanc pur, Croupion verdoijant, Ventre, Cuisses et Abdomen d'un jaune verdatre, Tarses garnis de plumes jusques vers l'origine des Doigts, lesquels de même que le Bec sont jaunes, Ongles noires.

## (776) Le pigeon à Front-nu.

Longueur totale 11 Pouces, Queue courte, Ailes ne depassant guère le Croupion, Bec six lignes, Front entièrement denué de plumes, couvert d'une Peau orangée, quelle s'étend jusque sur les trois quarts des deux Mandibules, extremités de celle-ci argentées, region des Yeux nue, Plumage de presque toutes les parties inférieures de la Tête et du Cou, d'un beau verd tant soit peu jaunissant, Dos, couvertures des Ailes et Croupion verd mat, epaulettes violettes, pennes Ailaires noires, ainsi que plusieurs des couvertures adherantes, ces dernières bordées de jaune clair, Queue grise en desfus, noire en dessous sur les trois quarts de

sa longueur, le reste gris, le Farse empluine)
jusqu'à la moitié de sa longueur, jaune ainsi
que les Cuisses, partie nue de la Jambe et
Doigrs d'un jaune rougeatre, Ongles brunes.

## (956) LA TOURTERELLE VELOUTÉE:

Longueur totale 9 Pouces et demi, Queue 3 Pouces, très large, Ailes 6 Pouces, depassant tant soit peu l'extrémité des pennes Caudales, les grandes couvertures atteignent à peu près l'extrémité des grandes pennes Ailaires, les pennes extérieures de ces dernières les plus courtes, toutes font courbées en dedans -de facon que l'Aile qui est très large décrit une parabôle, Bec long de six lignes couleur de corne; tout le Plumage supérieur ainsi que le Cou, la Poitrine et les Flancs, sont d'un beau verd yelouté changeant aux diverses inflections de la lumière, de la Mandibule inférieure se prolonge fur la Gorge et fur une partie du Cou une bande longitudinale d'un blanc pur, un croissant noir ceint le bas de la Poitrine, le milieu du Ventre est jaune verdatre, les Cuisses et les Plumes qui revêtent le Tarse sont blancs, enfin l'Abdomen ainsi que les Couvertures du dessous de la Queue font d'un beau jaune d'or, celle-ci, de même que les Couvertures supérieures atteignent à peu près l'extremité des pennes caudales, les Doigts et les Ongles brunes, le tour des Yeux rouge vif.

(978) LA TOURTERELLE à CALOTTE VIQ-

Longueur totale o Pouces deux lignes, taille tant soit peu plus elancée que celle de la Tourterelle Kurukuru, toute la Tête jusques derrière l'Occiput couverte d'une ealotte d'un violet foncé, Gorge et Poitrine grises, tachetées irregulièrement de pourpre clair, Nuque rougeatre, Manteau, Dos et couvertures des Ailes d'un verd foncé, chaque plume de ces dernières à une grande tache ovale de bleu très foncé vers son extrémité. Grandes pennes Ailaires noires bordées de blanc jaunatre, quelques unes des petites et grandes Couvertures de celle-ci bordées de jaune foncé, Barbes extérieures de la Queue d'un verd foncé, intérieures, noires, extrémité de toutes les pennes caudales blanches sur leur Barbes intérieures et d'un gris verdoijant fur les Barbes extérieures, Ventre, Cuisses et couvertures du dessous de la Queue blanches. Pieds et Ongles brunes, Bec couleur de corne.

#### (658) Le pigeon cuivreux.

Taille de notre Bisset, longueur totale 13 Pouces 2 lignes, Bec 1 Pouce, fortement courbé vers la pointe, Queue longue et quarée, Tête, Cou, Poitrine et Ventre d'un gris plus ou moins nuancée, changeant en pourpre clair, à restets metalliques sur la Poitrine et le Cou, sous les Yeux de même que sur la Gorge une grande tache jaune d'ocre, haut du Dos et petites Couvertures des Ailes d'un beau pourpre soncé et luisant, grandes Couvertures, Croupion, Queue, ainsi que les Couvertures inférieures de cette dernière d'un noire changeant en violet soncé, grandes pennes Ailaires d'un roux rougeatre ardent, plumes sous-Ailaires et Cuisses de cette couleur, Tarses et Doigts rouge sanguin, Ongles brunes.

(471) LA TOURTERELLE VERTE à PLAS-TRON ROUGE.

Longueur totale, 8½ Pouces, Queue etagée, les Ailes courtes ne depassant guères le Croupion, Bec jaune, Pieds rouges, le Front, les Tempes ainsi qu'une partie des cotés de la Gorge font d'un rouge cramoisi vif, la Gorge en devant noire, le reste du Cou antérieur et toutes les parties inférieures sont blanches, sur la Poitrine un grand plastron rouge rosé, de forme ovale, les parties supérieures du Plumage y compris les Ailes et la Queue, sont d'un beau verd olivacé.

(325) LA TOURTERELLE à VENTRE BLANC.

Longueur totale 9½ Pouces, plus grande que
la Tourterelle du Sénégal, avec la quelle elle à
dureste plusieurs traits de ressemblance, le
blanc pur domine sur toutes les parties insérieures, sur le Front, ainsi que derrière les Yeux,
le bistre olivacé sur la Tête, le Cou, le Dos

et les couvertures Allaires, ces dernières ont quelques grandes taches vertes dorces, du roux sur les plumes sous - Allaires ainsi que sur les grandes pennes, Queue ronde, Pennes intermédiaires brunes, les trois Laterales de chaque côté sont barrées de noir vers leur extrémité

Longueur stotale 10 Pouces 6 lignes, Bec et Pieds bruns, l'Occiput, le Cou, le haut du Dos, ainsi que toutes les parties insérieures de cet Oiseau sont d'un brun roux, changeant en verd doré et en pourpre rougéatre, Gorge et Front blancs, Ailes; Dos, et Croupion brun olivacé, Queue tant soit peu arrondie, les deux pennes intermédiaires brunes, les autres noires sur les deux tiers de leur longueur, grises soncées sur le reste.

(570) LE PIGEON RAMIER AR DOISÉ.

Cet Oiseau modelle sur les formes de notre Ramier d'Europe, à tout le Plumage supérieur, le Cou, ainsi qu'une espèce de ceinturon interrompu, d'un beau bleu d'ardoise tant soit peu tirant au noir sur les grandes pennes des Ailes, la Gorge et le Front blancs, une espèce de haussecol part des deux cotés du Cou et dessent sur la Poitrine, Ventre blanc marqué de grandes taches noires, toutes les plumes des Flancs, ont de grandes taches noires en forme de ser de lance et sont entourées

de blanc pur, la Queue qui est un peu arrondie, à quelques plumes latérales terminées de blanc, les Pieds sont rouges ainsi que la peau nue qui recouvre les Narines.

#### GENRE HERON.

## (993) LE HERON BULARAGNAM

Longueur depuis le bout du Bec aux Ongles. 3 Pieds, 22 Pouces, Vol 3 Pieds 7 Pouces, longueur du Bec, 4 Pouces 2 lignes, Mandibule supérieure noire, inférieure blanche en dessous, Tête, ainsi que tout le Cou blanc, legèrement ondé de pourpre clair, sur le devant quelques grandes taches noires semées irregulièrement, sur les angles de la Poitrine un faisceau de plumes d'un brun pourpré. Scapulaires longues, et de la même couleur, Manteau, Oueue et Ailes d'un bleu d'ardoise soncé, cette couleur change en reslets verdatres sur les couvertures Ailaires, Poignet et bord de l'Aile blanc pur, les plumes qui reconvrent le Ventre et toutes les autres parties inférieures sont alongées, blanches fur toute leur longueur et frangées de gris de lin pourpré. Pieds et Ongles noires.

(763) LE PETIT BLONJOIS MANTEAU NOIR. Ce petit *Blonjois*, n'a pas plus que 10 Pouces, depuis le Bec jusqu'a l'extrémité de la Queue, sa hauteur est de 7 Pouces 5 lignes, le Bec long de 2 Pouces 3 lignes, l'arête de sa partie supérieure noire, cotés ainsi que la Mandibule inférieure blanche, une Calotte d'un noir luisant revêt la Tête, et se prolonge sur une partie de la Nuque, cette couleur revêt aussi tout le Dos ainsi que sa Queue, et recouvre le haut des Ailes en forme de Manteau, grandes pennes Ailaires d'un gris soncé, Epaulettes et extrémités des grandes Couvertures d'un brun maron, milieu de l'Aile d'un brun ocracé, parties inférieures du Plumage blanc sale mélangé d'ocre, Pieds couleur d'ocre soncé, Ongles brunes.

# (352) LE CRABIER NOIR à COU TACHETÉ (Male et Femelle)

Longueur dépuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue 21 Pouces, jusques à l'extrémité des Ongles 25½ Pouces, Bec 3 Pouces 6 lignes. - Le Male de cette espèce à tout le Manteau, les Ailes et la Queue d'un noir bleuatre à reflets verdatres, le Ventre ainsi que les autres parties inférieures d'un noir grisatre, la Tête ainsi que les Yeux sont engagés dans une espèce de Calotte noire qui se prolonge sur toute la partie postérieure du Cou. la Gorge est d'un blanc pur à taches triangulaires couleur de rouille, une large bande jaune prend naissance au dessous des Oreilles. et s'étend jusques aux trois quarts de la longeur du Cou, le reste du Plumage qui recouvre cette partie est longitudinalement tacheté d blanc, de roux et de noir, la Poitrine est egaijée de blanc sur fond noir.

La Femelle à toutes ces couleurs moins prononcées et moins vives elle n'a point de noir dans son Plumage, ce qui est de cette couleur dans le Male, est brun soncé dans celle-ci, le Ventre et l'Abdomen sont gris, et les Ailes ainsi que la Queue d'un gris noiratre; le Male et la Femelle ont les Pieds et le Bec bruns.

### GENRE IBIS (\*).

Longueur totale 2 Pieds 4 Pouces, longueur du Bec, 4 Pouces, 5 lignes, Pieds courts, Queue quarrée, les Ailes atteignent son extrémité, le Bec est peu arqué, plus court que ne l'ont d'ordinaire ces Oiseaux, large à sa base, Mandibule supérieure surmontée d'une arête, et bordée dans toute sa longueur d'une raijnure prosonde, Yeux entourés d'une Peau nue qui se dirige sur les cotés du Bec, cette Peau et l'arête de la Mandibule supérieure sont d'un rouge sanguin, un gris unisorme revêt la Tête, le Cou, la Poitrine et le Ventre, toutes les plumes de ces parties sont bordées legèrement de

<sup>. (\*)</sup> Decouvert par Mr. F. LE VAILLANT.

de gris moins foncé, une etroite raije blanche part de dessous l'orifice des Oreilles et se prolonge sur une partie du Cou jusque proche de la Mandibule inférieure du Bec, Dos et grandes couvertures des Ailes gris brun bronzé, Poignet, ainsi que toutes les petites Couvertures d'un verd lustré changeant en violet clair, Barbes extérieures des moijennes Couvertures, d'une belle conleur de cuivre bronzé, Cronpson et Couvertures inférieures de la Queue d'un gris à ressets verdoijant, grandes pennes Ailaires et Caudales, d'un beau bieu changeant en violet soncé, partie nue du naut de la Jambe brune, Tarses et Doigts rouges.

#### GENRE COURLIS.

## (923) LB COCORLIS.

Longueur 9 Pouces, hauteur depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête 6 Pouces, Ailes 5 Pouces depassant l'extrémité de la Queue, Bec 1 Pouce 6 lignes, foiblement arqué, entièrement noir ainsi que les Pieds et les Ongles, haut de la Tête, Cou antérieur et Poitrine gris clair, lavé et foiblement ondé de gris plus soncé, Manteau et couvertures Ailaires d'un gris soncé, Queue de cette couleur, chaque penne est entourée de blanc, grandes pennes Ailaires noiratres à Baguettes blanches, Gorge, Ventre, Abdomen, Cuisses et Couvertures du dessous et du dessous de la Queue d'un blanc pur-

#### GENRE BECASSEAU.

## (and) La maubache à pointine rousse.

Longueur totale 10 Pouces 2 lignes, Bec t Pouce 2 lignes, Queue quarrée, les Ailes pliées atteignent à son extrémité, Plumage de la Têre et du Cou postérieur d'un gris clair raijé et moucheté longitudinalement de gris brun. Manteau et Ailes gris foncé, sur quelques plumes du haut du Dos et des couvertures Ailaires des taches noires et rousses, ces dernières de forme arrondie, plumes du Croupion et couvertures du dessus de la Queue blanchatres, raijées transversalement de noiratres. Queue grise, grandes pennes des Ailes noiratres. Baguettes de celles ci, de même que celles des Pennes caudales blanches, toutes les parties inférieures depuis la Gorge, jusqu'aux Cuisses d'un roux clair, Abdomen blanc, moucheté legèrement de noir, Bec, Pieds et Ongles noires.

#### DIVISION VANNEAU.

## (979) LE VANNEAU NAIN.

Cet Oiseau vrai Pigme de son Genre, n'a pas le Corps aussi gros qu'une Alouette, et est cependant presqu'aussi haut monté que le Vanneau d'Europe, dont il partage du reste tous les autres caractères; sa longueur depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue est de R 2 6# Pou-

6½ Pouces, et depuis le bout du Bec jusques aux Ongles 9½ Pouces, Bec 7 lignes, d'un jaune fauve depuis sa base jusques vers son extrémité qui est noire; du noir olivacé couvre la Tête, entoure les Yeux et se dirige le long de tout le Cou postérieur, Manteau, Ailes et dessus de la Queue d'un verd d'olive à reslets bronzés, Queue en dessous, Ventre et Cuisses d'un blanc sale, Cou et haut de la Poitrine blanc pur, un large ceinturon noir traverse la Poitrine dans sa partie inférieure et deux tousses d'un roux marron, couvrent les Flancs.

## (249) LE GRAND VANNEAU ARMÉ È LAM-BEAUX ROUGES.

Ce baeu Vanneau dont la hauteur est de 12 Pouces, mesuré depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête, se distingue de tous cescongénéres par deux lambeaux placés de chaque côté de la Tête, a la racine du Bec, ils s'élêvent en crête au dessus de sa base, se dirigent fur la paupière supérieure, et dessendent en forme de barbillons des deux cotés du Bec, ces lambeaux font longs 1 Pouce 2 lignes d'un cramoisi pur, la Tête, ainsi qu'une partie du Cou est noire, cette couleur regne aussi sur les grandes pennes Ailaires de même que sur les Cuisses et le bas Ventre, la Oueue qui est blanche depuis fon origine jusqu'a la moitié de sa longueur, est noire sur le reste, toutes les Plumes latérales font terminées de blanc, le reste du Plumage est d'un gris brun terreux, les Ailes sont armées de puissants eperons, la base du Bec est jaune, le reste est noir, les Pieds de beaucoup plus longs que ceux de notre *Vanneau* sont d'un jaune d'ocre, les Doigts sont d'un verd renbruni.

## (592) LE VANNEAU ECHASSIER.

Cette espèce est remarquable par la longueur de ses Pieds excessivement minces et grêles. ils ont 5 Pouces sans y comprendre les Doigts. qui sont très courts, celui de derrière est le moins long, les Ongles sont petites et effilées, le Bec long d'un Pouce 2 lignes est noir, le Front et la Gorge blancharres, la Tête et le Cou sont d'un gris foncé, le Manteau et le Dos vineux, grandes pennes des Ailes noires, les grandes Couvertures atteignent à peu près à l'extremité de celleci et recouvrent entièrement les moijennes, qui sont blanches, quelques unes de ces dernières ont une bande noire à leur Barbe extérieure. ce qui produit une espèce de zone sur toute la longueur de l'Aile, la Poitrine est d'un gris bleuatre, les Cuisses et le Ventre d'un blanc rougeatre, enfin la Queue à pennes d'egale longueur est d'un blanç pur,

## GENRE PLUVIER.

(230) Le pluvier à poitrine rousse.

Taille moins grande et plus suelte, que le Pluvier à Collier d'Europe, longueur depuis le Bec à l'extrêmité de la Queire 62 Pouces, hauteur depuis le plan des Pieds au fommet de la Tête 57 Pouces, les Ailes aboutissent à l'extrêmité de la Oueue, les Pieds munis seulement de trois Doigts sont noires, une large raije blanche part de la Mandibule supérieure du Bec, se dirige de chaque coté des Yeux et entoure la Tête, la Gorge et le bas Ventre sont blanchatres, haut de la Tére. Dos et convertures Ailaires d'un gris terreux, les dernières sont terminées de roux sale, grandes pennes des Ailes noires, l'extérieure de chaque côtés ont les Baguettes blanches, tout le bas du Cou, ainsi que la Poitrine sont d'un roux de rouille clair.

(229) LE PETIT PLUVIER à DOUBLE COL-LIER (\*).

> Taille plus forte qu'une Alonette, Queue longue tant soit peu arondie, les Ailes pliées atteignent environ a son extremité, Bec conformé comme celui de nôtre Pluvier, rouge de-

puis

<sup>(\*)</sup> Ce Pluvier et le précédent ont etés trouvés en Afrique par le Voijageur LE VAILLANT.

puis sa base juaqu'aux deux tiers de sa longueur. noir à la pointe, le Front est blanc, une raije de cette couleur passe au dessus de chaque Oeil et entoure la Tête en forme de couronne, le Cou est gris terminé sur le haut de la Poitrine par une cercle noir, au dessous de celui-ei un ceinturon blanc, dont les deux extremités remontent sur le Dos ou elles se terminent en pointé, ce ceinturon est suivi d'un second qui est noir, celui-ci ne fait que traverser la Poitrine et ne remonte pas en forme de collier, tout le Manteau ainsi que les pennes intermédiaires de la Queue, sont d'un brun verdoijant, les Pennes latérales sont blanches. et out une tache noire sur leur barbe intérieures. le Ventre et les parties inférieures sont d'un blanc pur, les Pieds munis des trois Doigts sont james. Ongles noires.

## GENRE COURE-VITE (\*).

(228) LE COURE-VITE à DOUBLE COLLIER.

Cette nouvelle espèce longue d'environ 10

Pouces, se distingue principalement par deux

colliers noirs, dont l'un fort etroit, termine la

partie inférieure du Cou, l'autre large d'un de-

mi

<sup>(\*)</sup> Mr. LE VAILLANT à trouvé cette rare Espèce de Cours-Vite, dans le pays des grand Namaquois.

mi Pouce traverse la Poitrine, tous les deux remontent sur le Dos, mais les deux extremités ne se touchent point, tout le Plumage du Cou est blanc roussatre tacheté longitudinalement de noir, le Dos, la Queue, les petites et grandes couvertures des Ailes sont d'un gris brun, toutes les plumes de ces parties ont une large bordure de blanc roussatre, moijennes Couvertures des Ailes rousses, grandes pennes noires, Couvertures du dessus de la Queue blanches, Ventre, Cuisses et Abdomen blanc roussatre, Pieds jaunes, le Doigt du milieu qui est le plus long de tous n'a guère plus de six lignes, le Doigt intérieur, n'en à que deux, l'extérieur à quatre lignes.

#### GENRE RALE.

## (246) LE RALE D'EAU à GORGE BLANCHE.

Taille de notre Rale d'Eau, BUFFON pl. 749., conformation totale pareille, couleurs peu dissemblantes, sur tout le haut du corps regne du brun olivacé, s'obscursissant sur la Tête et la Nuque, Gorge blanche, le bleu de plomb, qui est la couleur dominante des parties inférieures du Rale d'Europe, se retrouve aussi dans cette variété Africaine, les Flancs, les Cuisses et l'Abdomen sont d'un gris brun, raijé transversalement de blanc et de roux, Bec et Pieds bruns.

## (772) LE RALE D'EAU DE ST. DOMINGUE,

Taille de notre Marquette, toutes les parties supérieures de l'Oiseau sont d'un brun olivacé, ligné de traits noirs sur la Tête et le milieu du Cou, et marqué de grandes taches noires sur le milieu des plumes du Manteau et des couvertures Ailaires, la Gorge est d'un blanc sale, tout le reste du dessous du Corps d'un gris fauve, le bas Ventre sur les côtés noir raijé transversalement de blanc.

## GENRE JACANA,

# (403) LE GRAND JACANA VERD & CRÊTE, OU LE JACANA BRILLANT.

Un Plumage éclatant revêt cet Oiseau dont la longueur depuis le bout du Bec à l'extrémité de la Queue, qui est fort courte, est de 12 Pouces, et mesuré du Bec à l'extrémité des Ongles 19 Pouces, Ailes longues de 6½ Pouces, Doigt postérieur 4 Pouces, l'Ongle seule à 2 Pouces 6 lignes, Bec 1½ Pouce, de couleur jaune, sur la base de la Mandibule supérieure, s'elève perpendiculairement en forme de plastron une espèce de Crête lisse et charnue, d'un rouge cramoisi vif, toute la Tête, le Cou, le haut du Dos, la Poitrine et le Ventre jusques et y compris les Cuisses, sont d'un beau verd de bouteille soncé et respleu-

R 5

dissant, les Yeux sont surmontés d'une raises blanche, qui se prolonge jusques à l'Occiput, le Manteau et toutes Couvertures Ailaires sont de couleur de cuivre bronzé à ressets verts, grandes pennes Ailaires ainsi que l'Aile batarde d'un noir à ressets de verd soncé, Croupion, Queue, Flancs et Abdomen d'un roux rougeatre, changeant en pourpre sur les Plumes du Croupion; Pieds et Doigts verts, Ongles brunes.

(768) LA POULE D'EAU NOIRETTE.

Le Corps de cet Oiseau n'est pas plus gros que celui d'un Merle, sa longueur totale est de 8 Pouces, le Bec I Pouce I ligne, d'un jaune verdatre, tout le Plumage est d'un grisbleu noiratre tant soit peu verdoijant sur le Manteau, Pieds et Doigts d'un rouge eclatant, Ongles brunes.

(248) LE MARQUETTE PIQUETE (Male et Ps-melle) (\*).

Taille à peu près semblable à l'Atourte Cechevis d'Europe, longueur totale 61 Pouces, Bec menu, mais du reste conformé comme celui de nôtre Marquette, Ailes courtes aboutissant à l'origine de la Queue, celle-ci à toutes les Baguettes très foibles garnies de Barbes pres-

<sup>( )</sup> Trouvé en Afrique par Mr. F. LE VAILLAN-T.

presque deliées; Le Male à la Tête, le Cou jusque sur la Poitrine, et derrière jusque au haut du Dos, recouvert, d'une espèce de Camail, ou Capuchon, d'un roux soncé, plus clair sous la Gorge, le reste du Plumage supérieur est brun noiratre; chaque Plume à vers son extrémité, une courte raije longitudinale, et une tache ronde d'un blanc pur sur chaqu'une de ses Barbes, pennes Ailaires brunes, parties insérieures d'un brun noiratre, toutes les Plumes sont longitudinalement striées de blanc pur; Pièds, Doigte et Ongles d'un brun clair,

La Femelle n'a point de roux sur le Cou, la Gorge est blanche ainsi que le dévant de la Poitrine et le milieu du Ventre, ces dernières parties ont des mouchetures de couleur sombre, tout le reste du Plumage est brun noiratre, moucheté de blanc sale, et rassé sur les Flancs de bistre clair.

## GENRE GREBE.

## (250) LE CASTAGNEUX à COUROUX.

Taille tant soit peu plus sorte que notre Castagneux, hauteur depuis le plan des Pieds au sommet de la Tête environ 6 Pouces, Bec noir, longueur 1 Pouce 2 lignes, extrémité des deux Mandibules blanches, une partie du Cou à commencer de dessous la Gorge, est d'un roux ardent, le haut de la Tête, la Gorge, ainsi que toute la partie postérieure du Cou est d'un brun terreux, le haut de la Poitrine et les Flancs sont fauves, le Ventre est d'un blanc pur, le Manteau et les Ailes sont d'un brun mélé de fauve, le Croupion est d'un roux clair.

#### GENRE ANHINGA.

## (220) L'ANHINGA à COU ISABELLE (Male et Femelle.)

Cette nouvelle espèce d'Anhinga (découvert en Afrique par Mr. LE VAILLANT,) que LATHAM à considéré comme une simple varieté de l'Anhinga de Caijenne, ou de celui à Collier maron du Sénégal (\*) dissère totalement de ces deux Oiseaux et forme une espèce distincte dans ce genre. — Le Male long de 3 Pieds 1½ Pouce à le Bec jaunatre, tant soit peu rembruni sur le haut de la Mandibule supérieure, une bande blanche prend son origin.

R<sub>1</sub>

<sup>(\*)</sup> L'ANHINGA ROUX Buffon pl. 107. (la Femelle). — Le Blale à toutes les parties insérieures noires et la Poitrine ceinte d'un beau Collier roux mayon.

gine à la base du Bec sous l'Oeil, et se dirige jusque sur le milieu du Cou, cette bande est surmontée par une autre fort etroite d'un brun noiratre, les Plumes du haut de la Tête et du Cou postérieur sont d'un brun clair, tachetés de brun foncé, tout le Cou antérieur est d'un roux isabelle, la Poitrine, le Ventre et toutes les autres parties inférieures, sont d'un beau noir verdoijant, les Plumes sub-Ailaires font très alongées, d'un blanc argenté dans toute leur longeur et frangées extérieurement de noir, toute l'Aile est noire, on observe seulement sur quelques unes des couvertures adherantes au corps, une large bande longitudinale d'un blanc argenté, s'étendant sur chaque Barbe extérieure le long de la Baguette, petites Couvertures d'un brun noiratre, celle-ci ont une raije blanchatre le long des Baguettes, le Dos et le Croupion sont d'un noir verdoijant, la Queue, composée de 12 pennes est noire, ainsi que les Pieds. - La Femelle est plus petite, que le Male, elle est longue de 2 Pieds 10 Pouces et à comme le Male la bande blanche de chaque coté du Cou, mais celle-ci est moins prononcée et n'est pas surmonteé de noir, toutes les parties inférieures, de puis la Gorge jusques à l'Abdomen, sont d'un roux isabelle, les Flancs et les Cuisses sont bruns, les Ailes et la Queue d'un noir mat, la Femelle n'a

pas ces longues plumes sub-Ailaires, et toutes les Couvertures, sont d'un brun sale, enfin les Plumes, qui dans le Male sont raijées de blanc à restets argentés, sont d'un gris terne dans la Femelle.

# N Ô T E

DES

## OISEAUX DOUBLES

e T

DE QUELQUES AUTRES OBJETS D'HISTOIRE NATURELLE OF-FERTS EN ÉCHANGE. La 13me Edition de LINNEUS par F. GMELIN etant entre les mains d'un chacun, j'ai cru devoir classifier cette Nôte separée suivant ce Système, les Planches enluminées de BUFFON sont citées ainsi que quelques autres Auteurs.

## MAMMALIA.

## - MAMMIFÈRES.

PIDELPHIS GIGANTEA. (Femina) Gmelin pag.

109. Sp. 11. — LE KANGARO (Femelle)

de la nouvelle Hollande Schreber pl. 104 et

105. — THE KANGARU Pennant Tom.

2. No. 229. pl. 64. — White's Journal

pag. 272. pl.

THE POTO-ROO. OR

KANGARO RAT White's Journal pag. 286. pl. — de la nouvelle Hollande.

LE DIDELPHE

LONG POILS d'Amerique.

à QUEUE ARGENTÉE (Male) de Ternate — non décrit.

SCIURUS PETAURISTA. Gmelin pag. 155. Sp. 28. — LE TAGUAN, OU GRAND ECUREUIL VOLANT DE TERNATE Buff. Suppl. Tab. 21. — SAILING SQUIRREL Penn. No. 349. pl. 78. — Schreber pl. 224.

- SCIURUS CINEREUS. Gmel. pag. 147. Sp. 3, —

  L'ECURUEIL PETIT-GRIS Buff. Tab.

  25. GREY SQUIRREL Penn. No.,

  209. Tab. 26. Sohrek. Tab. 213. de Virginie.
- SCIURUS JAVENSIS. Sparmann JAVAN SQUIRREL Penn. pag. 142. Nº. 335. Schreber Tab. 216.
- SCIURUS GETULUS. Gmelin pag. 150. Sp. 6.

   L'ECUREUIL BARBARES QUE Buff.

  Tab. 27. —— Schreber pl. 221.
- VIVERRA NARICA. Gmelin pag. 86. Sp. 3. —

  LE COATI BRUN Buff. Tab. 48. —

  Schreber pl. 119. de l'Amérique Méridionale.
- Simia Midas, LE TAMARIN Buffon

  Tab. 13. Aud. fam, 6. Sect. 2. pl.

  5. Schreber pl. 37. de la Guijane.
- SIMIA MOLOCH. Audebert. \_\_\_ LE MOLOCH Audeb. famille Ire, Sect. 2de, pl. 2. \_\_\_ Schreber Saugeth. Supp. pl. 3. B. \_\_\_ des Moluques.

## AVES.

## OISEAUX.

### FALCO.

- FALCO LACOPUS. Gmel. p. 260. LA BUSE GANTÉE (Femelle) d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. v. 1. pl. 18.
- FALCO FURCATUS. Gmel. p. 262. LB
  MILAN à QUEUE FOURCHUE de la
  Caroline Buff. p. 158. v. 1. Edit. folio.
- FALCO MELANOPTERUS. Latham Ind. Orn.
  Supp. v. 2. p. VI. LE MILAN LE
  BLAC d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. pl. 36.
- VULTUR PAPA. Gmel. p. 246. —— LE ROI DES VAUTOURS Buff. pl. 428.

#### LANIUS.

Vail!. Oif. d'Af. pl. 80.

### PSITTACUS.

- PSITTACUS ALEXANDRI. Gmel. p. 321.

  LA GRANDE PERRUCHE à COLLIER des Iles Maldives Buff. pl. 642. Vaill. pl. 30.
- PSITTACUS BANKSII. (Mas) Lath. Ind. Orn.
  v. I. p. 107. LE GRAND CACAA 3 TOE

- SCIURUS CINEREUS. Gmel. pag. 147. Sp. 3. —

  L'ECURUEIL PETIT-GRIS Buff. Tab.

  25. GREY SQUIRREL Penn. No.,

  209. Tab. 26. Sohrek. Tab. 213. de.

  Virginie.
- SCIURUS JAVENSIS. Sparmann JAVAN SQUIRREL Penn. pag. 142. No. 335. Schreber Tab. 216.
- SCIURUS GETULUS. Gmelin pag. 150. Sp. 6.

   L'ECUREUIL BARBARES QUE Buff.

  Tab. 27. Schreber pl. 221.
- VIVERRA NARICA. Gmelin pag. 86. Sp. 3. —

  LE COATI BRUN Buff. Tab. 48. —

  Schreber pl. 119. de l'Amérique Méridionale.
- Simia Midas. LE TAMARIN Buffor Tab. 13. — Aud. fam. 6. Sect. 2. pl. 5. — Schreber pl. 37. — de la Guijane.
- SIMIA MOLOCH. Audebert. LE MOLOCH Audeb. famille Ire, Sect. 2de, pl. 2. — Schreber Saugeth. Supp. pl. 3. B. — des Moluques.

- OMNICOLOR des Iles de la Mer de Sud Vaitl. perr. pl. 28.
- PSITTACUS PERTINAX. Gmel. p. 322.

  EA PERRUCHE à FACE JAUNE, OU
  L'APUTE JUBA d'Amerique Buff. pl. 528.

  Vaill. perr. pl. 34.
- PSITTACUS CAROLINENSIS. Gmel. p. 320.

   LA PERRUCHE à TÊTE JAUNE de la Caroline Buff. pl. 499. Vaill. perr. pl. 33.
- PSITTACUS PENNANTII. Lath. Ind. Orn. v.

  1. p. 90. LA PERRUCHE à LARGE
  QUEUE BLEUE de la nouvelle Hollande
  Vaill. perroq. pl. 78.
- PSITTACUS PENNANTII. (Pullus) LA PER-RUCHE à LARGE QUEUE BLEUE jeun age (Male).
- TACHES SOUCI de la Guijane (Male) Vaill.
  perr. pl. 58.
- PSITTACUS FORMOSUS. Lath. Ind. Orn. v. 1.
  p. 103. LA PERRUCHE INGAMBE
  du Cap de Diemen (Male) Vaill. perr. pl. 32.
- PSITTACUS ERITHACUS. Gmel. p. 332.

  LE PERROQUET JACO de Guiné Buff.

  pl. 311. Vaill. pl. 99.
- PSITTACUS OCHROCEPHALUS. Gmel. p. 339.

  LE PERROQUET AMAZONE ordinaire d'Amerique Vaill. perr. pl. 84.

Psit-

€ 4

PSITTACUS PULVERULEN TUS. Gmel. p. 341.

LE PERROQUET MEUNIER de la Guijane Buff. pl. 861. — Vaill. perr.
pl. 94.

ROQUET LORI RADHIA des Moluques
Vaiil. perr. pl. 94.

- PSITTACUS ÆSTIVIUS. Gmel. p. 340.

  LE PERROQUET AOUROU-COURAOU

  de la Guijane Buff. pl. 547. Vaill.

  perr. pl. 110.
- PSITTACUS MELANOCEPHALUS. Gmel. p. 346. LE PERROQUET MAHIPOURI de Caijenne Vaill. pl. 119. Buff. 527.
- PSITTACUS PURPURENS. Gmel. p. 346.

  LE PERROQUET à CAMAIL BLEU (Femelle) Vaill. perr. pl. 115.
- PSITTACUS NOVÆ GUINÆ. Gmel. p. 319. —
  LE LORY-NOIR de nouvelle Guinée Vaill.
  perr. pl. 49.
- PSITTACUS AUSTRALIS. Lath. Ind. Orn. v.
  1. p. 104. LA PERRUCHE à BANDEAUROUGE de la nouvelle Galle meridionale Vaill. perr. pl. 48.
- PSITTACUS OCHROPTERUS. Gmel. p. 341.— LE PERROQUET à FACE ET EPAU-LETTES JAUNES d'Amerique Vaille perr. v. 2. pl. 98. bis.
- PSITTACUS LORY. Gmel. p. 335. LE PER-

ROQUET-LORY à SCAPULAIRES BLEU des Moluques Buff. pl. 168. — Vaill. perr. pl. 123.

- PSITTACUS GALGULUS. (Mas et Femina) Gmel.

  p. 349. LE TUI à COURONNE SAPHIR des Philippines (Male et Femelle) Buff.
  pl. 190. f. 2.
- PSITTACUS PULLARIS. Gmel. p. 348.

  LA PERRUCHE TUI à TÊTE ROUGE de Guiné Buff. pl. 60.
- PSITTACUS PUR PUR A TUS. Gmel. p. 350. —
  LA PERRUCHE TUI à QUEUE POURPRÉE de la Guijane Sonnini v. 28. p. 97.
- PSITTACUS GRANDIS. Gmel. p. 335. LE PERROQUET GRAND LORY des Moluques Buff. pl. 683. Vaill. pl. 126.

à FRANGES BLEUES des Moluques (Male) Vaill. v. 2. pl. 93.

PSITTACUS TABUENSIS. Gmel. p. 317. —
LE GRANDE PERRUCHE à COLLIER
ET CROUPION BLEUS de Tongotaboo
Vaill. perr. pl. 55.

RUCHE TUI à FACE ROSE d'Afrique pays des Namaquois Vaill. perroq v. 3 Supp.

#### RAMPHASTOS.

Ramphastos Dicolorus. Gmel. p. 356. —
A 5

LE TOUCAN PIGNANCOÏN de Caijenne Buff. pl. 269.

- RAMPHASTOS ERYTHRORHYNCHOS. Gmel. p. 355. LE TOUCAN à GORGE BLAN-CHE, OU LE TOCAN de Caijenne Buff. pl. 262.
- RAMPHASTOS PIPERIVORUS. (Mas et Femina)

  L'ARACARI KOULIH de la Guijane
  (Male et Femelle) Buff. pl. 729:
- RAMPHASTOS VIRIDIS. (Femina) L'ARA-CARI VERD de Caijenne (Femelle) Buff. pl. 728.
- RAMPHASTOS MOMOTA. Gmel. p. 357.

  LE HOUHOU, OU MOMOT du Bréfil Buff.

  pl. 370.
- RAMPHASTOS ARACARI. Gmel. p. 354. —
  L'ARACARI VERD & CINTURON ROUGE, OU LE GRIGRI Buff. pl. 166.

#### BUCEROS.

BUCEROS CORNICULATUS. — LE CORBI-CALAO des lles de la Mer du Sud Vaill. Calaos pl. 24.

> LAO à CASQUE EN CROISSANT des Moluques (Male) Vaill. Calaos pl. 13.
>
> Sonnini v. 20. p. 140.

#### CROTOPHAGA.

GRAND ANI DES PALETUVIERS de la Guijane Buff. pl. 102. f. 1.

#### CORVUS.

- CORVUS ERYTHRORHYNCHOS. Gmel. p. 372.

   LA PIE BLEU à LONGUE QUEUE de la Chine Vaill. Oif. d'Af. v. 2. pl. 57.

   Buff. pl 622.
- CORVUS CALVUS. Gmel. p. 372. LE CHOU-CAS CHAUVE de Caijenne Buff. pl. 521.
- CORVUS VARIANS. Lath. Ind. Orn. Supp. p. XXVI. LE TEMIA de Ceilan Vaill. Oif. d'Af. pl. 56.
  - CORVUS NUDUS. Gmel. p. 371. LE COL-NUD de Caijenne (Male) Buff. pl. 609. — Vaill. Oif. d'Amerique et des Indes pl. 45.

#### CORACIAS.

CORACIAS SENEGALENSIS. Gmel. p. 379.—
LE ROLLIER à LONG-BRINS d'Afrique
Vaill. Rolliers pl. 25.—Buff. pl. 326.

## ORIOLUS.

- ORIOLUS AUREUS. Gmel. p. 483. L'ot-SEAU DE PARADIS ORANGÉ des Indes (Male) Vaill. Oif. de paradis pl. 9.
- ORIOLUS PICUS. Gmel. p. 384. LE TALA-PIOT de Caijenne Buff. pl. 605.
- ORIOLUS CRISTATUS. Gmel. p. 387. LE GRAND CASSIQUE HUPPÉ de Caijenne Buff. pl. 344.
- ORIOLUS CRISTATUS. (Varietas) LE GRAND CASSIQUE VERD de Caijenne Buff. pl. 328.
- ORIOLUS PERSICUS. (Mas et Femina) Gmel. p. 388. LE CASSIQUE à DOS JAUNE de Caijenne (Male et Femelle) Buff. pl. 184.
- ORIOLUS HEMORRHOUS. (Mas et Femina)

  Gmel. p. 387. LE CASSIQUE à DOS
  ROUGE du Bresil (Male et Femelle) Buff.
  pl. 482.
- ORIOLUS AMERICANUS. Gmel. p. 386.

  LE TROUPIAL à POITRINE ROUGE

  de Caijenne Buff. pl. 236.
- ORIOLUS ICTEROCEPHALUS. (Male) Gmel. p. 392. LE CARROUGE à COIFFE JAUNE de Caijenne (Male) Buff. pl. 343.
- ORIOLUS XANTHORNUS. Gmel. p. 391. —

  LE CARROUGE, OU PETIT CULJAUNE du Mexique Buff. pl. 5. f. 1.

GORGE ET TETE MARON de Caijenne ngn décrit,

#### GRACULA.

à GORGE ET VENTRE TACHETÉS de la nouvelle Hollande — non décrit.

GRACULA RELIGIOSA. Gmel. p. 395. — LE GRAND MAINATTE des Indes Orientales Buff. pl. 268.

## PARADISEA,

- PARADISEA APODA. Gmel. p. 399. L'OI-SEAU DE PARADIS GRAND EMERAU-DE des Moluques (Male) Buff. pl. 254. — Vaill. Oif. parad. pl. 1.
- PARADISEA REGIA. Gmel. p. 400. LE MANUCODE, OU ROI DES OISEAUX DE PARADIS de la nouvelle Guiné Buff. pl. 496. Vaill. pl. 7.
- PARADISEA MAGNIFICA. Gmel. p. 401. —
  LE MANUCODE à BOUQUETS de la nouvelle Guiné Buff. pl. 631. Vaill. pl. 9.
- PARADISEA AUREA. Gmel. p. 402. LE

Picus Nubicus Gmel. p. 439. — L'ÉPEICHE ONDÉE ET TACHETÉE d'Afrique Buff. pl. 667.

#### GALBULA,

- GALBULA VIRIDIS. (Mas) Gmel. p. 459.

  LE JACAMAR de la Guijane (Male) Buff.

  pl. 238.
- GALBULA PARADISEA. Gmel. pl. 458. LE JACAMAR à LONGUE QUEUE de Surinam (Male) Ruff. pl. 271.

#### ALCEDO.

- ALCEDO CAPENSIS, Gmel. p. 453. LE GRAND MARTIN PÉCHEUR à GROSBEC ROUGE d'Afrique Buff. pl. 590.
- ALCEDO SMYRNENSIS. Gmel. p. 456 LE MARTIN PÉCHEUR BLEU ET ROUX de Madagascar Buff. pl. 232.
- ALCEDO DEA. Gmel. p. 458. LE MARTIN PÉCHEUR à LONG-BRINS de Ternate Buff. pl. 116.
- ALCEDO BICOLOR. (Mas et Femina) Gmel. p. 451. LE MARTIN PÉCHEUR VERD ET ROUX à COLLIER de Caijenne (Male et Femelle Buff. pl. 592.
- ALCEDO TORQUATA. (Mas et Femina) Gmel. p. 452. LE MARTIN PÉCHEUR HUP-PÉ.

PÉ, OU L'ALATLI de Caijenne (Male et Femelle.) Buff. pl. 284.

d'Afrique pays des Caffres. — non décris.

- ALCEDO CRISTATA. Gmel. p. 447. LE PE-TIT MARTIN PÉCHEUR HUPPÉ, OU LE VINTSI de l'Isle Lucon. Buff. pl. 765. f 1.
- ALCEDO SUPERCILIOSA. Gmel. p. 450. LE
  MARTIN PÉCHEUR PETIT VERD à
  COLLIER de Caijenne. Buff. pl.
  756. f. 2.
- ALCEDO MAXIMA. Gmel. p.. 455. LE GRAND MARTIN PÉCHEUR HUPPÉ d'Afrique. Buff. pl. 679.

#### MEROPS.

MEROPS APIASTER. Gmel. p. 460. LE GRAND GUEPIER VERD d'Europe. Buff. pl. 938.

QUEUE FOURCHUE, OU LE TAWA, d'Afrique. — Vaill. voy. — Sonnini, v. 18.

#### UPUPA.

TRON BLEU, OU PROMÉFIL de nouvelle Guiné (Male.) — non décris.

B

TUPUPA ERYTHRORYNCHOS. (Mas.) Lath. Ind.
v. 1. p. 280. — LE PROMEROPS à BEC
ROUGE, OU LE GRIMPART d'Afrique
(Male.) Audebert. pl. 6.

#### CERTHIA.

- CERTHIA SENEGALENSIS. Gmel.p. 477. LE SOUIMANGA VIOLET à POTRINE ROUGE d'Afrique. Audebert Oif. dorés v. 2. pl. 8.
- CERTHIA CHALYBEA. Gmel. p. 475. LE SOUIMANGA à COLLIER d'Afrique Buff. pl. 246. f. 3. Audeb. pl. 13.
- CERTHIA FAMOSA. (Mas.) Gmel. p. 481. —
  LE GRAND SOUIMANGA à LONGUE
  QUEUE d'Afrique. Buff. pl. 83. Audeb.
  pl. 37.
- CERTHIA VIOLACIA. (Mas.) Gmel. p. 482. —
  LE SOUIMANGA à CAPUCHON VIOU
  LET d'Afrique. Buff. pl. 670. f. 2. —
  Audeb. v. 2. pl. 39.
- CERTHIA CAIJANEA. (Mas.) Gmel. p. 483. —
  LE GUI-GUIT NOIR ET BLEU à TÊTE
  VERTE de Caijenne. Buff. pl. 83. f. 2. —
  Audeb. pl. 44.
- CERTHIA CAIJANA. Gmel. p. 475. LE GUI-GUIT VERD TACHETÉ à GORGE ROUSSE de Caijenne. (Maie.) Buff. pl. 682. f. 2.

CERTHIA SPIZA. (Mas.) Gmel. p. 476. — LÉ
GUI-GUIT VERD à CAPUCHON NOIR
du Brélil. (Male.) Audeb. v. 2. pl. 47.

souci, ou le namaquoi d'Afrique. —

VENTRE JAUNE d'Afrique descris du Zahara. (Male.) — non decris.

CERTHIA FLAVEOLA. Gmel. p.479: — LE GUI-GUIT SUCERIER des Antilles. Audeb. pl. 51.

CERTHIA CAERULEA: (Mas.) Gmel. p. 474. —
LE GUI-GUIT NOIR ET BLEU, OU LE
BICOLOR de la Guijane: Audeb. v. 2.
pl. 45.

CERTHIA SPERTA. (Mas.) Gmel. p. 477. — LE SOUIMANGA à CINTURE MARON des Philippines. (Male.) Audeb. pl. 16.

CINTURE BLEUE du Sénégal. Audeb. v. 2. pl. 10:

## TROCHILUS.

TROCHILUS GRAMINEUS. Gmel. p. 488. - LE COLIBRI HAUSSE-COL VERD d'Ameque. Audeb. Oif. dores. v. 1. pl. 9.

TROCHILUS SUPERCILIOSUS. (Mas.) Gmel. p. 485. — LE COLIBRI À BRINS-BLANC

- de la Guijane (Male.) Buff. pl. 600. f. 32.

   Audeb. pl. 17.
- TROCHILUS VIRIDUS. Audebert. L'OISEAU MOUCHE VERD DORÉ à QUEUE BLANCHE ET VERTE de la Guijane. Audeb. pl. 41.
- TROCHILUS CAMPYLOPTERUS. (Mas.) Gmel. p. 499. LE
  TROCHILUS CINEREUS. (Femina.) 490. LE
  COLIBRI à LARGE TUYAUX (Male et
  Femelle.) de Caijenne. Audeb. pl. 5. (Femelle.) et pl. 21. (le Male.)
- TROCILUS PELLA. (Femina.) LE COLIBRE TO PAZE. (Femelle.) Audeb. pl. 3.
- TROGHILUS MANGO. (Femina.) LE COLIBRE PLASTRON NOIR de la Jamaique. (Femelle.) non decrit.
- TROCHILUS MOSCHITUS. (Mas et Femina.)

  Gmel. p. 494. L'OISEAU-MOUCHE

  RUBIS TOPAZE de Caijenne. (Male et Femelle.) Buff. pl. 227. f. 2. Aud. pt.
  29. et 55.
- TROCHILUS JUGULARIS. Gmel. p. 489. LE COLIBRI GRENAT de St. Domingue. Audeb. pl. 4.
- TROCHILUS ORNATUS. (Mas.) Gmel. p. 497.—
  L'OISEAU-MOUCHE HUPPECOL de la
  Guijane. (Male.) Buff. pl. 640. f. 3.—
  Audeb. pl. 49.

#### STURNUS.

7

STU	RNUSI	<b>JABI</b>	ROP.	Daud	lin O	rn. v.	2. p. 3	rs.
•		LE	NABIR	αP,	οU	E T O	URNE	A U
	CUI	vr ê	d'Afriqu	ie <i>Vai</i>	71. O	is. d'	Af. pl.	89.

STURNUS NITENS. Daudin p. 313. — L'E'
TOURNEAU COUIGNOP d'Afrique Vaill.
pl. 90. — Buff. pl. 561.

STURNUS MORIO. Daud. p. 307. — L'ETOUR. NEAU ROUPENNE d'Afrique Vaill. pl. 83.

L'ETOURNEAU VERD-BORÉ d'Afrique Vaill. pl. 87. — Buff. pl. 220.

STURNUS NABOUROUP. Daudin p. 308.

L'ETOURNEAU à AILES BLANCHES,

OU LE NABOUROUP d'Afrique Vaill.

Oif. d'Af. pl. 91.

STURNUS LUDOVICIANUS. Gmel. p. 802. — LE STOURNE, OU ETOURNEAU 2 CRAVATE NOIRE de la Louisiane Buff. pl. 256.

#### TURDUS.

TURDUS ZEYLONUS. (Mas.) Gmel. p. \$37. — LA PIE-GRIECHE BACBAKIKI d'Afrique (Male.) Vaill. Oif. d'Af. pl. 67.

TURDUS PAGODARUM. Gmel. p. 816. — LE

B 3 MAR-

- MARTIN BRAME des Indes Orientales (Male.) Vaill. Oif. d'Af. pl. 95.
- TURDUS MIGRATORIUS. Gmel. p. 811. —
  LA LITORNE DU CANADA Buff. pl.
  556. f. 1.
- TURDUS MINDANENSIS. Gmel. p. 823. —
  LE MERLE CADRAN d'Afrique Vaill.

  Oif. d'Af. pl. 109. Buff. pl. 627.
- TURDUS MOLUCCENSIS. Briss. v. 2. p. 316.

  LE BREVE à BANDEAU NOIR de Madagascar Buff. pl. 257.
- TURDUS CAYANURUS. (Mas.) Gmel. p. 828. —
  L'AZURIN, OU FOURMILIER à QUEUE
  BLEUE de la Guijane Buff. pl. 355.
- TURDUS OLIVACEUS. Gmel. p. 810. LE GRIVERON du Cap de B. E. Vaill. Oif. PAf. pl. 98.
  - TE BLANCHE de Java Vaill. Oif. d'Af.
    pl. 115.
  - NOIR d'Amerique non décris,
- TURDUS LEUCOCEPHALUS. Gmel. Syst. 1.

  p. 829. LE MERLE DOMINIQAIN
  de la Chine (Male.) Sonnerat voy. Ind. v. 2.
  2. 191.

#### AMPELIS:

- AMPELIS POMPADORA. (Mas.) Gmel. p. 839.— LE COTINGA PACAPACA, OU POM-PADOUR d'Amerique Buff. pl. 279.
- AMPELIS CARNIFEX. (Mas et Femina.) Gmel. p. 839. LE COTINGA ROUGE, OU OUETTE, (Male et Femelle.) Buff. pl. 378. (Male) Vaill. Cottingas pl. 37 et 38.
- Ampelis Cayana. (Mas.) Gmel. p. 480.

  Le cotinga quereïva (Mak.) de la
  Guijane Buff. pl. 624.
- AMPELIS CAERULEUS. (Mas.) LE COTIN-GABLEU de la Guijane (Male.) Buff. pl. 186. — Vaill. pl. 34.

## LOXIA.

- LOXIA MINUTA. Gmel. p. 865. LE BOU-VREUIL BEC-ROND à VENTRE ROUX de Caijenne Buff. pl. 319. f. 2.
- LOXIA CAPENSIS. Gmel. p. 862. LE GROSBEC DE COROMANDEL Buff. pl. 101.
  f. 1.
- LOXIA ASTRILD. Gmel. p. 852. LE BENGALI RAYÉ, OU L'ASTRILD d'Afrique Buff. pl. 157. f. 2.
- LOXIA CARDINALIS. (Mas.) Gmel. p. \$47.

  LE CARDINAL HUPPÉ de Virginie (Male.) Buff. pl. 37.

LE PETIT CARDINAL
ROUGE ET NOIR, OU LE CARDINALIN du Sénégal — non décrit.

#### EMBERIZA.

- EMBERIZA SERENA. Gmel. p. 883. LA VEUVE DOMINICAINE d'Afrique Buff. pl. 8. f. 2.
- EMBERIZA LONGICANDA. Gmel. p. 884.

  LA GRANDE VEUVE à EPAULETTES
  d'Afrique Buff. pl. 635.
- EMBERIZA CAYANEA. Gmel. p. 876. L. R. MINISTRE d'Amerique (Male.) Buff. p. 274. Edit. folio.
- EMBERIZA SIRIS. Gmel. p. 885. LE PAPE de la Caroline Buff. pl. 159. f. 2.

#### TANAGRA.

- TANAGRA BRASILIANA. Gmel p. 883. LE TANGARA ROUGE, OU CARDINAL du Mexique Buff. pl. 127. f. 1.
- TANAGRA RUBRA. Gmel. p. 889. LE TAN-GARA SCARLATE DU CANADA Buff. pl. 156. f. 1.
- TANAGRA MAGNA. Gmel. p. 890. —— LE GRAND TANGARA de la Guijane Buff. pl. 205.
- TANAGRA CRISTATA. Gmel. p. 898. LA

HOUPETTE, OU TANGARA HUPPE de la Guijane Buff. pl. 7. f. 2.

- TANAGRA JACAPA. (Mas.) Gmel. p. 888.

  LE TANGARA POURPRE, OU EEC D'AR.

  GENT de Caijenne (Male.) Buff. pl. 178.

  f. 1.
- TANAGRA E PISCOPUS. (Mas et Femina.) Gmelop. 896. LE TANGARA BLEUET, OU L'EVÊQUE de Caijenne (Male et Femelle.) Buff. pl. 178.
  - OU L'ARCHEVÈQUE de Perou (Malc.) —
    non décrit.
- TANAGRA VIOLACCA. (Mas et Femina.) Gmel. p. 890. LE PETIT TANGARA NOIR ET JAUNE, OU TEITE du Brésil (Male et Femelle.) Buff. pl. 114. f. 2. (le Male.)
- TANAGRA MEXICANA. Gmel. p. 893. -- LE TANGARA DIABLE ENRHUMÉ de Caijenne Buff. pl. 290. f. 2.
- TANAGRA CAYANA. (Mas.) Gmel. p. 892. ——
  LE TANGARA PASSEVERD de Caijenne
  Buff. pl. 201. f. 2.
- TANAGRA TRICOLOR. (Mas.) Gmel. p. 891. —
  LE TANGARA VARIÉ À TÊTE VERTE,
  OU LE TRICOLOR de Caijenne Buff. pl.
  33. f. 1.
- TANAGRA NIGERRIMA. Gmel. p. 899.

  LE TANGARA NOIR à EPAULETTES

  BLANCHES d'Amerique Buff. pl. 179. f. 2.

TANGARA, OU LE NEGRIN de la Guijane (Femelle.) — non décrit.

TANAGRA SILENS. Lath. Ind. Orn. v. 1. p. 432. — LE TANGARA SILENTIEUX de la Guijane Buff. pl. 742.

TANAGRA TATAO. (Mas et Femina.) Gmel. p. 893.

LE TANGARA SEPTICOLOR (Male et
Femelle) Buff. pl. 127. f. 2. (le Male.) —

(la Femelle non décrite.)

#### FRINGILLA.

FRINGILLA BENGHALUS. (Mas.) Gmel. p. 920.

LE BENGALI MARIPOZA d'Afrique Buff. pl. 115. f. 1.

PION ROUGE d'Afrique Pays des Caffres
— non décrit.

SOURCILS ET CROUPION E CARLATE de la nouvelle Hollande (Male.) — Sénégali Quinticolor Veillot Oif: Chanteurs pl. 15.

#### MUSSICAPA.

Mussicapa Tyrannus. Gmel. p. 931.

LE SAVANA à QUEUE FOURCHUE

Buff. pl. 572. f. 2.

Mussicapa Ferox. (Mas.) Gmel. p. 934.

LE TYRAN à HUPPE SOUCI de Caijenne. Buff. pl. 571. f. 1.

MUSSICAPA AUDAX. Gmel. p. 934. — LE
TYRAN TACHETÉ, OU LE CAUDEG
de Caijenne Buff. pl. 453. f. 2.

MUSSICAPA RUBRICOLLIS. Gmel. p. 933. — LE PIAHAU de Caijenne Buff. pl. 381.

CHES à CAPUCHON BLANC d'Afrique pays des Housouanna Vaill. Oif. d'Af. pl. 159.

CHES NOIR A SOURCILS ET VENTRE
BLANC de la nouvelle Hollande — non
décrit.

### ALAUDA,

ALAUDA CAPENSIS. Gmel. p. 788. — LA CRAVATE JAUNE, OU CALANDRE du Cap de B. E. Buff. pl. 504. f. 2.

## MOTACILLA.

MOTACILLA MADAGASCARIENSIS. Gmel. p., 981. — LE FIGUIER à PAUPIÈRES BLANCHES, OU LE CHERIC d'Afrique Buff. — Vaill. Oif. d'Af. pl. 132.

MOTACILLA TIPHIA. Gmel. p. 963. — LE FIGUIER QUADRICOLOR de Ceylan Edw. 1. 79.

- MOTACILLA HOTTENTOTTA. Gmel. p. 963.— LE TRAQUET IMITATEUR d'Afrique Vaill. Oif. d'Af. pl. 181.
- MOTACILLA CAYANA. Gmel. p. 990. LE PIPIV. BLEU ET NOIR de Caijenne Buff.

#### PIPRA.

- PIPRA PAREOLA. (Mas) Gmel. p. 999. LE TIJE, QU GRAND MANAQUIN de Caijenne (Male) Buff. pl. 687. f. 2.
- PIPRA ALBIFRONS. Gmel. p. 1000. LE PLUMET BLANC, OU LE MANICUP de Caijenne Buff. pl. 707. f. 1.
- PIPRA ERYTHROCEPHALA. Gmel. p. 1001. —
  LE MANARIN à TÊTE JAUNE du Bréfil Buff. pl. 34. f. 1.
- PIPRA LEUCOCEPHALA. Gmel. p. 1002. ——
  LE MANAKIN À TÊTE BLANCHE de la Guijane Buff. pl. 34. f. 2.
- PIPRA MANACUS. Gmel. p. 1002. LE MANAKIN CASSE NOISETTE du Bréfil Buff. pl. 302. f. 1.
- PIPRA RUPICOLA. (Mas.) Gmel. p. 998.

  LE COQ DE ROCHE de Caijenne (Male.)

  Buff. pl. 39.

#### MENURA.

MENURA NOVAE HOLLANDIAE. (Mas et Fe-mi-

mina.) Lath. Supp. p. LXI. — LE MÊ-NURA à QUEUE EN LYRE, OU LE PARKINSON de la nouvelle Hollande (Male et Femelle.) Audeb. Oif. dorés pl. 14. (Le Male.)

#### COLUMBA.

- COLUMBA CHALCOPTERA. Lath. Ind. v. 2. p. 604. LE PIGEON RAMIER à AILES DORÉES des Isles Norfolk. Sonnini. v. 17. p. 309.
- COLUMBA AROMATICA. Gmel. p. 778. LE PIGEON VERD à AILES JAUNES d'Amboine. (Male et Femelle.) Buff. pl. 163.
- COLUMBA SPECIOSA. Gmel. p. 783. LE RA-MIRET à COU ET POITRINE ECAIL-LÉE de Caijenne. Buff. pl. 213.
- COLUMBA CAIJANOCEPHALA. Gmel. p. 781. —
  LA TOÙRTERELLE À CRAVATE VERTE de la Jamaique Buff. pl. 174.

#### PHASIANUS.

- PHASISANUS MOTMOT. Gmel. p. 740. LE KATRACA, OU FAISAN DE LA GUIJA-NE. Buff. pl. 146.
- PHASIANUS IGNITUS. Lath. Sup. Ind. v. 2.

  LE FAISAN à CROUPION COULEUR

  DE FEU. l'Embassade à la Chine.

Рна

- PHASIANUS PICTUS. (Mas.) Gmel. p. 743.

  LE FAISAN TRICOLOR HUPPÉ de la Chine. (Male.) Buff. pl. 217.
- PHASIANUS ARGUS: (Mas.) Gmel. p. 742.

  L'ARGUS, OU LE LUEN (Male.) de la
  Chine. Buff. v. 2. p. 361.
- PHASIANUS CRISTATUS. Gmel. p. 741. —— L'HOAZIN du Mexique. Buff. pl. 169.
- PHASIANUS NYCTHEMERUS. (Mas) Gmel. p. 743. LE FAISAN NOIR ET BLANC de la Chine. (Male.) Buff. pl. 123.

#### GRAX.

- CRAX RUBRA. (Mas.) LE HOCCO BRUÑ du Perou (Male.) Buff. pl. 125.
- CRAX PAUXI. (Mas.) Gmel. p. 737.—LE HOC-CO à PIERRE, OU LE PAUXI de Surlnam. (Male.) Buff. pl. 78.

#### PENEL OPE.

- PENELOPE MARAIL. Gmel. p. 734.—LE FAISAN VERDATRE, OU MARAIL de Caijenne.

  Buff. pl. 338.
- PENELOPE CUMANENSIS. Gmel. p. 734.

  LE PENELÔPE NOIR à HUPPE BLANCHE de Surinam.

#### TETRAO.

TETRAO MEXICANUS. Gmel. p. 762. — LE COLENICUI, OU CAILLE DU MEXI-QUE. Buff. pl. 149.

CHERAI de la nouvelle Hollande. — non décrit.

LE FRANCOLIN LONG-

BEC de Sumatra - non décrit.

TETRAO NUDICOLLIS. Gmel. p. 759. — LE FRANCOLIN GORGE NUE d'Afrique. Buff. p. 180.

#### PSOPHIA.

PSOPHIA CREPITANS. Gmel. p. 720. — L'AS GAMI de Caijenne. (Male.) Buff. pl. 169.

## PALAMEDEA.

PALAMEDEA CORNUTA. Gmel. p. 615. — LE KAMICHY CORNU d'Amerique. Buff. pl. 451.

#### CANCROMA.

CANCROMA COCHLEARIA. (Femina.) Gmel. p. 617. — LE SAVAÇOU HUPPÉ d'Amerique. Buff. pl. 38.

AR.

#### ARDEAL

- ROYAL d'Afrique. Buff. pl. 265.
  - ARDEA EGRETTA. (Mas.) Gmel. p. 629. LA
    GRANDE AIGRÉTTE d'Amerique (Male.)
    Buff. pl. 925.
  - ARDEA GRAZETTA. (Mas.) Gmel. p. 628.

    LA PETITE AIGRETTE d'Amerique.

    Buff. pl. 901.
  - ARDEA AGAMI. (Mas.) Gmel. p. 629. LE
    HERUN AGAMI de la Guijane. (Male.)
    Buff. pl. 859.
  - ARDEA CALEDONICA. Gmel. p. 626. LE
    BIHOREAU CANELLE de la nouvelle
    Calédonie Lath. v. 5. p. 55.
  - ARDEA HELIAS. Gmel. p. 640. —— LE CU-RALE, OU PETIT PAON DE ROSES de Caijenne Buff. pl. 782.

#### TANTALUS.

TANTALUS RUBER. (Mas.) Gmel. p. 651. ——
LE COURLIS ROUGE du Brésil (Male.)
Buff. pl. 81.

## FULICA.

FULICA CAYANENSIS. Gmel. p. 700. — LE GRANDE POULE D'EAU ROUSSE de Caijenne (Male.) Buff. pl. 352.

Fu-

FULICA PHOENICURA. Gmel. p. 715.

LE POULE D'EAU à VENTRE BLANC,

OU LE KARUKA de Ceylan (Male.) Sonnini v. 23. p. 262.

D'EAU À PIEDS ROUGES, OU LA MOI-RETTE de Malymbe — non décrit.

#### PARRA.

PARRA CAYANENSIS. Gmel. p. 766. — LE GRAND VANNEAU ARMÉ de Caijenne (Malc.) Buff. pl. 836.

#### ANAS.

- ANAS ATRATA. (Mas.) Lath. Ind. Orn. v. 2.
  p. 834. LE CYGNE NOIR de la nouvelle Hollande Sonnini v. 25. p. 108.
- ANAS VIRGINIANA. Briss. v. 4. p. 455.

  LE SARCELLE SOUCROURETTE du
  Port Jackson Buff. pl. 403. (de Caijenne)

### PLOTUS.

- PLOTUS SURINAMENSIS. Gmel. p. 581.


  LE GRÊBE-FOULQUE de Caijenne Buff.
  pl. 893.
- PLOTUS MELANOGASTER. Gmel. p. 580. C L'An-

L'ANHINGA NOIR de Caijenne (la Femelle.) Buff. pl. 959.

## PHAËTON.

PRAETON ÆTHEREUS. Gmel. p. 581.

LE GRAND PAILLE-EN-QUEUR des
Tropiques (Male.) Buff. pl. 998.



SULAI DANE

DÉSCRIPTION

DES

OISEAUX NON DECRITS;

D'OISEAUX DOUBLES

ET AUTRES OBJETS

D'HISTOIRE NATURELLE

OFFERTS EN ECHANGE

